

KONGL.  
VETENSKAPS  
ACADEMIENS  
HANDLINGAR,  
FÖR ÅR 1818.



FÖR EFTERKOMMANDE.

STOCKHOLM,  
TRYCKTE HOS JON. Pehr LINDB, 1818.



ROYAL  
VETERINÄRS  
ACADEMIENS  
HANDLINGAR.

FÖR ÅR 1818.



STOCKHOLM.

BEHÖRIGT HOS JOH. BENZ. LINDH. 1818.

KONGL.  
VETENSKAPS ACADEMIENS  
HANDLINGAR

UNDER  
FÖRRA HÅLF TEN

AF ÅR 1818.

---

PRÆSES

HERR DOCTOR SVEN HEDIN,

Konungens Förste Lif-Medicus, Medicinal-Råd,  
Riddare af Kongl. Wasa Orden, och af Kejs.  
Ryska S:t Annæ Ordens Andra Class.

---

1880

ATTESTED BY AGRICULTURE

HANDLING

THE PROCEEDINGS

OF THE

ANNUAL MEETING

OF THE

AGRICULTURAL SOCIETY

OF THE

STATE OF

NEW YORK

FOR THE

YEAR

1880

## UPPGIFT

af Rötternes expressioner till den af  
 BEZOUT i *Cours de Mathematiques*  
*Algebre* pag. 231 (Paris 1800),  
 meddelta formel för equationer af  
 5:te graden, äfvensom af dessa ex-  
 pressioners determination vid särskil-  
 da händelser, m. m.;

af

BERNH. BERNDTSON.

**E**quationen af femte graden

$$\begin{aligned}
 x^5 - 5abx^3 - 5a^2cx^2 + a^3dx - a^5 &= 0, \\
 + 5cdx^3 - 5ad^2x^2 + 5a^2b^2x + 5a^3bc \\
 + 5b^2dx^2 + 5abcdx - 5a^2bd^2 \\
 - 5bc^2x^2 - 5ac^3x + 5a^2c^2d \\
 - 5b^3cx - 5ab^3d \\
 + 5bd^3x - 5ab^2c^2 \\
 + 5c^2d^2x - 5acd^3 \\
 - b^5 \\
 - 5b^2cd^2 \\
 - 5bc^3d \\
 - c^5 \\
 + d^5
 \end{aligned}$$

af lika egenskaper med den af Bézout meddelta, erhålles, då enkla eqvationerne

$$x - a - b - c + d = 0,$$

$$x + \frac{1}{4}(a + b + c - d - (a + b - c + d)\sqrt{5}$$

$$- (a - b) \sqrt{-10 - 2\sqrt{5}}$$

$$- (c + d) \sqrt{-10 + 2\sqrt{5}}) = 0,$$

$$x + \frac{1}{4}(a + b + c - d - (a + b - c + d)\sqrt{5}$$

$$+ (a - b) \sqrt{-10 - 2\sqrt{5}}$$

$$+ (c + d) \sqrt{-10 + 2\sqrt{5}}) = 0,$$

$$x + \frac{1}{4}(a + b + c - d + (a + b - c + d)\sqrt{5}$$

$$- (a - b) \sqrt{-10 + 2\sqrt{5}}$$

$$+ (c + d) \sqrt{-10 - 2\sqrt{5}}) = 0, \text{ och}$$

$$x + \frac{1}{4}(a + b + c - d + (a + b - c + d)\sqrt{5}$$

$$+ (a - b) \sqrt{-10 + 2\sqrt{5}}$$

$$- (c + d) \sqrt{-10 - 2\sqrt{5}}) = 0, \text{ med hvar-}$$



andra multipliceras; och äro rötternas expressioner till BEZOUTS formel för 5:te gradens eqvationer alltså härigenom uppgifna.

Då, genom jämförelse af denna formel med eqvationen  $x^5 + px^3 + qx^2 + rx + s = 0$ , erhållas följande fyra eqvationer:

$$-5ab + 5cd - p = 0, (A),$$

$$-5a^2c - 5ad^2 + 5b^2d - 5bc^2 - q = 0 (B),$$

$$+ 5a^3d + 5a^2b^2 + 5abcd - 5ac^3 - 5b^3c + 5bd^3 + 5c^2d^2 - r = 0 (C),$$

$$\text{och } -a^5 + 5a^3bc - 5a^2bd^2 + 5a^2c^2d - 5ab^3d - 5ab^2c^2 - 5acd^3 - b^5 - 5b^2cd^2 - 5bc^3d - c^5 + d^5 - s = 0 (D),$$

så skulle, om  $a, b, c, d$ , anses för obekanta qvantiteter, till deras bestämmande erfordras, att  $p, q, r, s$ , voro bekanta, och att, genom successiva eliminationer, en sådan eqvation, till determinerande af någonderas bland de obekanta värden, sluteligen erhöles, som kunde upplösas medelst, för lägre eqvationer, än 5:te gradens, redan kända methoder.

Sistnämnda, för generela upplösningen af 5:te gradens eqvationer, nödiga resultat har, genom de hittills uppgifna eliminations-sätt, icke kunnat vinnas; men rötternas fullständiga eller approximerade värden uti serskilta handlinger kunna erhållas, då för en eller flere af qvantiteterne  $a, b, c, d$  och  $p, q, r, s$ , utan åtskillnad, antagas vissa bestämda och genom förefinnande eqvationer bestämbara värden, äfven som vissa, emellan nämnda qvantiteter, af problemets natur härrörande förhållanden, med iagttagande alltid, att antalet af obekanta qvantiteter

blifver lika med eqvationernes (A), (B), (C), (D).  
I sådant afseende antages först  $a = 0$ , hrvarigenom  
dessa eqvationer förändras till

$$5cd - p = 0,$$

$$+ 5b^2d - 5bc^2 - q = 0,$$

$$- 5b^3c + 5bd^3 + 5c^2d^2 - r = 0,$$

och

$$- b^5 - 5b^2cd^2 - 5bc^3d - c^5 + d^5 - s = 0.$$

Den första eqvationen gifver

$$d = \frac{p}{5c},$$

och detta värde af  $d$ , insatt i de öfriga eqvation-  
erne, förändrar dem till

$$pb^2 - 5bc^3 - qc = 0 \text{ (E)},$$

$$(5)^3 b^3 c^4 - p^3 b - 5p^2 c^3 + (5)^2 r c^3 = 0 \text{ (F)}$$

och

$$(5)^5 b^5 c^5 + (5)^4 p^2 b^2 c^4 + (5)^5 p b c^7 + (5)^5 c^{10} \\ + (5)^5 s c^5 - p^5 = 0 \text{ (G)}.$$

När  $b$  elimineras medelst eqvationerne (E)  
och (F), uppkommer eqvationen

$$\left. \begin{aligned} & (5)^7 p^2 c^{15} + 2(5)^5 p^3 q c^{10} - 2(5)^2 p^7 c^5 + p^8 q \\ & - (5)^8 r c^{15} - 3(5)^6 p q r c^{10} + 3(5)^3 p^5 r c^5 \\ & + (5)^6 q^3 c^{10} - 2(5)^3 p^4 q^2 c^5 \\ & - (5)^4 p^3 r^2 c^5 \end{aligned} \right\} = 0 \text{ (H)}$$

och då  $b$  elimineras medelst equationerna ( $E$ ) och ( $G$ ), erhålles equationen

$$\begin{aligned} & (5)^{15}c^{30} + (5)^{15}sc^{15} + 2(5)^{11}p^5c^{20} - 9(5)^9p^6qc^{15} - 12(5)^5p^{10}c^{10} - 2(5)^4p^{17}qc^5 + p^{17} \\ & - 2(5)^{12}p^2q^2c^{20} + 12(5)^{10}p^5sc^{15} + 4(5)^7p^7q^2c^{10} - 2(5)^5p^{10}sc^5 \\ & + (5)^{14}pqrc^{20} + (5)^{10}p^3q^3c^{15} + 2(5)^9p^6qrc^{10} \\ & + (5)^{12}p^2q^2sc^{15} + (5)^{10}p^5s^2c^{10} \\ & - (5)^{10}q^5c^{15} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} & (5)^{15}c^{30} + (5)^{15}sc^{15} + 2(5)^{11}p^5c^{20} - 9(5)^9p^6qc^{15} - 12(5)^5p^{10}c^{10} - 2(5)^4p^{17}qc^5 + p^{17} \\ & - 2(5)^{12}p^2q^2c^{20} + 12(5)^{10}p^5sc^{15} + 4(5)^7p^7q^2c^{10} - 2(5)^5p^{10}sc^5 \\ & + (5)^{14}pqrc^{20} + (5)^{10}p^3q^3c^{15} + 2(5)^9p^6qrc^{10} \\ & + (5)^{12}p^2q^2sc^{15} + (5)^{10}p^5s^2c^{10} \\ & - (5)^{10}q^5c^{15} \end{aligned}} \right\} = 0(K).$$

Equationen ( $H$ ) finnes således, i anseende till  $c$ , vara af femtonde graden, reducibel till tredje gradens upplösning, och equationen ( $K$ ), af trettonde graden, reducibel till sjuete gradens upplösning. Om åter  $c$  elimineras så väl medelst equationerna ( $E$ ) och ( $F$ ) som medelst equationerna ( $E$ ) och ( $G$ ), erhålles, i förra fallet, en equation för  $b$  af femtonde graden, reducibel till tredje graden, och i senare fallet, en equation för  $b$  af fyrtonde femte graden, reducibel till nionde graden.

Då  $b$ ,  $c$  och  $d$ , anses vara obekanta qvaniteter, så skulle, om  $e$  eliminerades medelst equationerne ( $H$ ) och ( $K$ ), en equation uppkomma, endast innehållande qvaniteterne  $p$ ,  $q$ ,  $r$ ,  $s$ , hvilken, när tre af de sistnämnda qvaniteterne antagas såsom bekanta, determinerade den fjerdre värden, och sålunda meddelade upplysning om de förhållanden  $p$ ,  $q$ ,  $r$ ,  $s$  sins emellan borde åga, för att uppfylla denna equations villkor, vid inträffande hvaraf de uti rötterna af femte gradens equation ingående obekanta qvaniteterna  $c$ ,  $b$ , och  $d$  i de ofvanupptagna equationerne skulle erhålla sådane värden, som för hvarje serskild händelse erfordrades.

Nämnda elimination af  $c$  medelst eqvationerna (H) och (K) har jag ej haft tillfälle verkställa, hålst dervid, utom öfriga operationer, förekommer flere tusende terms multiplication, i följd hvaraf här saknas ifrågavarande auxiliär eqvation, som, innefattande samtliga qvantiteterne  $p, q, r, s$ , skulle utvisa alla möjliga deras förhållanden sins emellan, för sådana händelser, då de genom förut upptagne eqvationer bestämmande värden af  $c, b$ , och  $d$  kunde bidra till fullständigt meddelande af rötterna i eqvationen af femte graden.

Med afseende härpå, och att den genom verkställd elimination af  $c$  uppkomna auxiliär eqvationen troligen skulle innehålla sådane dimensioner af  $p, q, r, s$ , som uppnådde eller öfverstege femtegradens eqvationers, inskränkes undersökningen till mera speciella fall, och antages nu ytterligare  $b=0$ ,

hvarigenom

$$d=0,$$

och eqvationen (H) förändras till

$$-25rc^5 + q^3 = 0,$$

samt eqvationen (K) till

$$(5)^5 c^{15} + (5)^5 sc^{10} - q^5 = 0.$$

Den förra eqvationen gifver

$$c^5 = \frac{q^3}{25r},$$

och detta värde af  $c^5$ , insatt i den senare, meddelar eqvationen

$$q^4 + 25qrs - 5r^3 = 0,$$

som altså innefattar de förhållanden emellan  $q, r, s$ , under hvilka  $c$  och  $b$  blifva tjenliga till bestämmande af rötterna till eqvationen af femte graden, då värdet af  $c$  toges uti eqvationerna (H) eller (K), och värdet af  $b$  uti eqvationerna (E), (F) eller (G).



Ehuru den del af femte gradens eqvationer, som härigenom upplöses, är ganska inskränkt, innesfattar den likväl ett oändligt antal serskilda händelser, emedan qvantiteterna  $q, r, s$ , fastån bundna inom de uti eqvationen  $q^4 + 25qrs - r^3 = 0$  föreskrifna villkor, dock kunna i förhållanden sins emellan oändeligen variera.

---

BEZOUTS formel för eqvationer af femte graden gifver åfven anledning att i åtskilliga fall finna approximerade värden af rötterna.

I:o antages  $a = 0$  och  $b$  vara en så liten qvantitet, att, utan betydlig saknad, de termer må kunna försvinna, der  $b$  finnes multiplicerad med mindre, än tre dimensioner af  $c$  och  $d$ ; genom denna supposition förvandlas eqvationerne (A), (B), (C) och (D) till

$$5cd - p = 0,$$

$$q = 0,$$

$$5bd^3 + 5c^2d^2 - r = 0,$$

$$-5bc^3d - c^5 + d^5 - s = 0.$$

Den första af dessa eqvationer gifver

$$d = \frac{p}{5c},$$

som, insatt i de tvenne sista eqvationerne, förändrar dem till

$$\frac{p^3b}{25c^3} - \frac{p^2}{5} - r = 0$$

och

$$-pbcc^2 - c^5 + \frac{p^5}{(5)^5c^5} - s = 0.$$



Den förre af de sist upptagne eqvationer gifver

$$b = \frac{(25r - 5p^2)c^3}{p^3},$$

som, insatt i den senare, meddelar

$$c^{10} - \frac{p^2 s}{4p^2 - 25r} c^5 + \frac{p^7}{(5)^5 (4p^2 - 25r)} = 0.$$

Om, i stället för  $d$ ,  $c$  först elimineras, fås

$$c = \frac{p}{5d}$$

$$b = \frac{5r - p^2}{25d^3}$$

och

$$d^{10} - s d^5 + \frac{4p^5 - 25p^3 r}{(5)^5} = 0.$$

Ju mindre  $b$  blir relativt till  $c$  och  $d$ , desto närmare kunna de begge sistnämnda quantiteterne bidraga till meddelandet af rötterna uti eqvationen af femte graden, samt uppfylla detta ändamål fullständigt, då  $b=0$  och, i följd deraf,  $p^2=5r$ , för hvilken serskilda händelse LACROIX, uti *Complement des Elémens d'Algèbre*, pag. 111 (Paris 1801), jämväl lemnat upplösning af femte gradens eqvationer.

2:o Antages  $a=0$  och  $c$  så liten, att de termer, der factorer  $b$  och  $d$  ej uppgå till tre gånger factorer  $c$ , utan betydlig saknad, kunna uteslutas; härigenom förvandlas eqvationerne (A), (B), (C) och (D) till

$$p=0,$$

$$5b^2 d - q = 0,$$

$$-5b^3 c + 5bd^3 - r = 0,$$

och

$$-b^5 - 5b^2 c d^2 + d^5 - s = 0.$$

Medelst den andra af dessa eqvationer erhålles

$$d = \frac{q}{5b^2}$$

och detta värde af  $d$ , insatt i de tvenne sista eqvationerne, förändrar dem till

$$-5b^3c + \frac{q^3}{25b^5} - r = 0$$

och

$$-b^5 - \frac{q^2c}{5b^2} + \frac{q^5}{(5)^5b^{10}} - s = 0.$$

Af den förra bland dessa eqvationer fås

$$c = \frac{q^3 - 25rb^5}{125b^8}$$

och, då detta värde af  $c$  insättes i den senare, uppkommer eqvationen

$$b^{15} + sb^{10} - \frac{q^2r}{25}b^5 + \frac{4q^5}{(5)^5} = 0.$$

På enahanda sätt, som i det föregående anmärkt blifvit, kunna nu kvantiteterna  $b$  och  $d$  desto fullkomligare uppfylla sin bestämelse att meddela rötternes värden i eqvationen af femte graden; i den mohn  $c$  relativt till dem blifver mindre, intill dess de förra kvantiteterna fullständigt bidraga till ändamålets vinnande, då  $c=0$  och således  $\frac{q^3 - 25rb^5}{25b^8} = 0$ , hvarigenom erhålles

$$b^5 = \frac{q^3}{25r}, \text{ samt, medelst detta värdes af } b^5 \text{ insät-}$$

$$\text{tande ut eqvationen } b^{15} + sb^{10} - \frac{q^2r}{25}b^5$$

$$+ \frac{4q^5}{(5)^5} = 0, \text{ den eqvation } q^4 + 25qrs - 5r^3 = 0,$$

som förut befunnits medgifva ett exact bestämmande af rötterna i eqvationen af femte graden.

Om man antager

$$q = 5l(m+n) \cdot (m-n),$$

$$r = -\frac{4(m+n)^3 \cdot (m-n)^3}{l^2} - \frac{2l^3((m+n)^5 + (m-n)^5)}{(m+n)^2 \cdot (m-n)^2},$$

och

$$s = l^5 + 2((m+n)^5 + (m-n)^5)$$

så förändras eqvationen

$$b^{15} + sb^{10} - \frac{q^2 r}{25} b^5 + \frac{4q^5}{(5)^5} = 0$$

till

$$b^{15} + \left( l^5 + 2((m+n)^5 + (m-n)^5) \right) b^{10}$$

$$+ 2 \left( 2(m+n)^5 \cdot (m-n)^5 \right.$$

$$\left. + l^5((m+n)^5 + (m-n)^5) \right) b^5$$

$$+ 4l^5(m+n)^5 \cdot (m-n)^5 = 0.$$

Medelst upplösning af denna eqvation i egen-  
skap af cubisk och femte rotens utdragande ur  
hvardera af eqvationens rötter erhålles

$$b = -l$$

$$b = -\sqrt[5]{\frac{1}{2}}(m+n)$$

$$b = -\sqrt[5]{\frac{1}{2}}(m-n)$$

och, när ett värde af  $b$ , ansedt att vara reelt och  
lika med  $-l$ , samt ofvan antagne värden för  $q$   
och  $r$  insättas uti eqvationerna

$$d = \frac{q}{5b^2}$$

och

$$c = \frac{q_1 - 25 r b^5}{125 b^8},$$

blifver

$$d = \frac{m^2 - n^2}{1}$$

och

$$e = \frac{(m^2 - n^2)^3}{5 l^5} - 2 m \frac{m^4 + 10 m^2 n^2 + 5 n^4}{5 (m^2 - n^2)^2};$$

hvarigenom ådagalägges, att förhållandet emellan rötterna uti eqvationen

$$b^{15} + 5 b^{10} - \frac{q^2 r b^5}{25} + \frac{4 q^5}{(5)^5} = 0$$

bestämmer den större eller mindre approximation af rötterna uti eqvationer af femte graden, som medelst den nu uppgifna method kan i serskilta fall vinnas.

För öfrigt är så mycket mer anledning till den förmodan, att, då någon Analytist företog ämnet till utarbetning, han icke allenast skulle nogare bestämma gränserna för den approximation, hvilken, uti nu ifrågavarande och flere handlinger, för rötterna uti 5:te gradens eqvationer bör ernås, utan ock utstaka sådane grunder för approximierade rötters sökande på denna väg, hvaraf tillämpning kunde åga rum för eqvationer i allmänhet, som äfven jag genom förutsättning af möjligheten att, utan särdeles afsaknad, utelemna högre dimensioner af quantiteter, hvilka antagits vara ganska små, för cubiska eqvationen  $y^3 + fy + g = 0$ , uti de handlinger, då alla rötterna äro reella, erhållit följande enkla formler, emellan hvilkas värden en approximerad rot sig befinner, nemligen;

$$\frac{\pm \sqrt{5f^2 \mp 3g\sqrt{-f}} - 4f \sqrt{f^2 \mp 3g\sqrt{-f}}}{3\sqrt{-f}}$$

och

$$\frac{\mp f \pm \sqrt{f^2 \mp 2g\sqrt{-f}} \mp \sqrt{f^2 \mp g\sqrt{-f}}}{\sqrt{-f}}$$

Med iagttagande att, der dubbla tecknen af  $+$  och  $-$  finnas utsatte, de öfre nyttjas, då  $g$  är negativ och de nedre, då  $g$  är positiv, erhållas genom dessa algebraiska expresioner i så mätta approximerade värden af största roten i nämnde cubiska equation, att den förra blir större och den senare mindre än roten, med omkring en tusendedel af dess belopp, i den händelsen då  $\frac{f^3}{27} + \frac{g^2}{4} = 0$ , och att dessa expressioner närma sig allt mer och mer rotens värde, i den mohn  $g$  har ett mindre, än det genom equationen  $\frac{f^3}{27} + \frac{g^2}{4} = 0$  utmärkta, förhållande till  $f$ , intilldess de med värdet af roten fullkomligen inträffa, då  $g = 0$ .

---



## UNDERSÖKNING

*Af en ny Mineral-kropp, som innehålles  
i det vid Fahlun tillverkade svafvel;*

af

JAC. BERZELIUS.

**D**å vid Svafvelsyre-Fabriken på Gripsholm Fahlun Svafvel användes till bränning i blykammaren, afsätter sig på dennes botten i den liquida svafvelsyran et blekrödt svafvelslamm, hvilket man gissat skulle innehålla svafvelbunden arsenik såsom färg-ämne. Då jag, i egenskap af delägare i denna fabrik, förleden sommar i sällskap med Herr Assessor GOTTLIEB GAHN tog kännedom af den till svafvelsyrans beredning här använde process, hvilken är väsentligt olik den, som i andra länder nyttjas, väckte detta röda slamm vår uppmärksamhet. Vi anställde genast några sådana försök dermed, som på stället kunde göras, af hvilka vi hade skäl att förmoda en halt af Tellurium i denna svafvelmassa. Likväl syntes tellurhalten vara ganska ringa, emedan vi icke kunde afskilja någon så stor portion deraf att den kunde pröfvas, utan vi trodde oss igenkänna den hufvudsakligast på den lukt af rättikor, hvilken Tellurium, enligt KLAPROTHS intygande, ger då den för blåsroret förflygtigas. Assessor GAHN yttrade dervid att

han vid Fahlu rosthopar, ofta känt lukten af Tellurium, utan att det likväl lyckats att, genom de noggrannaste efterspaningar, bland den använde malmen finna något tellurhaltigt mineral.

Oaktadt denna förklaring syntes oss nöjaktig, lät jag likväl uppsamla en portion af detta röda slamm, för att efter min återkomst till Stockholm kunna närmare undersökas.

Det phenomen som bäst characteriserar Tellurium är att, i sammansmältning med kalium, gifva en grå metall massa, som utan gaz-utveckling löses i vatten till en vinröd vätska, hvars yta i luften öfverdrages med en silfverglänsande hinna af metallisk Tellurium. För att jemföra det problematiska ämnet ur Fahlu-svaflet med Tellurium i detta hänseende, utdrog jag det röda svafvel-slammet med kungsvatten och fällde lösningen med caustik ammoniak. Fällningen var hvit och reducerades för blås-röret, under stark rättikluk, med lemning af ett blykorn. Den innehöll således, jemte bly, det ämne som gaf upphof åt rättiklukten. En portion deraf torrkades starkt och blandades i ett i ena ändan hopsmält glasrör, med en portion kalium, hvarmed den upphettades öfver ljuslågen. Kalium detonerade dermed svagt och den svarta massa, som bildades, löste sig till en del i vatten utan gaz-utveckling. Vätskan fick en röd öl-färg och grumlades om en stund med afsättande af ett cinnober-rödt ämne, hvars myckenhet något öktes genom tillsatts af salpetersyra. Då detta ämne för blås-rörs-lågen upphettades, förflög det med stark rättikluk, som smittade luften i hela rummet, och lågen fick en azurblå färg.

Då en portion Tellurium, fälld ur hydrotellur kali på lika sätt behandlades, blef lågen deraf grönaktigt blå, men ingen rättikluk kunde för-

spörjas, och först då telluren inneslôts i ett glasrör, som påblåstes till dess den gasformiga metallen gjorde ett hål på det uppmjukade glaset, kunde en rättiklukt förspörjas, men hvilken då var absolut lik den som erhöles af det röda pulvret. Dessa omständigheter syntes tillkännagifva att det röda ämnet var något annat än Tellurium och föranledde en vidlyftig undersökning, genom hvilken jag fann att det är en egen, förut okänd mineral kropp, åt hvilken jag, för att beteckna dess släktlikhet med Tellurium, gifvit namn af Selenium, från Σελην, Måna, då Telluren snamn härleder sig från Tellus.

Selenium är i det röda svafvelslammet blandadt med ganska mycket svafvel, och utgör deraf en ganska ringa del. Det synes vara till en stor del närvarande i obunden form, och är troligen utfälldt ur svafvelsyran af den svafvelsyrlighetsgas, hvarmed svafvelsyran vid slutet af hvarje bränning impregneras. Svafvelslammet innehåller dessutom qvicksilfver, koppar, tenn, bly, zink och jern, sannolikt alla i svafvelbunden form.

Jag skall icke uppehålla Kongl. Akademien med detaljerna af de talrika försök jag med denna kropp anställt och hvilka jag ännar utförligt beskrifva i öfste Häftet af Afhandlingar i Fysik, Kemi och Mineralogi, hvilka jag i sällskap med några andra Svenska Chemister utgifver.

Jag skall här i korrthet anföra den nya kroppens egenskaper.

Selenium är i reducerad form en grå, metallglänsande på ytan i brunt dragande kropp. I brottet är den blygrå, metallglänsande polerad och glasartad, om den har fått hastigt kallna. Långsamt af svalad deremot är den i brottet matt, fin-kornig och liknar ett brottstycke af en Kobolt-

regulus. Ur en upplösning af hydroselen-ammoniak, som decomponeras af luften, anskjuter den i blygrå metallglänsande kristaller, som dels vegetera utifrån glaset inuti våtskan, dels formara en hinna på ytan. Jag har aldrig fått dem så rediga att något kunnat bestämmas om deras figur. Om selenium fälles kallt ur sina upplösningar med svafvelsyrlighetsgaz, så bildar den ett fläckigt cinnoberrödt pulver, fälles den åter i kokning, så är fällningen brun, mörkgrå eller svart. Selenium är ej särdeles hård, skafves lätt af knifven, och låter rifva sig till ett mörkrödt pulver, som likväl lätt sammanbakar under pistillen och blir blygrått och metallglänsande. Den är ganska lättsmält, mjuknar vid  $+100^{\circ}$  och kan då dragas i trådar, lika som lack, hvilka trådar, då de äro tillräckligt tunna, finnas genomskinliga af en djup rubinröd färg, men i återkastadt ljus hafva grå färg och full metallglans. Några grader öfver  $+100^{\circ}$  blir Selenium fullt flytande och nära glödgning kommer den i kokning och öfverdestillerar i svarta, alldeles ogenomskinliga, tunga droppar, hvilka i retort-halsen samlas till en spegelglänsande mörkbrun metallmassa. Selenium bildar innan condenseringen en mörkgul gaz, som likväl har en mindre mörk färg än svafvelgazen. I mycket vida kårl sublimeras selenium, bildar en röd rök, och fäster sig på glaset i form af ett cinnoberrödt pulver. — Dess egentliga vikt har jag funnit från 4. 30 till 4. 32. Den leder hvarken värmets eller electricitetens.

Till syret har den en svag frändskap; den sublimeras i öppna luften oförändrad, om den ej råkas af lägen, i hvilket fall denne får en azurblå färg i kanten, och en portion af selenium förvandlas till



till en gazformig oxid, som har råttiklukt, och icke förenas hvarken med syror eller alkalier, men som till en ringa grad absorberas af vatten, hvilket dervid får dess lukt. Upphettas Selenium i syrgas till kokning så tänder den sig och brinner med en svag hvit, i spetsen blåaktig grön låge, och förvandlas till en egen syra, som i crystalles afsätter sig på kallare delar af apparaten. Samma syra bildas äfven då selenium med tillhjälp af värme upplöses i salpetersyra eller i kungsvatten. Den anskjuter ur den svalnande concentrerade solution i prismatiska crystalles, som likna salpeter. Selensyran är ganska lättlösl i både i vatten och alkohol. Vid en högre temperatur är den flygtig och sublimeras i långa hvita prismatiska nålar. Den har en rent sur smak, utan någon ting eget eller metalliskt. I gasform har den gul färg och en stickande lukt, ej olik den af andra gasformiga syror. Den innehåller 28. 74 procent syre, och ger med alkalier jordarter och metall-oxider egna salter. I de neutrala håller syran 2 gånger basens syre. De hafva med alkali till basis, likasom de borax-syrade, den egenskapen att smaka alkaliskt och att reagera för alkali. Med jordarter och metall-oxider äro de alla olösliga i vatten. Selensyran ger tvenne sura salter med de fleste baser. I den första graden af öfverskott på syra, håller syran 4 och i den andra 8 gånger så mycket syre som basen. Dessa äro alla lösliga. Ytterjord, vismut, koppar, bly, tenn och silfver-oxiderna, samt qvicksilfver-oxidul gifva med selensyran inga sura salter. Selensyrade salter sönderdelas i bränning med kolpulver, selenium sublimeras till en del, och förenas till en del med basen eller med dess radical, efter som basen reduceras eller blir



oförändrad. Selsensyrad ammoniak sönderdelas i distillation utan tillsats, man erhåller kväfgaz, vatten, ammoniak och i retorten återstår smått selenium. En liten portion sur selsensyrad ammoniak sublimeras utan att sönderdelas.

En förening af saltsyra och selsensyra fås då selenium införes i gasformig saltsyresuperoxidul (fordom syrsatt saltsyre-gas). Föreningen begynner genast, selenium upphettas och smälter till ett brunt liquidum, hvilket i mon som det mättas, steltnar till en hvit saltmassa, som låter sublimeras sig. Den löses lätt och med håfthet i vatten. Den vattenfria selsensyrade saltsyran kan med tillhjälp af värme upptaga ännu 3 gånger till så mycket selenium, som den förut innehåller. Den är då ett brunt, oljligt liquidum, som luktar svagt, likt saltsyrad svafvel-oxid, sjunker i vatten och decomponeras efter hand, hvarmed selsensyra och saltsyra upplöses i vattnet och selenium återstår olöst.

Selenium förenas med vate till en egen gazart, som har alla egenskaper af svafvelbunden vategaz. Den luktar och smakar likt denne, och förenas med alkalierna och de alkaliska jordarterna till egna salter, som hafva fullkomligt samma hepatiska smak, som de, hvilka bildas af svafvelbundet eller tellurbundet vate. Hydroselenkali fås lättast då selenium sammansmältes med kalium, hvarvid eld uppkommer, och man får en grå metallisk massa, som utan gazutveckling löses i vatten och ger en ölröd upplösning. Den upplöser ett öfverskott af selenium och bildar då en förening analog med hvad i franska nomenclaturen plågar kallas hydro-sulphure sulphuré; den sönderdelas af luften och afsätter på ytan en hinna som först är röd, men blir sedan blygrå i mon som den tjocknar. Selenbundet vate förenas med andra baser bäst på det

sått att selenbundet jern upplöses i saltsyra och den selenbundna vågazen inledes i en upplösning af det alkali eller den jord, som skall mättas.

Selenbunden våtgaz består af 97.4 d. Selenium samt 2.6 d. våte. Den är för sig själf löslig i vatten, som deraf får hepatisk smak och egenskapen att svagt rodna lakmus-tincturen, samt att fälla alla neutrala metallsalter, äfven de af jern och zink. Selenbundet våte absorberas lättare af vatten än svafvelbundet våte och sönderdelas äfven lättare af luften, hvarvid Selenium inkrusterar sig i porösa, serdeles organiska kroppars massa på ett sådant sätt att den icke mera kan mekaniskt afskiljas. Vått papper, tråd, våt cautschuk som träffas af selenbundet våte och sedan af luften, rödfärgas af selenium långt in i sin massa. Denna egenskap gör selenbunden våtgaz ganska farlig till inandning. Knappt har man deraf känt den hepatiska lukten, förr än en stickande känsla utbreder sig öfver alla de ställen, som gazen råkat, en håftig bränad uppkommer, lukten försvinner, snufva med röda rinnande ögon och envisa catarhaliska symptomera inställa sig. Har så mycket af gazen inandats att den kommit i lungorna, så uppkommer en torr hosta, som håller länge i och lätt återkommer. Jag har varit utsatt för alla dessa symptomera, oaktadt jag icke kommit att inandas annat än högst obetydliga spår af denna gaz, och visserligen skulle intet annat skadligt ämne i så liten quantitet hafva frambragt någon verkan.

Selenium förenas med svafvel i alla förhållanden. En procent svafvel sammanmält med selenium ger det en röd färg, gör det genomskinligare och låtsmåltare. Några procent selenium, blandade med svaflet gifva det en smutsig gråaktig färg. Fålles en upplösning af selensyra med

svafvelbunden våtgas, så får man en citrongul fällning som i värme bakar ihop och blir brandgul. Den smälter vid en eller annan grad öfver  $+ 100^{\circ}$ , behåller sig efter afsvälning ganska länge mjuk och spånstig. Låter distillera sig och blir då genomskinlig med glasigt brott och liknar distillerad eller smält auripigment.

Selenium förenas äfven med phosphor i alla proportioner, men jag har icke haft tillfälle att undersöka dess förhållande till kol eller boron.

Med metallerna förenas selenium under eldphenomen, och den nya föreningen liknar i de flesta fall ganska nära den som fås af samma metall med svafvel. Selenbundna metaller afgä selenium vid rostning med råttiklukt, men selenium är svårare att bränna bortt än svaflet. De upplösa sig trögt i salpetersyra; men likväl lättare än svafvelbundna metaller. Åtskilliga metaller förena sig med selenium i flere olika måtningsgrader t. ex. silfver och koppar. Det vanligaste förhållandet är sådant att om metallen och selenium oxideras, så uppkommer ett selensyradt neutralt salt.

Selenium förenas både på torra och våta vågen med de eldfasta alkalierna och på torra vågen med de alkaliska jordarterna. Föreningarna äro röda till färgen; de med alkalierna äro lösliga i vatten och smaka alldeles likt svafvelbundet alkali. De med jordarterna äro olösliga. Man får dessa äfven på våta vågen då ett jordsalt upplöses i vatten och fälls med en lösning af selenbundet alkali. Fällningen är köttfärgad. På detta sätt får man äfven föreningar af selenium med de flesta metalloxider.

Selenium upplöses slutligen också af fetta, men ej af flygtiga oljor. Lösningen är i genomseende gul men i återkastadt ljus rödaktig och oklar. Oljan får af selenium större konsistens. En lös-

ning af selenium i bomolja har vid luftens vanliga temperatur stadga af en salva.

Jag har försökt att utdraga selenium så väl ur det orena svaflet från Fahlun, som ur den svafvelkis hvaraf det beredes. Kisen gaf endast ett tydligt spår af selenium, och svaflet gaf icke mer än  $\frac{1}{1000}$  af sin vikt selenium.

Denna omständighet visar emedlertid att vid Gripsholm en stor del af selenium går bort i form af den gasformiga suboxiden, och en annan del stannar upplöst i syran, emedan annars årligen flera skålpund selenium borde kunna samlas på blykammarens botten. Också har jag funnit spår af selenium i svafvelsyran, hvilka af svafvelbundet väte kunnat utfällas ur den med vatten utspädda syran.

En berömd Svensk Naturforskare hade för några år sedan lemnat ett specimen af en svensk tellurmalm åt Herr Assessor GAHN, hvilken hade den godheten att till min undersökning anförtro en smula af detta fossil. Jag fann deruti icke tellur, ehuru detta fossil i blåsrörsförsök gaf en stark lukt af rättika. Sedan jag funnit selenium i Fahlusvaflet blef det mig sannolikt att den lukande kroppen i detta fossil äfven var selenium. Jag begärde då och erhöll af samma Naturforskares frikostighet ett tillräckligt quantum af detta fossil för att deröfver göra en fullständig undersökning. Det fanns vara en förening af selenbundet silfver och selenbunden koppar, hvars sammansättning i mineralsystemet låter uttrycka sig med  $Ag Sc^2 + 2 Cu Sc$  och det innehåller mer än  $\frac{1}{4}$  af sin vikt selenium. Beklagligen har jag icke kunnat erfara hvarest detta fossil inom fäderneslandet förekommit.

Vid frågan om uppställningen af selenium i det kemiska systemet blir man oviss om den skall

råknas till klassen af metaller eller till metall-  
oiderna, lika som svafvet och phosphoren, och man  
finner af det anförda att dess egenskaper falla så  
midt emellan båda klassernas att den med fullt lika  
skäl kan föras till båda. Med metallernas glans,  
förenar den icke egenskapen att leda värmet och  
electriciteten, och har en viss ringa grad af ge-  
nomskinlighet. Dess egenteliga vikt öfverträffar  
alla metalloidernas mer än dubbelt, ehuru den ej  
är så tung som någon af de äldre metallerna.  
Emedlertid då af alla de egenskaper som utmärka  
metallerna, glansen är den enda som de odelad  
åga, så har jag på denna grund trott mig böra  
företrädesvis räkna selenium bland metallerna.

---



## UNDERSÖKNING

*af några vid Utö Jernmalms - brott  
träffade Fossilier och ett eget deri  
funnet eldfast Alkali;*

af

AUGUST ARFVEDSON.

**H**err Professor BERZELIUS ägde uti sin Mineralsamling tvenne Stenarter från Utön, hvilka väl till sine yttre characterer redan af D'ANDRADA blifvit beskrifne under namn af Petalit och Spodumén, men om hvars chemiska sammansättning han önskade erhålla någon närmare kännedom, helst det förstnämde mineralet i sådant afseende ännu icke var undersökt, och ingendera af de analyser som på det senare blifvit anstaldte, voro nog öfverensstämmande för att kunna tjena till någon tillförlitelig rättelse.

Den undersökning jag i anledning häraf företagit på de ifrågavarande Mineralierne har emot all väntan föranledt en upptäckt, hvilken torde äga nog vikt att i K. V. A. Handlingar förtjena ett rum. Det har nemligen lyckats mig att utur Petaliten och Spodumén frambringa ett nytt eldfast Alkali, hvilket till sine egenskaper tydeligen skiljer

sig från de öfriga hittills kända Alkalierne, och i classen hvaraf det således torde få uppföras såsom ett eget species.

Jag har erhållit det egna Alkalit utur Petaliten och Spodumen, hvars hufvudbeståndsdelar i öfrigt äro kiseljord och lerjord, på följande vis: Stenen risven till fint pulver blandades med 4 gånger dess vikt kolsyrad Baryt och brändes omkring en timma i Platinadegel med stark eld. Brända massan digererades med utspädd saltsyra, inkoktes dermed till torrhet och upplöstes åter i saltsyrehaltigt vatten, hvarvid kiseljorden stadnade olöst och afskiljdes. Den i lösningen innehållne saltsyrade Baryten decomponerades derpå med svafvelsyra, som tillsattes så länge fällning skedde; svafvelsyrade Baryten afsilades och genomgångna solution utfälldes med kolsyrad Ammoniak. Fällningen togs på filtrum och tvättades. Återstående vätskan jemte sköljvattnen afröktes till torrhet och glödgades tills all svafvelsyrad och saltsyrad Ammoniak var bortdrifven och massan stod smält. Den innehåller nu vanligen, jemte ett spår på gips, en blandning af svafvelsyradt och saltsyradt Alkali, från hvilken senare syra den befriades genom återupplösning i vatten, tillsättning af mera svafvelsyra, ytterligare afdunstning till torrhet och glödgning. Glödgade massan, upplöst i vatten, silades och blandades med en lösning af ättiksyrad Baryt så länge fällning uppkom. Svafvelsyrade Baryten afskiljdes och lösningen, som nu innehöll ättiksyradt Alkali, orenadt af litet i öfverskott tillsatt ättiksyrad Baryt och kan hända en ringa portion ättiksyrad kalk, inkoktes till torrhet, hvarpå torra massan glödgades tills den var smält. Producten, som genom ättiksyrans decomposition nu innehöll kolsyradt alkali jemte litet Baryt och kalk

pulveriserades och koktes med vatten i flere omgångar, hvarvid alkalit småningom extraherades från de olösliga jordarterne, hvilka afskiljdes. Upplösningen af alkalit i vatten går likväl ganska trögt, så att då jag vid ett tillfälle hade en större massa att utluta, åtgick der till nära tvenne dygn.

Lösningen i vatten innehöll nu endast det egna Alkalit, förenadt med kolsyra.

Den smakar tydligt ehuru svagt alkalisk och reagerar starkt för Alkali på rodnadt lackmuspapper. Vid afdunstning afsätter sig saltet derur i form af en skorpa, bestående af helt små prismaticiska crystaller. Vid rödglödning smälter det och stelnar vid afsvälning till en tät emaljlik massa. Då smältningen sker i Platinadegel, finnes degeln efteråt alltid starkt anfrått, och lättaste sättet att åter få den ren, är att deri smälta litet pulveriseradt kolsyradt kali. Denna det egna alkalits egenskap att i kolsyrad form angripa Platina anser jag mycket caracteristik. Det inträffar alltid äfven då man använder en ganska liten värmegrad. Det smälta saltet är lika som det crystalliserade i vatten högst svårlöst; måttadt med kolsyra är det något lösligare. *Neutrala kolsyrade saltet* afsätter vid långsam afdunstning likasom det basiska en crystallinisk saltskorpa, som håftigt decrepiterar då den uppvärms.

Med de öfrige syrorne bildar det egna alkalit särskilda föreningar, af hvilka jag likväl ännu endast haft tillfälle undersöka följande:

Med *Svafvelsyra* jemt måttadt erhålles ett i vatten ganska lättlost salt. Lösningen bildar vid afdunstning en saltmassa utan redig crystallform. Det bibehåller sig oförändrat i luften och är ytterst trögsmält. Det *Sura Saltet* smälter lättare, men är något svårlöstare i vatten. Genomrepeterade nog-

granna analyser på det neutrala saltet, har jag funnit det bestå på 100 delar af:

Svafvelsyra	- -	68.65
Basis	- - -	31.35
		<hr/>
		100.00

*Saltpetersyra* ger med det egna alkalit ett salt, som vid afdunstning crystalliserar dels i rediga stora rhomber dels i nålar. Det smälter ganska lätt och flyter som olja. Efter afsvälning drar det med håftighet fugtighet till sig ur luften och deliquescerar. Smakar likt saltpeter.

*Saltsyra* *Saltet* kan ej fås att crystallisera utan afsätter vid afdunstning en saltskorpa af oredig textur. Likt det saltpetersyrade är det ytterst lättsmält, så att Platina-degeln, hvori smältningen sker, knapt behöfver brunvärma förr än saltet flyter. Med lika, om icke större begärlighet uppsuper det äfven fugtighet ur luften och deliquescerar. Jag har funnit det smälta saltet vara sammansatt på 100 delar af

Saltsyra	- -	60.06
Basis	- - -	39.94
		<hr/>
		100.00

Men 60.06 delar Saltsyra mätta en quantitet basis, hvars syre är 17.528; dessa utgöra således syrequantiteten i de fundne 39.94 del. basis, och det egna alkalit består i följe häraf på 100 delar af:

Metallisk Radical	- -	56.114
Syre	- - - - -	43.886
		<hr/>
		100.000

Det kolsyrade Alkalit löses af *Ättiksyra* i köld långsamt, lättare med tillhjälp af värma. Saltet stelnar vid afdunstning till en gummi-artad massa

utan tecken till crystallisation. Drar åfven fugighet åt sig ur luften och blir flytande.

*Vinsyrade Alkalit* är lättlost i vatten, i synnerhet med öfverskott på syra. Efflorescerar vid afdunstning.

Det egna Alkalit erhålles *Caustikt* om en blandning af det kolsyrade med omkring tre gånger så mycket släckt caustik kalk utröres med vatten till en tunn vålling och därmed kokas under flitig omskakning 5 å 6 timmar. Lösningen som nu innehåller alkalit caustikt, silas, inkokas till torrhet i silfver-degel och smältes.

Sådant jag på detta vis erhöill det, var det crystalliniskt i brottet, hade en brännande alkalisk smak alldeles som caustikt Kali eller Natron, men bibehöll sig oförändrat i luften utan tecken till deliquescering och var ganska tröglöst i vatten, likväl ej till den grad som det kolsyrade. Jag bör dock nämna att det erhållna alkalit ej var fullt caustikt, emedan det löstes i syra med utveckling af litet kolsyregas.

Det i fråga varande Alkalit skiljer sig förnåmligast från Kali och Natron genom sin utmärkta svårlosthet i vatten, genom sin egenskap att med Saltpetersyra och Saltsyra bilda deliquescenta salter och åndteligen genom sin betydliga större mättnings-capacitet samt deraf följande större syrhalt, i hvilket afseende det åter tyckes närma sig mera till jordarterne, serdeles Talkjorden, som jemväl åger egenskapen att med Saltpetersyra och Saltsyra gifva deliquescenta salter.

På Herr Prof. BERZELII tillstyrkan har jag kallat det nya alkalit *Lithion* af Grekiska ordet *λίθος* sten, efter som detta alkali först blifvit träffadt i Stenriket.



Af fyra särskilda analyser på Petaliten som jag anställt, har medelresultatet utgjort i hundradelar

Kiseljord . . . . . 79.212

Lerjord . . . . . 17.225

Neutralt svafvelsyradt Lithion 18.383

hvilka enligt här ofvan uppgifne

analys innehålla Lithion . . . . . 5.761

Kalkjord ett spår . . . . . 0.000

102.198

Spodumén åter har gifvit mig i hundradelar:

Kiseljord . . . . . 66.400

Lerjord . . . . . 26.300

Lithion . . . . . 7.950

Jernoxid . . . . . 1.950

102.600

Jag har icke velat belasta K. V. A. Handlingar med någon särskilt uppgift om sättet, hvarpå dessa analyser blifvit verkställda. Jag har åmnat att derom lemna en utförlig berättelse i 6:te Häftet af Afhandlingarne i Fysik, Kemi och Mineralogi, hvilket snart lär komma att tryckas.

# OM DEN SVENSKA

## Qvarantaines-Anstalten

### *på Kånsö;*

af

P. DUBB.

## I.

**D**å den ganska smittosamma och folködande Gula febern åren 1803 och i synnerhet 1804, så grusligen härjade Mallaga, Alicante och nästan alla orter på Spaniens södra kust, hvarifrån Sverige årligen hämtar sitt mesta Saltförråd; och då ganska många fartyg derifrån hemförväntades på hösten samma år, var det fruktansvärdt att de tillika kunde hemföra denna pestartade sjukdom, emot hvilken, Konungen ansåg Sveriges Innebyggare icke vara nog betryggade, så vida icke desse fartyg blefvo underkastade en noggrannare och strängare undersökning, än de dittills gällande Stadganden och försigtighetsmått föreskrefvo; och då vid den tiden handelsgemenskapen emellan Sverige och Norra Amerika, tillika började blifva mera liflig, var äfvenledes att befara, det ofvannämde sjukdom, som derstädes nästan årligen gör stora nederlag, lika lätt kunde påföras Riket, emedan fartygen derifrån ankomma på en lika om icke ännu kortare tid än ifrån Terra Vechia. Konungen beslöt derföre, att

genast inrätta en sträng och beständig Quarantaines-Anstalt, på det tjenligaste ställe vid Cattegat, så väl att förekomma möjligheten af Gula feberns införande i Landet, som åfven den Levantiska pestens, för hvilken de Svenska Skeppen i Medelhafvet, löpa åfven så stor fara, att af Turkiske kryssare eller undfångne varor erhålla en lika så vådelig, och mycket mera förödande, smitta att hemföra till Fäderneslandet.

## 2.

En Uthamn i Gôtheborgs Skårgård vid en obebodd större holme, *Kånsö* kallad, ansågs för tjenligaste stället till anläggande af en ordentelig Quarantaines-Anstalt; den ligger vid Cattegat, nära vid den allmännaste segelleden till Gôtheborg och något mer än 2:ne Svenska mil från staden; Hamnen är säker och rymlig, så att någre och 20 större fartyg kunna derstädes ligga på svaij. Utom på ett ställe vid inloppet till Wargö-håla, på Kånsöns södra sida, har ön rundtomkring så grunda siränder att intet fartyg och knappt en slup, kan landa annorstädes än på hamnsidan under ett högt berg, hvarifrån hela hamnen noga kan öfver ses och beskutas. Kånsön såsom privat egendom, kunde dock icke utan accord, dertill få användas, och detta mötte så mycket mera svårighet, som dispositionen var utaf Ågaren, enligt contract på 50 år, öfverlemnad till en man som där anlagt Sillsalteri och Trankok med ett Boningshus, för att där kunna uppehålla sig de månader Sillfisket kunde bedrifvas. Sillfisket hade våt några år redan varit i aftagande, men Kongl. Maj:t och Kronan måste dock förbinda sig till ett ganska drygt vilkor. Den förmohn vanns emedlertid, att lågenheterne å stället kunde tillika begagnas, hvarföre de istandsattes

och bereddades efter möjligheten i största hast till Magaziner och boning för Betjeningen, och ett litet tråhus uppfördes vid hamnen till Sjukhus och Observations-Sjukhus för Lotsar och sådane som kunde komma att arbeta uti Magazinet; en brygga till landnings-stället sattes ock uti stånd, åfvensom ett Batteri för 4 sexpundige kanoner anlades öfverst på den höga bergsklippan vid hamnen, tillika med ett Vagthus; Ordres och Kungörelser kringsändes och utdelades till alla Lotsar och Fiskare på kusten, som åfven befatta sig med inlotsning, att alla ifrån Medelhafvet ankommande skepp skulle föras till Kånsön. Svenska Handels-Agenten uti Helsingör och Konungens Befallningshafvande på Kusten, erhöillo underrättelser om dessa anstalter och Konungens befallning, att intet Skepp som ankom från Medelhafvet, skulle släppas igenom Öresund inåt Östersjön, eller uti någon annan hamn få hafva gemenskap med land, utan Sundhets-bevis af Quarantaines-Commissionen i Gôtheborg eller Christiansand; och om något skepp gått dessa anstalter förbi, skulle det dit afvisas och vid strångaste vite åläggas att begifva sig till ettdera. Ehuru redan sent på hösten, utsändes dock och stationerades armerade fartyg vid Kalfsund och inloppet till Udewalla.

## 3.

Sedan Kånsön blifvit Kongl. Maj:ts tillhörig, tillförordnades i Näder en Commission a) som skulle hafva sitt säte i Gôtheborg och hvilken ålades: „Att utan uppehåll och omgång befordra till verkställighet allt hvad rörande Quarantaines-Anstalterne så väl redan var föreskrifvit, som då eller se-

---

a) Den 27 Nov. 1804.

dermera föreskrifvit blifver, med rättighet tillika att i de händelser, då underdånig förfrågan eller hemställan, skulle medföra en, för allmänna säkerheten vådlig tidsutdrägt, sjelf vidtagna alla mått och steg till förekommande af smittans införande eller utbredande, som inträffande omständigheter kunde fordra."

- 1) Till Ordförande uti Qvarantaines-Commissionen, förordnades Öfver-Commendanten och Landshöfdingen uti Götheborgs och Bohus Län samt till Ledamöter:
- 2) Chefen för den vid Götheborg stationerade Kustflottan.
- 3) Chefen för Lotsverket på Vestra Kusten, som ock residerar i Götheborg.
- 4) En af de i Götheborg vistande Läkare.
- 5 & 6) Tvänne Handlande som tillika äro Skepps-Redare.

Kongl. Brevet den 19 Junii 1806, ålägger dessutom Landshöfdingen i Götheborg att alltid hafva öfverinseendet öfver Qvarantaines-Inrättningen och den dermed förbundne Ut- och Inrikes correspondencen. Till Commissionens biträde förordnades en uti Lagfarenheten kunnig Man att föra Protocoll och Correspondence; En sjöbefaren Man till Qvarantaines-Mästare på Kånsö, som till sitt biträde antog 2:ne drångar, och Direction antog till sin uppassning en Vaktmästare.

Som Kongl. Maj:t åfvenledes hade i Näder förordnadt en Läkare och en Chirurg, så var Kongl. Commissionen med dertill hörande Embets- och Tjenstemän, redan organiserad innan November månads utgång.

Alla



Alla de i andra Momentet vidtagne anstalter, blefvo äfven i Näder af Kongl. Maj: gillade och stadfästade; så att uti In- och Utrikes Tidningar kungjordes att en Qvarantaines-Commission var nedsatt uti Götheborg, och Kånsön förordnad till Qvarantaines plats för alla till Östersjön eller annan Svensk hamn åmnade Skepp, som komma från Mallaga, Södra Spanien och Vest-Indien i synnerhet, men äfven från andra smittade eller för sjukdom misstänkte orter, hvaribland de kring Medelhafvet belägne och Portugal, nu i synnerhet nämndes.

## 4.

För alla tillsförordnade och antagne Tjenstemän och Bejening, utfärdade Commissionen vederbörlige Instructioner för att gälla till dess den af Kongl. Maj: utlofvade Qvarantaines Förordningen, blefve kungjord. Likaledes utgaf den, Reglementariska föreskrifter huru ankommande Skepp skulle undersökas, inlotsas och signaleras samt uti Qvarantaine förläggas, äfven sätter att emottaga deras Documenter och att rapportera deras ankomst, huru de under Qvarantaines-tiden skulle behandlas och sedermera frigifvas till umgänge med land. Dessutom underrättades Kustens Innevånare, Lotsar och Dykeri Bejening, huru de skulle förhålla sig då Skepp funnos strandade eller drifvande uti sjön med sjuk Besättning eller af densamma öfvergifvits; likaledes om döda kroppar drefvo till Lands, huru de skulle med all försigtighet begravas, att ingen smitta derigenom måtte uppstå. Äfvensom en tryckt Berättelse utgafs för Skeppare och andre, huru och när man skulle verkställa de mineralsura rökningarne som blefvo dem ålagde.

## 5.

Den 7 Nov. 1806, utfärdades *Kongl. Quarantaines Förordningen* och den 19 Nov. 1807, *Règlementet för Tjenstgöringen på Kånsö*.

## 6.

Sedan Kånsön, igenom Kongl. Quarantaines-Förordningen *b)* blifvit utsedd till en allmän Quarantaines-plats för hela Riket, befalltes alla Utrikes varande Kongl. Svenska Handels-Agenter och Consuler att genast inberätta till Kongl. Commerce-Collegium i Stockholm *c)* och Kongl. Quarantaines-Commissionen i Götheborg, särskildt, så snart någon farlig och smittosam sjukdom utbrister i andra Länder och i synnerhet på den ort de vistas; tiden då den yppades och hurudan beskaffenhet den visar *d)* och vidare underrättelser 2:ne gånger i månaden, så länge sjukdomen fortfar, med tillkännagifvande om något Svenskt eller främmande Skepp, destineradt till Svensk hamn eller Östersjön, deraf blifvit angripit. Om Quarantaines Commissionen, antingen genom påminnelse ifrån Kongl. Commerce-Collegium, eller till följe af de, directe från Consulerne inkomne underrättelser, förbindes till utvidgad verksamhet i sin befattning, kungöres sådant, icke endast uti Stockholms Tidningar och Dagpapper samt ifrån Predikostolarne uti alla Kyrkor på kusten, utan äfven genom bref till Konun-

---

*b)* §. 1.    *c)* §. 2.

*d)* Enligt K. Brefvet af d. 17 Dec. 1817 till K. Comm. Collegium, angående dess fortfarande befattning med styrelsen af Quarantaines-anstalterne i Riket, äger samma K. Collegium att hädanefter iaktraga de årgälder som i följd af K. Förordningen d. 7 Nov. 1806 K. Coll. tillhöra; och att, för öfrigt, Convoy-Commissariatet har ensamt att fordra redogörelse af K. Quarantaines-Commissionen för de medel som ställas under dess disposition.

gens Befallningshafvande och Svenska Handels-Agenten i Helsingör, Lots-Contoiret, Dykeriet och vederbörande Magistrater, med tillkännagifvande om de Landskap och Städer som äro besmittade, eller hvilka böra för misstänkte anses; på det att inga derifrån ankommande fartyg må erhålla gemenskap med landet och landets Innevänare, eller gå igenom Öresund inåt Östersjön, så framt de icke förevisa Sundhets-pass, att de vid Kånsö eller Christiansand i Norrige, Qvarantaine undergått, utan i motsatt fall, till ettdera Qvarantaines-stället förvisas *e*); hvilken afvisning bör skrivas på Kongl. Commerce-Collegii fribref om det är Svenskt, men om fartyget är Utländskt, på Manifestet *f*). Skulle Handels-Agenten i Helsingör erhålla kunskap att något sådant fartyg, detta oaktadt, smygt sig igenom Sundet, bör han genast derom underrätta Konungens Befallningshafvande uti de Provinser som gränsa till Östersjön, och likaså Kongl. Commerce-Collegium och Kongl. Qvarantaines-Commissionen i Göteborg, bifogande den nogaste beskrifning han kan erhålla, på fartyget *g*); likasom han och Qvarantaines-Befälhafvarne i Sjöstäderna på Vestra kusten, skola till Qvarantaines-Commissionen och Landshöfdingarne i Malmö, Hallands och Göteborgs Län, genast inberätta att ett sådant misstänkt, eller verkligen smittadt fartyg är afvisadt, på det all oloflig gemenskap med detsamma må förekommas. Till så mycket mera säkerhet för Sveriges Undersätare, att icke blifva utrikes ifrån påförde någon smitta, förordnar Kongl. Qvarantaines-Förordningen, att Qvarantaines-Befälhafvare af Konungens Befallningshafvande böra tillförordnas uti alla Rikets Sjö- och Stapel-Städer, som skola

---

*e*) §. 3.    *f*) §. 9.    *g*) §. 2. mom. 4.

iakttaga allt hvad Kongl. Qvarantaines-Förordningen befaller och som på dem ankomma kan *h*).

Kongl. Reglementet för tjenstgöringen på Kånsö *i*); befaller dock, att Lewanten, Barbariska kusterne och Vestindiska Öarne samt Norra America, böra alltid anses såsom misstänkte orter för farlig sjukdoms smitta, och inga derifrån kommande fartyg åga frihet till umgänge med Landets Innevånare eller Kustens Åboer, utan alltid vara Qvarantaines-Commissionens uppmärksamhet underkastade, samt således förbudne att söka någon Svensk hamn och passera Öresund, utan att först undersökas vid Kånsö och af Kongl. Qvarantaines-Commissionen dertill erhålla Practica, utom hvilken, om icke ifrån Christiansand, de uti Öresund och andra hamnar och Städer på Vestra kusten, skola behandlas lika, som för smitta förande Skepp är befallt.

## 7.

Kongl. Qvarantaines-Commissionen förklarar uti 10. §. alla lefvande djur, skinn, hudar, ull, hår, fjäder, tagel, borst, silke, bomull, lin, hampa och blår för ämnen meddelande smitta, äfvensom allt som är förfärdigadt af dessa enkla ämnen och hvaruti de till större eller mindre del ingå; papper, böcker, rep och otfjåradt tågvirke, halm, sjösvamp, fnöske, mynt och medaljer m. m. som uti alla andra Europeiska Stater anses för smittbare, eller af egenskap att länge qvarhålla smitta, då de derföre varit utsatte, äro äfven för sådane ansedde; och bestämmer i grund deraf samt af den ort hvarifrån ett fartyg anländer, uti 7 & 8 §. §. om ett fartyg bör anses för misstänkt eller icke; om det till exempel har haft eller har sjukdom om

---

*h*) §. §. 1, 2, 3 & 12.      *i*) XVI. Art.

bord eller icke; om det haft umgänge med smittadt Skepp under resan, eller tagit personer eller varor om bord ifrån ett sådant; eller om det icke är försett med Sundhets-pass, är det strång Qvarantaine underkastadt.

## 8.

Alla fartyg som hafva eller haft sjukdom om bord, eller komma ifrån ställen der farliga och smittosamma sjukdomar härja, eller ifrån orter som anses för misstänkte, skola genom en särskild Signal, en svart flagga på förtopp och på stortopp då förtopp icke finnes, gifva sitt tillstånd tillkänna om det är Svenskt, eller med sin Nations flagg om det är Utländskt, då de nalkas Svensk kust och påkalla Lots *k*). Denne bör dessutom alltid efterfråga ifrån hvad ort fartyget kommer, och om det har sjukdom om bord; uti denna händelse får han icke gå om bord, utan måste inlotsa skeppet till Kånsö medelst förut seglande eller vid Lofwärts sidan, likasom med de fartyg, hvilka signaliserat sitt tillstånd med svarta flaggan. Skulle han dock i svårt väder eller eljest, icke tilltro sig på sådant sätt ansvara för Skeppets säkerhet, får han väl gå om bord, men också uthålla lika Qvarantaine med den öfriga besättningen. Utaf de Ordres Lotsarne bekommit, finna de äfven af den ort Skepparen kommer ifrån om fartyget skall anses för misstänkt för smitta eller icke, och i förra fallet äfven föra fartyget till Qvarantaines-platsen *l*).

## 9.

Då ett fartyg anländer till Kånsön, mötes det utaf Militaire - Befälhafvaren derstädes, eller utaf Qvarantaines - Mästaren, som uti sin Prejbåt i

---

*k*) Qvarantaines-Förordn. §. 8, mom. 3.    *l*) Qvarant. Förordn. §. 11.



Lofwart om fartyget, underrättar sig om Fartygets, Skepparens och Besättningens tillstånd och omständigheter samt anvisar det sitt ställe uti hamnen, allt efter som undersökningen bestämmer, om det skall behandlas såsom smittadt eller misstänkt *m*). Den som verkställer denna undersökningen, lemnar Skepparen derpå tryckta Exemplar af den anbefallde Ordning, Skepparen med sitt folk och passagerare skola iakttaga under Qvarantaines tiden, samt de frågor han skrifteligen skall besvara tillika med den Ed och försåkran, han och Styrmannen skola underskrifne återlemna, att intet dölja gods, eller något annat vid denna undersökning, utan redigt och sannfärdigt besvara de gjorda frågor och uppgifva allt som inom Skeppsbord befinnes. Dessa Blanketter som Qvarantaines Commissionen låtit öfversätta på Tyska, Engelska och Fransyska, att ingen okunnighet må förebaras, äro inneslutne uti en blåkläda som fästas vid en lång stake, för att kunna utaf Skepparen eller Styrmannen emottagas, och tillåges Skepparen att uti samma låda, tillika med de afiordrade svaren, afgifva sitt Sjöpass, Folkpass, Manifest, Connoissemens-, Måtbref och Sundhets-passen om han äfven har sådant på varorne eller ifrån Consuln. Sedan desse så väl som svaren och Eden, blifvit först väl genomdränkte uti Vinätticka, och något afdrupne, inläggas de uti blåklädan. Har ett så beskaffadt fartyg, att det hör undergå qvarantaine, inkommit af nöd, eller utaf föresats uti annor hamn, skall dermed förfaras på aldeles lika sätt af den der befintelige Qvarantaines-Befälhafvaren. Sedan Skepparen inlagt de omnämnde och med ätticka förut väl genomblötte papperen uti blecklådan, fäster han uti den ett så

*m*) §. 8. 10. Qvarant. Förordn. Reglem. Art. VIII, §. 1, 2, 3, 4.

långt snöre, att hon kan nedsänkas ett par alnar uti vattnet vid sidan af fartyget, hvarifrån den Undersökande med båtshaken inhalar den i sin båt och afklipper snöret tätt invid Lådan och far dermed till lands; sedan han först befallt hela Besättningen, och Passagerare, om de finnas, uppå däck och fram till relingen; ifrån sin båt öfversedt dem så godt som ske kunnat samt låtit dem förrätta åtskillige kroppsrörelser, för att öfvertyga sig om deras hålsa; utan att vidröra lådan med bara händer, inbringar Militaire-Chefen eller Qvarantaines-mästaren den, uti Undersöknings-rummet, hvarest han med pådragne Vaxdukshandskar och försedd med tjenlige verktyg, den öppnar och uttager Documenterne, blöter dem å nyo uti åtticka, med Instrumenter utvecklar dem, och antingen lagda på en tjenlig Rist, eller upphängde på Snören, låter dem våld afdrypa; hvarefter, och då de äro i det mesta torra, de berökas med Rökningens-ämnet N:o 1. n) dock med den varsamhet att icke skriften utplånas, och att han under hela denna förrättning låter vinden eller luftdraget komma sig på ryggen.

## 10.

Öfver denna undersökning författar den som henne förrättat, sin *Rapport* som tillika med alla Documenterne genast afsändas till Qvarantaines-Commissionen; efter Handlingarnes föranledande utsänder Commissionen antingen Qvarantaines-Läkaren med föreskrift af en ny undersökning, en eller flere personers afhämtande från fartyget till Sjukhusen, eller annorlunda efter omständigheterna, eller ock gifves en föreskrift till behandlingen för att verkställas af Qvarantaines-mästaren.

---

n) Se 12:te mom. nedanföre.

*Ordningen som uti Kånsö Hamn iakttages* vid fartygets ankomst och under deras Qvarantaines-tid, bestämmes omständeligen uti Reglementets IX Art. och uti Qvarantaines-Förordningens §. §. 4, 5, 19 & 20, så att inga andre fartyg få dit inlöpa, så länge Qvarantaines-Commissionen är uti verksamhet, än de som skola undergå Qvarantaine; och om något der befinnas, då smittadt eller misstänkt Skepp ankommer, åligger det detsamma att sig derifrån genast begifva o), eljest måste det der qvarblifva, till dess det ankomna undergått sin Qvarantaine och practica erhållit. Sedan Qvarantaines-mästaren anvisat det ankomna sitt ställe uti hamnen, antingen förtöjdt emellan Morringar och Ankare eller ock lagt det på Svaij, uti den utstakade linien, så att de smärre fartygen ligga innerst och de större utanföre; aflemnar det sin slup och båtar, hvilka införas uti Båthamnen, för att der under Qvarantaines-tiden rengöras och förvaras. Under Qvarantaines-tiden måste det om dagarne låta Qvarantaines flaggan svaija på för-topp, eller stor-topp om den förra icke finnes, och om nätterna en lysande lykta, hvilkas ombyte sker efter signal och skott från Batteriet; alla luckor på fartyget skola hållas ständigt öpne, utom på den tid Besättningen sofver. Till de uti Reglementet befallde rökningars verkställande, förskaffar Qvarantaines-mästaren materialier, så vida icke Skepparen är dermed tillräckeligen försdd. Skepparen måste afhålla sig, sitt folk och passagerare från allt umgänge med de andra Skeppen, och icke tillåta någon annan än Qvarantaines tjenstemän komma om bord, om ock någon båt skulle kunna ditsmyga sig utan att upp-

---

o) Qvarant. Förordn. §. 4.

täckas af Posteringen. Utom de anbefallte dagliga rökningarne måste med sopning och tvättning all möjlig renlighet och snygghet iakttagas, så väl i alla rum och ställen på skeppet, hvarvid soporne uppbrännas, som ock med Manskapet till både kroppar och kläder. Manskapets Gång- och Sångkläder bäras upp på däck och vådras efter rökningarne; hvad vidare skall iakttagas, förekommer med sine omständigheter då rökning, rengörning af varor, lossning, sjukes eller dödes transporterande, nedanföre omnämnas. Om nätterne gå Patrull-båtar flere gånger genom linierne, bevårade då folket på något fartyg visar olydnad eller bångstyrihet, för att efterse det ingen oordning må förefalla. Då Skepparen är i behof af Vatten, Proviant eller annat, vill aflemna bref eller dylikt, gör han signal med hissad flagga på Gaffel eller Sprit; Quarantaines-mästaren begifver sig då till Lofwarts-sidan om Skeppet, emottager med föreskrifven försigtighet hvad han vill aflemna och förskaffar honom eljest hvad han behöfver, på sätt Reglementet i IX. Art. §. §. 5 & 6, samt Kongl. Quarantaines-Förordningen §. §. 5 och 22 utsätta.

## 12.

*Rökning om bord*, på fartyg, skjer 3 gånger om dagen, enligt XIII. Art. i Reglementet; en timma före skaffningen, på det sätt, att på Skeppet ingen varit sjuk eller af sjukdom aflidit, såtes uti Kajutan p), Storrummet och Kabbelgattet, spilkummar med Rökningssämnet N:o 1, Saltsyregas (2 lod fint stött afbrändt koksalt uti hvardera, hvar-

p) Det undantag göres stundom med K. Commissionens tillåtelse, att kajutan icke rökes mer än 2 gånger om dagen, först på morgonen och sedan en timma eftermiddagen när den är ledig ifrån gods och varor.



på hållas  $1\frac{1}{2}$  lod stark Svafvelsyra). Sedan blandningen skjedd, begifva sig alla ut, rummen tillåppas samt öppnas först efter 3 timmar och vådras. Om rökning med Rökningens-ämnet N:o 2, Saltpettersgas, är ansedd för tillräckelig: (1 lod stark Svafvelsyra, hvaruti småningom inkastas 1 lod fint stött rent Saltpeter) så böra under denna rökning, alla lufdrag åfvenledes tillstångas, ehuru folket kan vara inne, eftersom denna ånga icke är skadelig för hälsan. Rökningens-ämnet N:o 3, syrsatt Saltsyregas, består af 5 lod fint rifvet och afbrändt koksalt, blandadt med 1 lod fint rifven brunsten, som sättes uti en spilkum öfver en lampa eller ett fyrfat med uppeldade brännkohl, och hvarpå slås 5 lod stark Svafvelsyra utblandad med  $1\frac{1}{2}$  lod destilleradt vatten. Men vid detta Rökningensmedlets användande, hvarvid alla öppningar likaledes väl tillåppas, får ingen människa vara närvarande. Det brukas därför icke utan i Magazinet vid varors rengörning och att befria rum för smitta der någon dött, samt vid Skepps rening då der varit sjuka och döende personer samt smittade varor befunnits om bord; dock ej förr, än Besättningen blifvit transporterad till Sjukhusen och Varorne till Magazinet. Dessa Rökningens-ämnen finnas färdige vid Qvarantaines-platsen till nytjande, åfvensom Qvarantaines-Förordningen uti 6 §. ålägger alla Handelsfartyg, som segla på Utrikes orter, att vara dermed försedde och med beskrifningen om deras användande. De äro då inpackade uti burkar, flaskor och lädor, påskrifne: Rökningens-ämnen N:o 1, 2 eller 3; till Pulfverne äro ett mått för hvardera slaget och för syran rigtiga glasmått; och derjemte Postlins spilkummar med smärre glasstånger eller afbrutna skaft af lerpipor att nytja till omrörning af tillblandningen.



Vid Qvarantaines-platsen gifves signal från Batteriet medelst en röd flaggas hissande, då rökningarne på fartygen skola verkställas; Chefen för Militaire-Bevakningen, eller ock Qvarantaines-mästaren genomfar linien på samma tid uti Patrullbåten, för att efterse om de på alla ställen verkställas. Sedan Rökknings-blandningarne blifvit på alla ställen och efter rummens storlek afpassade samt i tillräckelig mängd insatte och väl omrörde, samt alla öppningar och luckor tillslutne, få de icke öppnas förr, än efter 3 timmar, då de först skola utvådras, innan någon får dit ingå.

## 13.

*Om Varors rening af Qvarantaines-Commissionen* finnes nödig, så hafves afseende på huru stor del af lasten anses för smitta bringande, och den öfriga delen af sådane persedlar, som icke antaga och bibehålla smitt-ämnet i och för sig sjelf betraktade. Är den smitta förande delen af obetydlig mängd, och så beskaffad, att den medelst tvättning och vådring kan tillräckeligen renas på däck, såsom kläder *q*) efter en afliden, då sjukdomen väl varit af ett misstänkt utseende, men ingen annan deraf blifvit smittad, eller något annat af ringa mängd; så kan sådant tillåtas, sedan de under 3:ne dagars rökning uti det rum de beständigt legat, blifvit utsatte för Saltsyre-ångor. De delar af den öfriga lasten, som kläderne legat närmast, måste afven upptagas och renas på däck, genom piskning, vådring, tvättning och borstning; men då en större del af lasten är af smittbar beskaffenhet och måste renas, kan sådant icke ske utan genom en fullkomlig lossning eller urlastning af både smit.

*q*) Kläderne förbrännas i allmänhet, i synnerhet de som äro af Ull eller Silke.

tande och icke smittande ämnen <sup>7)</sup>. Då personer aflidit under resan och för smitta misstänkta sjuka finnas om bord vid ankomsten, ehvad fartyget kommer från ett af pest eller gula febern hårdadt land, ifrån misstänkt ort, eller ifrån ett ställe, hvarom man icke har någon misstanka, eller andra ån de bästa underrättelser om Sundhets-tillståndet, måste dock hela lasten anses för nedsmittad och lossas till rening. Då fartygets last skall renas i land, så måste den föras till Magazinet af Skeppets egen Besättning, så framt den dertill har styrka nog; åfven då varor skola förbrännas, aflämnas de till det anvisade stället utaf Skeppets Besättning <sup>8)</sup>.

## 14.

De sjuka, som befinnas på ett fartyg då det anländer till Qvarantaines-platsen, eller som sjukna om bord efter ditkomsten, föras utaf fartygets egen Besättning, genast till Lazarettet, eller Observations-Sjukhuset, efter Läkarens bedömmande utaf Rapportens innehåll, och åfven den undersökning han dessutom kan finna sig skyldig att göra, medelst Skepparens och Besättningens förhörande, då han på samma sätt och med samma varsamhet begifvit sig till fartyget, som Militaire-Chefen vid första undersökningen.

## 15.

Då någon dödt om bord, skall den åfvenledes utaf fartygets egen Besättning föras till lands, att begrafvas, eller uti hafvet försänkas, allt efter Kongl. Commissionens förordnande. Men personer som aflida uti Lazarettet, eller Observations-Sjukhuset, begrafvas af Qvarantaines-anstaltens Betjening.

<sup>7)</sup> Qvarant. Förordn. §. 18 mom. 6.

<sup>8)</sup> Regl. II. Art. 4 §., Kongl. Qvarant. Förordn. §. 24, 3. mom.

Qvarantaines-tiden uti hvarje särskild händelse, bestämmes efter tillståndet och omständigheterna vid första undersökningen *t*); men vid det minsta misstänkta förhållande under tiden, eller att vid undersökningen, som enligt §. 21. om bord förrättas, någon persedel finnes, som icke är angifven, eller om Skepps-Journalen, den så kallade Loggboken, innehåller annat förhållande om besök under resan eller uti någon hamn, eller hvad annat som då förtegit blifvit, eller ock att Skepparen icke noggrannt verkställer den anbefallde reningen om bord m. m., åger Kongl. Commissionen att efter bepröfvande förlånga Qvarantaines-tiden, eller förnya den efter omständigheterna; samt ställes Skepparen till ansvar för sådant oärligt förhållande efter §. 13. Kongl. Qvarantaines-Förordningen. Uti allmänhet förhålles sålunda: att

- 1:o Fartyg som uti Qvarantaine-Förordningens §. 7., anses frie för misstankar, men åro underkastade Undersökning innan de få fortsätta resan till destinerad ort, och ankomma till Qvarantaines-platsen i följe derutaf, eller ock såsom kommande ifrån de i XVI. Art. i Reglementet nämnde, för all tid misstänkte orter, blifva ålagde att uti 1, 2 eller 3 dagar berökas och vådras, hvarefter Last- och Loggbok undersökas utaf Qvarantaines-mästaren (som för denna orsak begifver sig om bord, efter en, 3 timmar förut, å nyo verkställd rökning), klädd uti tunna Vaxduks-kläder öfver hela kroppen, med handskar och mössa af samma tyg, hvilken med dragband fästes tätt vid huf-

---

2) 17 & 18 §. §. i Kongl. Qvarantaines-Förordningen.

vudet, sedan allt håret är under mössan vålinstoppadt. Sedan han noggrannt undersökt alla rum och ställen, låter han allt folket visa sig på däck, råknar dem och befaller dem göra hvarjehanda kroppsrörelser med hoppa, springa, åntra upp i Tacklaget och dylikt; fartyget åläggas derefter om allt år vål, 3 till 5 dagars Observations-qvarantaine, så vida det icke kan hänföras till 7 §. då det erhåller Practican genast, efter funnet godt och oklanderligt tillstånd. Sådane fartyg undersökas åfven efter en dags beräkning; men om ett sådant fartyg, år utom Sundhetspasset för Besättningen, åfven försedt med dylikt för last och gods, och Svenska Consulu detsamma bestyrkt med sin påskrift, erhåller det genast Practica. De fartyg, som anlånda från Norra America, kunna åfvenledes åtnjuta lika friheter, så snart Svenska Consulu på lika sätt bestyrkt förhållandet; likaså de, som komma från St. Bartholomée, Cadix, Lisabon, Porto och St Yves, eller directe utur Marseilles qvarantaine med Sundhets-pass, utan att under vågen sedermera hafva blifvit besökte ifrån andra skepp.

- 2:o Ett något när lika förhållande iakttages med de fartyg, som råknas till mom. 1, 2, 3, 4. uti Qvarantaine-Förordningens §. 8, dock med den skillnad, att sjuka personer föras till Lazarettet eller Observations-Sjukhuset, innan någon räkning börjas om bord. Om varorne skola lossas, för att renas, måste de, sedan fartyget uti 3 till 5 dygn, blifvit dagligen berökt, afföras till Magazinet, och för den öfriga Besättningens qvarantaine, får icke tiden beräknas förr, än från den dag de renade Varorne blifvit åter



inlastade, ehuru de verkligen varit uti Qvarantaines-tillstånd under hela tiden.

- 3:o Då ingen varit sjuk eller dött under resan, men fartyget kommer ifrån smittadt ställe och Lasten anses till någon del eller helt och hållet vara smitta gifvande; och Besättningen af sådan orsak begärar Af-mônstring; så måste de förut transportera sina Effecter och Varor uti Magazinet, och der förrätta deras rening, efter den föreskrift dem gifves, under Qvarantaine-Betjeningens inseende, sjelfve undergå dagelig rökning och badningar efter Läkarens föreskrift samt derefter Observations-Qvarantaine uti 15 dagar under sträng tillsyn, att ingen oloflig gemenskap plågas med Betjeningen eller andre, under någondera perioden.

#### 17.

Sedan alla sjuka blifvit afförda till Sjukhusen, gods och varor till Magazinet, företages *Skeppets rening*, som börjas med rökningar af Rökningens-ämnet N:o 3; Trenne dagar derefter sopas alla ställen mycket väl, balkar, trappor och däck afskrapas och soporne uppbrännas; derpå sker en noggrann tvättning och skurning med svabbar och kokhett vatten uti alla rum, och afsköljes derefter med Saltvatten. Under denna tiden insättes rökningsskålar med N:o 3, hvar afton uti alla rum, der intet folk vistas. Allt vattnet utpumpas, och vädningen fortfar till dess, att den uti Magazinet reade lasten, åter intages uti fartyget. Om frisk Besättning ankommer, eller den som under tiden varit uti Observations-Sjukhuset, eller arbetat med lastens rening eller åter-inlastning, derefter går om bord, måste den dock så länge hålla en ny Qva-



rantaine, som 8 till 30 dagar efter sista inlastningsdagen, eller så länge som de hålla sin Observations-Quarantaine, hvilka arbetat vid Godsets och Varornes rening, ompackning och åter inlastning, om desse varit dertill förhyrde främmande.

## 18.

Reglementet för tjenstgöringen på Kånsö, föreskrifver uti XII. Art., sättet huru lasten lossas utur fartyget, afföres till Magazinet och der införes och renas, enligt Quarantaines-Förordningens §. §. 10, 15 & 12, 4:de mom. samt åter till inlastning beredes. Om sjukdom eller kraftlöshet icke förhindrar Besättningen att användas till gods eller varors lossning och aflemnande uti Magazinet samt rening derstädes, bör den dertill i synnerhet användas; Lossningen beredes dermed, att fartyget återfår sin stora båt, eller ock en lastpråm af Quarantaines-Inrättningen, så framt fartyget går öfver 6 fots djup, ty eljest förtojes det vid qvainen utanför Magazinet, och får hjälp af den der befintliga hiss-krauen till utlastningen; 3 till 5 dagars rökning verkställes dessförinnan uti Storrummet i synnerhet; derefter upptages af lasten så många artiklar af Stryckgodset, som väl rymmas uppå däck, för att vådras, utvändigt tvättas och med svabbar och styfva borstar vål skrubblas, gnidas och borstas; Ullbalar omspännas med breda remmar och, lika som torra eller saltade hudar, buntas och i hafvet nedsänkas, men Bomullsbalor, rått Silke och Tyger, införas sådane de äro, uti Magazinet, sedan Omslaget eller Säckarne blifvit ett par dagar på däck, tvättade, vådrade och borstade. Ullbalarne upptagas efter 24 timmar på däck, för att låta vattnet afrinna, som medelst prässning emellan  
Bräder

Bråder med pålagde tyngder befordras, hvarigenom den inre delen uti Ullbalen får en fugtighet, som befordrar vattnets djupare intrångande i massan vid nästa nedsänkning uti sjön, som endast råcker uti 8 timmar; efter förnyad prässning på däck uti lika lång tid, nedsänkas de ännu en gång i sjön, för några timmar; upphämtas och prässas å nyö, så att det mesta vattnet är afrunnit, då de samma dag införas till Magazinet.

Hudar upptagas efter 12 timmar, bundten öppnas, och om några icke finnas angripne af vattnet, nedsänkas de å nyö; de upptagne upphängas till afdrypning, hvarest de uppläggas på Magazins-qvayen, hvarest de på båda sidorne starkt skrubb-las med svinbärs-borstar på 4 till 5 alnars långa skaft, under det att de jämt och samt afsköljas med sjövattnet, hvarest de inbåras uti Magazinet och hängde öfver stänger, utspännas med styfva stickor, så att halfvorne icke råka hvarandra; allt detta för-rättas med ryggen vänd mot vinden, eller luftdra-get uti Magazinet, och om Qyarantaines-Bejenin-gen der till användes, måste den vara klädd som uti 15 puncten om Qyarantaines-mästaren sagt är. Vid dessa förrättningar förmodas att Besätt-ningen icke löper någon fara, fastän den icke iklä-des Vaxduksklåderne, äidenstund deras med beck-olja och tjära indränkta kläder, böra anses för ett lika godt förvaringsmedel, endast håret väl instop-pas under hufvudklåden, väl inblöte med ättika, och de qväll och morgon, före och efter arbetet berökas med Röknings-ämnet N:o 1. Om nätterne skall stor-rummet, så länge urlastningen varar, hållas tillståndt, och Röknings-ämnet N:o 3 vara insatt uti flere spilkummar, allt efter rummets stor-lek. Vin, alla slags spiritus och liqueurer, äfven-

som allt tunne- och lakegods, renas endast utvändigt på fastaget, emedan innehållet anses fullkomligen fritt från smittämne. Omslag af mattor, dukar eller hvad annat som hindrar att åtkomma sjelfva kårillen, aftagas på Magazins-bryggan, efter förutgången vådring och tvättning på däck, med dagelig tvättning, skurning, vådring och omrullning, och då skrapor och borstar äro otillräcklige att mellan banden, kimmor, laggar och bottnar rengöra trådet, nyttjas kratsar af måssingstråd samt trågna afsköljningar med vatten.

## 19.

Alla balar och packor öppnas uti Magazinet med skårande instrumenter, sedan de blifvit upplagde på sina lafvar, hvilka nedanföre beskrifvas. På dessa lafvar utbredas alla varor, som icke hafva en så sammanhängande beskaffenhet, att de på stänger eller snören kunna upphängas; med långa harkor eller råfsor, med trådpinnar till tänder, reds ull, bomull, fjäder m. m. frie från alla tofvor och knutar, och jämt utbredas löst, till 6 å 9 tum höjd eller tjocklek. Då alla lafvarne på detta sätt blifvit fyllde med detta gods, samt tyger, hudar, otjåradt tågvirke, tvist, linne- eller bomullsgarn, silke i dockor och knippen, lin och hampa m. m. af mera sammanhängande beskaffenhet, blifvit upphängde på stänger, snören eller tåg, insättas inunder lafvarne 6 till 8 skålar eller spilkummar med Råknings-ämnet N:o 3, likasom flere efter omständigheterna uppsättas mellan lafvarne på små pelarebord för det, ofvan om lafvarne upphängda godset; hvarefter arbetsfolket, sedan det vid dessa tillställningar noga tillsedt, att ingen fara för eld kan uppstå, lemna Magazinet, så snart den syrsatte Gasen utvecklas, och igenstånga samt tillåsa dörren afven-

som alla luckorne på Magazinet. Påföljande morgonen öppnas luckorne och dörren, så att luftdraget blifver fullständigt; en half eller fjerdedels timme derefter, då all syrånga kan vara utvådrad, intråda arbetarne å nyo och omvånda det antingen på lafvar utbredda, eller på stänger upphängda godset. Det på lafvarne omvånda, piskas med långa spån, råfsas och redes samt utbreddes å nyo till en ny berökning; men vådras först hela dagen igenom tills emot aftonen, då Rökknings-skålarne N:o 3 åter påfyllas och på vederbörliche ställen uppställas. Denna och följande åfinar förfäres på samma sätt med alla luckors och draghåls tillstängning och dörrens tillåsning, innan arbetsfolket återgår till sitt rum uti Sjukhuset, för att der tvättas och badas, innan de undfå sin aftonmåltid. På 3 till 4 dygn förmodas, att varorne på detta sättet blifva tillräckeligen renade, så framt de icke varit nedsänkta uti hafs-vattnet, ty då måste såltan först uttvättas, innan de kunna blifva torra till inpackning. Att sorgfälligt uttvätta hafsvattnet från rå hudar och att vinna deras fullkomliga torrhet, gör man sig dock icke högst angelågen, så vida de icke skola transporteras längre bort, och således uti Skeppet kvarblifva flere veckor, då de kunde taga skada genom efterlåtenhet hårutinpan. Emedlertid, som godset på detta sätt handteras, är man omtänkt, att rena mat-tor, hudar, säckar m. m., hvaruti godset varit nedpackadt, så framt de anses dugelige; att dertill vidare nyttjas. Eljest tillagas nya omslag och de nyttjade uppbrännas. Reningen af dessa persedlar, är fotad på samma grunder som den för varorne beskrifne, och utfövas på ett lika sätt.

Salt utlossas icke utur fartyget, utan omskofflas om dagarne uti luftdrag, antingen medelst vaddersegel eller eldning nederst i rummet, och om



natten fylles rummet med syrångör, som sagdt är. Samma arbetsfolk förrättar äfven inpackningen och återförandet om bord. Ull, bomull och fjäder inpackas uti stora säckar, hvaruti en karl ställes, att medelst trampning, tätt ihoppacka varan.

## 20.

*Magazins-Byggnaden*, 68 alnar lång och 28 alnar bred, är afdelad uti 2:ne etager eller bottnar, den ena uppöfver den andra, längsefter hela huset, och i stället för fönster, försedd på alla sidor med lockor, hvilka öppnas och tillslutas utanför huset. Likasom Lazarettet och Observations-Sjukhuset, hvilka med detta ligga uti en rak linea, är det uppfördt af murtegel, utöfver vattnet inuti hamnen, på en, 360 alnar lång ständamn, som är anlagd tvårsöfver en liten vik, till 3 alnar högt öfver vanligaste vattenhögden. Dammen eller Jettéen är på 3 ställen afbruten med 6 alnars vida öppningar, för att isolera hvardera byggnaden och att hålla vattnet friskt inuti viken, samt med en 8 alnars bred och hvälfd öppning midt inunder Lazarettet eller sjelfva Pesthuset. Ifrån det närmaste huset åt väster, är afståndet 72 alnar, och afstångdt vid dammens början med en hög mur, försedd med en större port utaf jern; åt hamnen till, har Magazinet en lossningsbrygga af lika längd med huset, och försedd med Lossningskran; Ifrån det i Öster belägna Lazarettet, är det afskiljdt med en 6 alnar lång vindbrygga och ett afstånd af 55 alnar. Invändigt på nedra botten äro de omnämde Lafvarne uti 2:ne rader uppsatte, 5 uti hvardera raden; dessa bestå utaf 12 alnars långa och  $7\frac{1}{4}$  alnars breda bord af slåtthylade och sammanstämde bräder, med  $\frac{1}{2}$  tums vida hål der och hvar genomborrade, så afpassadt, att 4 stycken finnas uti hvarje ruta af  $\frac{1}{2}$ -dels alp.



Borden stå i aln högt från golvet, omgifne af en fast ram eller karm, af sammanplöjda och med ökar sammanslagne slåtthylade bräder, ställda på kant, rundtom hela bordet; denna ram går en half aln högt ofvan om bordet och lika långt nedan om detsamma, för att dels hålla godset qvar på bordet och dels för att på undra sidan innehålla syrångor-ne, så att de måste uppstiga genom borrhålen till godset och icke spridas derutom.

På den öfra botten kunna äfven lafvar uppsättas, då behofvet sådant fordrar. Starka stolpar äro på båda bottnarne uppreste och krokas insatte uti väggarne för att fästa och uppehålla de snören och stänger, hvar på hudar och gods, till rening och vådring upphänges u).

## 21.

*Lazarettet eller Pesthuset* ligger på den stora stendammen som nämnt är, 55 alnar uti Öster från Magazins-byggnaden; det är äfvenledes af murtegel, 45 alnar långt och  $19\frac{1}{2}$  alnar bredt samt 2:ne våningar högt; Öfra våningen innehåller 8 rum, hvilka, utom ett för Sjukvakten, äro alla ämnade till sjukskjötsel, och uti hopp att sjuknummern icke skall blifva synnerligt stor igenom ankommande sjuka, får man derigenom ett nödvändigt utrymme om smittan skulle gripa omkring sig inom huset, äfvensom att kunna förflytta de sjuke uti nya rena rum, så snart det liknar sig till bättring med någon. Den undra våningen innehåller likaledes 8

- 
- u) Efter en sednare Kongl. befallning kommer ännu en Magazins-byggnad af tegel, uti alle lik den förra, i rak linje med de öfriga byggnaderne, äfvenledes i år att uppföras på Östra ändan af den stora Stendammen, dels uppå den, och dels på fasta landet. Andanålet härmed är skyndsamheten, och att minst 2:ne Skepp må kunna på en gång få sina laddningar renade.

rum till boning för Läkare-Staten samt kök med skafferi, tvätthus, förrådskammare för Sjukhus persedlar, Apothek och uppässande Betjening samt ett badkar uti det medlersta rummet, till hvilket ledas kallt och varmt vatten igenom kopparrör med tappkranar. Med låsta dörrar både ofvan och nedan om trappan, försäkrar man sig för allt omgånge ifrån den ena till den andra våningen, som icke till tider och förhållanden äro bestående uti Reglementet för Läkare-skötseln, förplågningen och renhållningen. För öfrigt är allt så anordnad, att de sjuke och deras uppässare, kunna erhålla allt det som erfordras för skötsel och förplågning, utan något omgånge med kocken och den öfriga betjeningen vid husets oëconomie. Ofvanpå andra våningen är den stora vinden afdelad till flere behofver, såsom till reservoir för det vatten som behöfves till badningar och latrinernes afsköljande ifrån all orenlighet; till sjuksångarnes, bords och stolars rengöring, sång- och gångklåders vådring och berökning; till förvarande af rena och iståndsatta sjukhus-persedlar m. m.; hvarutom der är uppsatt den hissning-machine, hvarmedelst de sjuke transporteras ifrån första ankomsten till pesthuset, utur båten och uti sjuksången, utan att vidröras, m. m. För att gifva en allmän öfversigt af Sjukskötseln, må här anföras: Att då ett fartyg anländer med insjuknade personer uti farlig och smittosam sjukdom, skola de genast till Lazarettet transporteras; allt håret afklippes den sjuke om bord, så tät intill hufvudet som i hastighet ske kan, hufvud, hals och bröst samt händer och fötter tvättas med ljum åtticka, koyen nedtages hvaruti den sjuke ligger och nedhissas med honom uti den vid Lofwartssidan af fartyget liggande båten, under inseende af Pesthus-Läkaren eller hans medhjelpare; derifrån går då bå-

ten genast till pesthuset, inuti den öppning af en 8 alnars bred och hvålfad canal, som går tvärs igenom Stenkistorne, inunder Lazarets-byggnaden. Kommen till anvisadt ställe derstädes, midt inunder en 4 alnars lång och  $2\frac{1}{4}$  alnars bred lucka, fattas den derigenom nedsläppte trossen, på hvars krok läggas öglorne eller stropparne som finnas i hörnen af koyen, och patienten upphissas dermedelst igenom luckan och nedsänkes genast uti ett bredevid stående badkar, med 32 å 33 gr:rs varmt vatten. Med skårande Instrumenter aflossas klåderne från kroppen, hvilka med krokar, fästade på korrtta stänger, aftagas och dragas undan patienten utur karet. Vattnet aftappas genast utur karet och rent insläppes i stället, afpassadt till samma temperatur; om få minuter låter man äfven detta afrinna och under detsamma tvättas hufvudet och kroppen med aromatiserad åttika, hvarvid man närmare vågar nalkas den sjuke och kasta öfver honom en yllen badskjorta, och derutöfver ett slags Sele, hvilken dock förut är utbredd uti badkaret, innan den sjuke deruti nedsänkes; den är gjord af sadelgjordar, som gå under och omkring kroppen, hvilkens ändar, fästade uti den omnämnde hissmachinen, lyftar honom utur karet och upp igenom en äfven till öfra våningen gjord öppning; en bårsång står där tillreds, på hvilken han genast nedlägges och inbåres uti sjukrummet. Sjukvaktarne äro, under förrättningen, iklädde sin Vaxduks-beklädnad, och undvika sorgfälligt att insupa något af patientens andedrägt, samt att vidröra honom, utan icke högsta nödvändigheten sådant fordrar, ehuru deras händer äfven äro betäckte. Den nämnde selen blifver qvar uti sången och nyttjas till att dermed lyfia, vända och uppresa patienten, allt till dess krafterne tillåta honom umbära den, eller att han dör, då den tjenar

att nedhissa honom uti den båt, hvaruti liket bortföres, för att nedsänkas uti hafvet. Så snart tecken till båtning förmärkes, äfvensom eljest dageligen, då de sjukas antal kan sådant tillåta, förflyttas den sjuke uti ett annat, rengjort och med syrsatt Saltsyregas och utvådring, väl renadt rum. Efter en natts rökning med samma ämne, tvättas och skuras dagen derefter det rum han ditiills bebodt, samt med ytterligare rökning renas, och på sådant sätt omväxlas till dess han kan gå uppe, då han flyttas in uti Observations-sjukhuset, hvarifrån, om han der allt mer och mer tillfrisknar, så att krafterne tillåta honom, att för det mesta gå och sitta uppe, han förflyttas efter 10 à 12 dagar till Convalescent-huset.

Sjukrummen med gipsade tak och väggar med någon brungrön färjblandning uti, för att bryta den bjärta hvitheten som plågar och skadar den sjukas ögon och sinnen, äro hvartdera 58 kvadrat-alnar stora och 6 alnar höga samt försedde med kakelpagnar utaf murtegel, hvaruti luft-trummor äro anbragte emellan rörgångarne. Dessa luftrör äro af 2:ne slag, ett som öppnar sig med ena ändan inunder ugnen vid golfvet och med den andra uti någon af rörgångarne uti ugnen, så att det afför den luft som finnes nederst uti rummet; det andra har sin öppning utanför väggen uti fria luften, och går inunder trossningen inuti och igenom ugnen, samt öppnar sig upp inunder taket och ersätter således med ren, varm och frisk luft den, som igenom det andra och igenom sjelfva eldningen utdrages utur rummen. Dessutom äro ventiler, som gå ut genom väggarne ofvantill, tätt inunder taklisten, och neder vid golfvet insatte, bestående utaf kopparrör, hvilka äro försedde med lock, för att efter behag och behof kunna öppnas och tätt till.



slutas. De tvänne fönsterlusterne uti hvarje rum, börja 4 alnar från golfvet, och  $1\frac{1}{2}$  aln höga gå de ända upp mot taklisten, hvarigenom dagsljuset blifver mildare, rummen dragfrie och alla våggarne ledige till flere sjuksångars användande, då behovet så skulle kunna erfordra, samt all communication förekommen, att derigenom in- eller utpractisera något, som eljest så ofta händer vid sjukhus, oaktadt strängaste förbud och nogaste tillsyn.

Sjuksångarne stå alltid uppe på vinden, uti beredskap att nedflyttas efter behof. Ett par små bord och några trädstolar, utgöra för öfrigt husgerädet. Sångarne äro utan omhängen och ganska enkla, bestående endast utaf en fast ram på fyra, en alns höga stolpar, hvaruti en segelduks-botten är insnörd; men en tredjedel af denna ram, höjer sig mot ena ändan, så att dukbotten blifver der 10 tum högre än det öfrige, hvarigenom man får en hufvudgård, utan att behöfva uppstoppade dynor, en rund pöhl af 4 tums höjd och en filt, utgöra alla klåderne till en sång. En sådan sång är lättast rengjord och vigast att handtera. En lös slä åt hvardera ändan af  $1\frac{1}{2}$  alns längd, som emellan 2:ne fyrkantiga krampor kan utdragas och inskjutas bredvid ramens långsida, göra bårarmar att lyfta och bära sången med den sjuke uti.

Latriner finnas uti alla rummen innebyggde och försedde med vattenrör ifrån reservoiren på vinden, till orenlighetens afsköljande.

Det så kallade *Observations-Sjukhuset*; äfvenledes ett tvåvåningshus utaf tegelsten, ligger 55 alnar på hvar sida, eller midt emellan pest-huset och



östra ändan af den stora Stenbryggan, hvarpå desse hus äro uppförde och afstånges från landet med en vindbrygga, äfvensom med en dylik från Pesthuset. Det består utaf 4 rum i öfra, samt 3 rum och kök, som äfven nyttjas till tvättstuga, uti den nedra våningen. Uti öfra våningen hållas 2 rum i beredskap för dem, så väl af fartygens Besättningar som Qvarantaines-betjeningen, som ankomma sjuka, eller insjukna på stället, och icke hafva sådane symptomter som tillhåra pesten och gula febern, eller någon annan, igenom smittande egenkap farlig sjukdom. De andra tvänne rummen äro för Lotsar som anlända till hamnen på fartyg, mistänkte att medföra smitta, eller ock verkligen hafva den, äfvenledes för andra som blottstålla sig för smittångor; men de som arbeta med smittade skepps rengörning eller ock med dylika varors fram- och återförande, rening uti Magazinet och inpackning, utan att tillhåra det smittade skeppets Besättning, hålla början af sin Observations-Qvarantaine i 5 dagar uti det rum de bebodt uti Pesthuset under arbetstiden, innan de uti 10 till 30 dygn få fortsätta den uti detta. Uti undra våningen är ett rum aftaget för Sjukvaktarne och ett för Kokerskan med sin medhjelperska. Ett rum är ensamt ämnadt till gemenskap med Pesthuset, för att der inhemta Läkarens och Oeconomens skriftliga requisitioner, och att deruti aflemna alla de förnödenheter och underättelser, som Lazarettet och dess Betjening tarfva. Detta rum är derföre alldeles tillstängdt för alla, som icke äro Lazarett-Läkaren eller Qvarantaines-mästaren följaktige, hvilka endast hafva nyckel till hvar sin ingång i detta rummet. Ingen af dessa tvänne mån ingå utan på bestämde tider, eller efter gifvet tecken. Då till exempel Qvarantaines-mästaren hvar eftermiddag ditgår, för att aflemna

provianten för påföljande dagen, öppnar han fönstret för att utvådra hvad af syrängor ännu kan vara kvar uti rummet, sedan Pesthus-Läkaren varit der på föremiddagen, innan han låter dem som bära Proviant-persedlarne eller andra requirerade varor, ingå och aflemna dem. Då sådant är verkställt, inhemtar han uti en blecklåda de Rapporter och Requisitioner som Läkaren der aflemnadt, väl genomblötte med Vinättika, upphängde öfver snören till afdrypning samt kvarlemnar efter sig de bref eller förhållnings-Ordres som äro ämnade Pesthus-Läkaren eller andra personer uti Lazarettet; derefter, innan han utgår och väl tillåser dörren, framsätter han de rökverks-materialier hvilka Pesthus-Läkaren skall blanda tillsammans när denne är sinnad att gå derifrån. Sedan Qvarantaines-mästaren detta verkställt, låter han nedsläppa vindbryggan mellan Lazarettet och Observations-Sjukhuset, samt med klockringning gifver dem uti Pesthuset tecken, att afhämta varorne utur Communicationsrummet.

När Pesthus-Läkaren låtit afhämta hvad som för Lazarettets behof uti detta rum var inlagdt, igenstängt fönsterne som Qvarantaines-mästaren öppnat för vådringen, och kvarlemnadt sine och Oeconomens requisitioner och rapporter, sammanblandar han de utaf Qvarantaines-mästaren framställde Rökknings-materialierne och tillåser dörren efter sig samt ringer för att påkalla Vindbryggans upphissande och tillåsning.

Qvarantaines-mästaren brukar såsom förvaringsmedel emot smitta, utom sin beklådnad, vid tillfällen att han skall ingå uti rum der smittfånga kunde finnas, oaktradt alla tagne försigtighetsmåt deremot, att andas igenom ett glest kläde som blif-

vit blött uti krydd-ättikan och med en deruti invicklad svamp, indränkt med samma ämne.

Detta medel bruka Låkarne äfven, då de ingå uti sjukrummen, äfvensom Sjukvaktarne då de emottaga, bada och förflytta ankommande sjuke, eller förskaffa de aflidne utur huset. Vid Ull- och Bomulls-balars öppnande och utbredande på lafvarne i Magazinet, utom vid flere tillfällen, brukas dylika smitt-dämpare af Magazins-arbetarne och fartygens besättning.

Under det Qvarantaines-mästaren förehafver sina förrättningar uti Observations-Sjukhuset, besörjer militäira Bevaknings-Chefen, att ingen får passera öfver den åt landsidan nedsläppta Vindbryggan.

## 23.

*Convalescentshuset* innehåller endast 3:ne rum och Vakistuga uti en våning; Vindsloftet är afdeladt till Inventarii-persedlars vårdande. Detta, äfvenledes af tegel uppmurade hus, är beläget inpå holmen, uti en med löfirån planterad dal. De tillfrisknade, som få komma hit, åga vål sin frihet, att få vistas ute i luften, men få icke nalkas Sjukhusen, hamnen eller Magazinet; en viss tid är dem äfven föreskrifven till deras spatsergång. Vakten skall ansvara för, att de hvarken tidigare eller sednare åro utom hus, eller gå utom den för dem bestämda promenaden.

## 24.

*Mönstringshuset* är en liten Stenbyggnad på en klippa ytterst vid hamnen; det består endast af 2:ne rum, hvarutaf det ena är alldeles öppet på en sida, och har ingen annan gemenskap med det an-

dra än igenom tvänne fönster. Uti det öppna rummet samlas Skepps-besättningen, som genomgått sin Qvarantaine, och genom Inspection samt frågor mönstras utaf Qvarantaines-Läkaren, innan den erhåller sin Practica. Det yttre rummet tjänar äfven till den Provians- och förfrisknings-articlars aflemnande, som ifrån fartygen blifvit requirerade och hvilka de med eget folk och båt afhämta, som till detta ändamål blifvit dem utlemnad. Utom den vakt, som står på Batteriet, är äfven en man här posterad uppe på det platta taket, emedan öfver-sigten af Qvarantaines-husen och sjelfva Landgångsbryggan, som är derutmed belägen, så mycket noggrannare vinnes.

## 25.

*Boningshuset* för Qvarantaines-Läkaren, Militaire-Chefen och Qvarantaines-mästaren, är härintill nära beläget och har fri utsigt åt hamnen, alla Qvarantaines-byggnaderne och inåt gråsmarken och promenaderne; det är äfven utaf sten och tvänne våningar; Militaire-personalen för bevakningen, har ock här sin Casern i undra våningen, äfvensom Qvarantaines-drångarne och annat arbetsfolk. Redskapsrum, bagarestuga, kök och tvätthus, upptaga de öfriga lägenheterne.

## 26.

Denna beskrifning visar beskaffenheten utaf de Svenska Qvarantaines-anstalterne på Kånsö; och sådan den utaf Kongl. Qvarantaines Commissionen, redan år 1806, blifvit Kongl. Maj:it uti underdånighet föreslagen. Men så länge den utsedde Qvarantaines platsen var uti enskild mans ågo samt till en annan borthyrd för en längre tid, kunde icke sådane, som de nu beskrifne byggnader företagas,



emedan dertill erfordrades en fullkomlig ägande rätt och fri disposition öfver Kånsö Holme. Den vidlöftiga omgång som erfordrades, att för Kongl. Maj:ts och Kronans räkning förvärfva den, kom sent omsider till slut, så att Konungens Håga Stadfästelse derå erhöles den 1 December 1815, på det sätt, att Brännö Byamån, som voro samfällde ägare till Kånsön, erhöles en förmedling af sine hemman, uti Jordboken uppskattade till  $4\frac{1}{2}$  hemman, till  $3\frac{1}{2}$ , hvartill de från och med 1816 års början kommo att beräknas. Hvad åter angår det omnämnde arrendet deraf, så har Arrendator ännu 26 år igen, och då Inrättningen ansvarar honom för uppfyllandet af det ingångne Contractet, så hafva inga vidare hinder legat i vägen för Byggnadernes företagande, hvarmed ock början gjordes i Maji månad 1816, och blifvit fortsatt med den kunskap, nit och drift af Herr Majoren vid Kongl. Fålmåtnings-Corpsen och Riddaren af Kongl. Svårds-Orden, JACOB FONSSELL, att endast en del af Inredningen återstår för nästa år.

## 27.

Då Fartyg med pest, gula febern eller annan åfventyrlig sjukdom anlåda till Quarantaines-platsen, och den der varande bevakningen anses för otillräckelig, åger Commissionen rättighet, att ifrån den, ungefärligen 1 mil derifrån stationerade Västra Kust-Escadern, requirera ett eller flere bevärade fartyg till biträde uti hamnen; åfvenledes kryssare, då säkra underrättelser inlöpa, att dessa högst farliga sjukdomar utbrustit på sådane kuster Utrikes, hvarifrån Svenska eller främmande fartyg äro att förvänta, och obemärkte skulle kunna gå Kånsön förbi och inåt Östersjön, om de icke igenom dem underrättades om sin skyldighet.



Med Svenska fartyg borde man dock hådanefter minst hafva att befara sådane sjukdomars hitförande, sedan Kongl. Qvarantaines-Förordningen uti 5 & 6 §. §. strängt befäller alla Skepps-Redare att förse sine utseglande fartyg med sådane Rökning-materialier, som vid Qvarantaines-anstalten brukas, och beskrifning på deras användande; att vara försedde med blåck-lådor och tänger och andre Qvarantaines-persedlar, samt med Kongl. Qvarantaines-Förordningen, som anbefaller dem, att vid framkomsten till främmande orter, underrätta sig om Sundhets-tillståndet derstädes, att alltid låta förse sig med Sundhets-pass, åfven på varorne, och så vidt möjligt blifver, undvika all smitta.

## 28.

*Taxan*, hvarefter Qvarantaines-avgifterne betalas, utgör den XIV Art. uti Reglementet. Den är beräknad efter Skeppens storlek samt den större eller mindre fara, som deras innehafvande last kan medföra, som ock efter den större eller mindre försigtighet Skepparen iakttagit; Sålunda betalar ett fartyg sine Qvarantaines-avgifter efter de olika omständigheter, hvaruti det, enligt Qvarantaines-Förordningen, finnes, ifrån 6, till och med 36 skill. p:r Låst. Varornes rening äro taxerade p:r Skeppund, ifrån 6 till 32 skill., då de renas uti Magazinet, men endast hälften, då de renas om bord; oberäknadt Rökning-materialierne, som särskildt betalas, åfvensom 24 sk. p:r dag i arbetspenningar till hvarje Qvarantaines dräng. För Fastager, som innehålla flytande varor, betalas från 12 skill. till 1 R:dr p:r stycke. Sjukvården i Lazarettet betalas med 12 skillingar p:r dag. Fartygens rening betalas åfvenledes efter deras storlek ifrån 12 till 36 skill. per Låst, för hvarje rökning. *Taxan* utsträc-

ker sig åfven till Magazinet hyra: när ett fartyg med misstänkte eller smitta innehållande varor lossas, och desse efter reningen förvaras någon tid uti inrättningens Magazin, på det att fartyget, uti vissa handlingar, må kunna afsegla efter erhållen rening och besättningens fullbordade Qvarantaine; då betalas för hvarje Skeppund ifrån en half skill. till 4 skill. p:r vecka.

Practican betalas dessutom med 2 R:dr.

Dessa afgifter äro alla uti Banco och ifrån Januarii 1816, förhöjde med 50 procent.

Om

# TEKNING

af en ny art Myr - Ätare eller  
Bälta ifrån Brasilien;

af

C. P. THUNBERG.

I bland de Däggande, fyrfotade Djuren förekomma tvänne Genera ganska besynnerlige, nemligen: *Manis* och *Dasyur*. Den förra liknar fullkomligen en Ödla med sin långa, smala och med benhårda fjäll betäckta kropp och stert. Den sednare kommer öfverens med Sköldpannan, i anseende till sin hårda af ringar sammansatt sköld, som betäcker hela öfre delen af ryggen och sidorna. Denna benhårda betäckning skyddar Djuren emot deras fienders våldsamhet. Desse Djurslägten, liksom *Myrmecophagæ*, (egentlige Myr-ätarne), gräva sig hålor i jorden, vandra ut om natten att söka sin föda och lefva allmänna utaf myror.

*Dasyti* hela slägte tillhör ensamt Amerika, och förnämligast den södra delen deraf. Dess arter äro flere, och sannolikt åtskillige af dem söga eller ofullkomligt kände. Den sköld, som betäcker kroppen, består på ytan af fyrkantige eller femkantige rutor, merendels ställda uti ordentlige

K. V. A. Handl. 1818. St. I.

rader eller ringar, hvaraf någre midtöfver ryggen äro större och mera utmärkte. Utaf desse större och tydeligare ringar hafva Auctorerna uppställt (charactererne) skiljemärken emellan (species) arterne, ehuru ringarnes antal ofta är svårt att bestämma. Enligt Auctorernes uppgifter skola klor- nes antal på framfötter och bakfötter vara olika till antalet, så att somlige hafva palmæ tetradactylæ, och plantæ pentadactylæ, då åter andre hafva öfverallt fem stora och hårda klor, hvaraf de med- lersta alltid äro de största och längsta. Öronen äro på de fläste uppstående, aflånge och trubbiga. Svansen är mycket olika, alltid kortare än kroppen och spetsad emot ändan. Skillnaden emellan arter- ne af detta släkte synas mig förnämligast böra sö- kas och tagas utaf de större och bredare ringarne, af klorne, öronens skapnad, samt af svansens utse- ende och längd. Uti Museer förekomma ej alltid hela specimina af dessa djuren. Stundom förekom- ma der endast sköldarne, då inga kännetecken kun- na ågas af hufvud, öron, svans och fötter, och så- ledes arterne icke fullkomligen eller med full sä- kerhet utstakas och bestämmas.

Båltornas arter förtjena således att närmare un- dersökas, beskrifvas och teknas för att lemna en säkrare och fullständigare kännedom af detta den nya världens besynnerliga djurslägte.

Ibland de sex daggande djurs hudar, som åtföljde General-Consulen och Riddarens WESTINS fogelsamling, till Upsala Academi's Natural-Muse- um, voro tvänne species af *Dasypus* slägte. Det ena deraf är otvifvelaktigt *Dasypus septemcinctus* och det andra ett okänt species, som jag låtit afrita och beskrifvit under namn af *DASYPUS mul- ticinctus*, i anseende till sine talrike och öfver hela kroppen alldeles lika beskaffade ringar. *D. septem-*

*tinetus* har öronen aflånge, trubbiga, af nästan en tumslängd. Svansen är trind, beständigt aftagande i tjocklek ända till spetsen, som är nästan trådsmal; dess längd är något mer än halfva kroppens, eller vid pass 6 tum. Ringarne på den äro tydeligare och mera upphöjde närmare kroppen eller vid basis, 5 eller 6 till antalet, hvardera med tvänne rader fjäll; sedan följa vid pass nio mindre upphöjde ringar, hvardera af endast en rad fjäll; och vidare till spetsen äro fjällen ömsom liggande utan att utgöra ordentelige ringar. Hela skölden har trenne afdelningar; den första ifrån hufvudet till en tredjedels längd af kroppen, består af 1; ringar, som hafva rundade fjäll med smärre fjäll strödde emellan sig: den yttersta delen ifrån svansen till en tredjedel af kroppen är i det närmaste lika med den förra, bestående utaf 15 eller 16 ringar med rundade fjäll och smärre fjäll inströdde. Den medlersta delen, som utgör en tredjedel af kroppens längd, äger 7 till 8 större tydeligare bälten utaf aflånga rutor, utan inblandning af smärre fjäll. Framfötterna äro väpnade med endast fyra klor och baksfötterna med fem, hvaraf tvänne på båda ställen sitta på baksidan och räckta icke ned till jorden samt äro äfven mindre. Hela djurets tjocklek är, som en vanlig katts, och längden ifrån hufvudet till svansen af vid pass 9 eller 10 tum.

Det andra species, som i anseende till sine talrika sköldringar är så mycket utmärkt och vida skildt ifrån dess samslägtingar, anser jag vara nytt och hos Zoologerne hittills okänt, samt således förtjena att närmare granskas, beskrifvas och teknas. Mine försök i denna del utbeder jag mig i ödmjukhet måtte af Kongl. Vettensk. Akademien med välbehag blifva ansedde och emottagne.



Hela djuret är rostfärgadt och kroppen har den tjocklek, som en vanlig katt; längden går till fulla 12 tum ifrån nosen till svansen. Framfötterna äro en och en half tum länge och bakfötterna nära trenne tum. Deremot äro klorna på framfötterna större och längre än på bakfötterna. På framfötterna äro klorna fem, hvaraf de medlerste äro bredare och längre af en och en half tums längd; på bakfötterna äro de äfven fem, mera kullrige och knappast en half tum långa. Lären och buken äga glesa, hvitaktiga hår. Svansen är emot kroppens längd mycket kort af vid pass 4 tums längd, tjockare vid basen och trind, spitsad emot ändan. Hufvudet är mycket smalare än kroppen, afspitsadt framåt, af två och en half tums längd, öfverallt betäckt med hårda, rutiga fjäll. Hela den öfriga kroppen är betäckt öfverallt, ända ned till sidorna der buken vidtager, med 28 ordentliga ringar eller bälten, utom trenne, som tyckas höra till halsen. Desse kroppens ringar äro afdelte uti fyrkantiga rutor utan någre fjäll emellan dem inströdde. Sålunda skiljer sig denne artens sköld ifrån alla andras, ganska märkeligen. Sidorna af lären och fötterna äga smärre och i rader stälde rutor. Öronen äro äfven på denna arten olika andre arters, emedan de icke äro aflänge utan alldeles rundade och skål-like.

Denna nya artens character synes blifva: *DASYPSUS multicinctus: tingulis XXVIII aequalibus; auriculis rotundatis; palmis plantisque pentadactylis.*

Figuren är tagen i half-naturlig storlek.

---

NÅGRA NYA  
Genera och Species af Insekter;  
beskrifne af  
J. W. DALMAN.

---

I. NYA GENERA.

I. **A**GAON \*).

*Character generis essentialis:* Os minutum apici capitis plani insertum, mandibulis quadridentatis, et

*Lamellis duabus lanceolatis, inferiorem capitis paginam tegentibus.*

*Antennæ insertæ ante medium frontis horizontalis, articulo primo maximo sub-securiformi, intermediis parvis tenuissimis, apicis 3 incrassatis.*

*Species 1. Agaon paradoxum; testaceus imaculatus, oculis nigris.*

Hab. in Sierra Leona, Dom. Prof. Ad. Afzelius. Mus. Dom. Schönherx \*\*).

\*) Nomen a Græca voce *αγᾶος* admirabilis.

\*\*) De exemplar af denna och flere Afrikanska Insekter dem jag haft tillfälle att granska, finnas i Hr Commerce - Råder C. J. Schönherr's rika Samling, åt hvilken de blifvit meddelade af Hr Prof. Ad. Afzelius, som uppträckt dem på Sierra Leona, och benäget tillåtit mig beskrifva och afteckna dem,

Insectum valde singulare et paradoxum, cujus non nisi unicum vidi specimen, cujusque ob nimiam partium exiguitatem explicatio, hoc opus hic labor. — Corpus, capite excepto, vix *Diplolepi ramicorni* majus, totum testaceum, non nisi oculis caudaque nigris. Caput maximum elongato quadrangulum, lineare, latitudine fere plus duplo longius, horizontale, basi emarginatum, apice truncatum, lateribus rectis; glabrum nitidum, disco profunde impresso, ibique in fundo subcanaliculatum. *Oculi* laterales, oblongi, depressi, nigri, haud procul a basi capitis inserti.

*Os* minutissimum in apice capitis subtus situm, mandibulis duobus minimis, corneis, subtriangularibus, latere interiore 4-dentatis. *Palpos* detegere non valui; sed media capitis pars subtus tegitur *lamellis* duabus reflexis, quæ ad mandibularum basin insertæ; sunt elongatæ, sublanceolatæ, capiti arte applicatæ et basin ejus attingentes, parallellæ, relicta rima angusta intra illas.

*Antennæ* capite thoraceque vix longiores, ante capitis apicem superne insertæ, ad foveolam disci, basi approximatae. *Articulus primus* maximus, latere exteriori angulato-dilatatus, ut sub-securiformis evadit, valde compressus, horizontalis, glaber nitidus; articuli proxime insequentes tenuissimi, breves, pilosi (quare numerum eorum indicare nequeo); antennarum vero apicalis pars formatur ex articulis tribus magnis sub-globosis, hirsutissimis, clavam elongatam constituentibus.

*Thorax* latitudine capitis, sed dimidio capitis sub-brevior, antice in medio nonnihil sinuato-productus, postice linea obsoleta bisinuata a metathorace distinctus; lateribus utrinque spinulis duabus minutis armatus, quarum prima in medio, altera paulo ante alarum insertionem; supra parum con-

vexus, glaber, nitidus. *Metathorax* latitudine thoracis, eique arcte applicatus & concolor, — in nostro specimine acu mutilatus.

*Abdomen* capite longius, sub trigono-conicum; seta anali supera longitudine capitis thoracisque, nigra, et spinula sub-anali acuta nigra, parum ultra apicem abdominis prominente.

*Pedes* testacei, graciles, mutici, subglabri, femoribus sub-clavatis, tarsis elongatis (ut videtur 5 articulatis).

*Alæ* 4 albedo-hyalinæ; anticæ latiores, statuta et facie fere ut in *Diapria*, lineola stigmatica paulo pone medium costæ, et rudimentis nervorum basaliū atqve longitudinalium non nisi obsoletissimis, haud manifestis, margine exteriori, & costali baseos, ciliatis. *Alæ* posteriores valde angustatæ, margine postico ciliatæ, enerves videntur.

Descriptione allata exploratum erit Insectum hocce ad Ordinem Hymenopterorum pertinere. Ad familias et *Diplolepidum*, et *Codrinorum* accedere videtur, ob ani structuram priori forte associandum.

#### *Förklaring af Figurerne, Tab. II. A.*

Fig. 1. Naturliga storleken af *Agaon paradoxum*.

— 2. Densamma sedd från ryggen, mycket förstörd.

— 3. Abdomen med dess seta och spinula analis, sedd från sidan.

— 4. Hufvudet samt det egentliga Thorax, sedda från ryggen, i utmärkt stark förstoring.  
Deraf äro:

- a. a. den linea som skiljer thorax och metathorax.
- b. den bakre spinula i kanten af thorax.
- c. dess främre spinula.
- d. ögat.

- a. förskuggningen utmärker den djupa intryckningen ofvanpå hufvudet.
- f. första antenn-ledens insertion.
- g. dess yttre vinkel.
- h. de mindre, otydliga, antenn-lederna.
- i. de tre yttersta stora antenn-lederna.
- 5. Hufvudet och thorax, sedda från undra sidan.
  - a. frambenens insertion.
  - b. b. de tvänne långa lamellerna som ligga tryckta åt hufvudets undre sida.
  - c. deras fäste vid mandiblernas rötter; de små mandiblerna märkas ofvanföre, på inre sidan 4-tandade.
- 6. Samma figur som den förra, endast att den ena lamellen visas uppviken, så att så väl dess inre yta blifvit synbar, som äfven en svag intryckning på hufvudet, der hvarest lamellen förut legat.

## II. CELYPHUS \*).

*Character Generis:* Os haustello absque proboscide.

*Clypeus* subperpendicularis, nudus, apice late emarginatus.

*Antennæ* porrectæ, compressæ, seta crassa, compressa, articuliformi.

*Corpus* ovato-hemisphæricum, scutello maximo, fornicato, abdomen totum alasque obtegente.

*Descriptio generica:* *Antennæ* tronis medio insertæ, 3 articulatae. *Articulus* primus tenuior obconicus, secundus cyathiformis, brevis, tertius conoideus, compressus, basi præcedenti arcte applicata. *Seta* magna, sublanceolatula, ante

---

\*) *Ἀ κέλυφος* cortex nuclei e. gr. Amygdalarum (ob. faciem scutelli corpus tegentis).



apicem articuli tertii illi inserta, valde compressa, in setulam brevem pubescentem desinens. *Clypeus* subperpendicularis, longe infra oculos descendens, antice late sed non profunde emarginatus, apertura oris magna. *Hau-stellum* magnum, carnosum — retractum. *Corpus* parvum, ovato-hemisphaericum, muticum; capite parvo transverso, thorace transverso, brevi; scutello maximo, fornicato, dilatato-rotundato, abdomen totum alasque obtegente. *Alarum Nervi* fere ut in *Lauzanis*. Nervus costalis paulo ultra apicem alae extenditur, ibique cum nervo longitudinali quarto conjungitur; margo interior alae nullo nervo cingitur. Nervus auxiliaris duplicatus, ad medium costae usque extensus. Nervus longitudinalis secundus ante apicem alae arcuatim in costam finitur, tertius in apice; et quartus pone apicem alae nervo costali junctus, quoque pone medium alae, ope nervuli brevissimi transversi, cum nervo tertio connectitur. Nervus quintus ante marginem angulo recto reflectitur, ad nervum quartum adgrediens, et cum illo areolam magnam, basi angustatam, format.

*Species 1. Celyphus obiectus*: corpore antennis pedibusque ferrugineis, thorace supra violaceo, laevi; scutello maximo fornicato violaceo, coriaceo.

Hab. in India Orientali, Dom. Johan Lund.

Mus. Dom. Schönherr; eodem loco D. Silfwerswård. Mus. Dom. Gyllenhal.

Animalculum primo intuitu facie fere *Tetyra* parvae ob scutellum maximum; unicum exemplum in *Dipterorum* ordine huc usque detectum \*). *Corpus*

---

\*) Nullo modo cum *Canopo* Fabr. Rhyngor. confundendus.

magnitudine *Henopsis gibbosi*. Antennæ pallide ferrugineæ l. testaceæ, apice obscuriores. Caput transversum, perpendiculare, thorace angustius, testaceum, glabrum, nitidum; in medio frontis lineola transversa impressa, arcuata. Apertura oris late sed non profunde emarginata, omnino nuda. Haustellum basi testaceum, apice fuscum. Vertex ocellis tribus conglomeratis obscuris, ad latera setulis perpaucis. Oculi laterales, oblongi, prominuli, in vertice late distantes, mortuis pallide-glauco. Thorax transversus, longitudine multo latior, antice angustior truncatus, angulis subcallosis prominulis, basi truncatus angulis deflexis, lateribus in medio nonnihil angulatus, valde convexus, glaber nitidus, omnino impunctatus; violaceus, lateribus sub-rufescens. Scutellum maximum suborbiculare, basi summa tantum truncata, marginatum, omnino fornicatum, ut hemisphaericum videatur, totum cyaneo-violaceum, glabrum, nitidum, antice lateribusque profunde coriaceum, dorso postico lævi; subtus valde concavum, non vero omnino vacuum, sed potius membranula concava clausum videtur. Corpus subtus testaceum, glabrum, nitidum impunctatum, abdomen dorso planum, posterius rotundatum, podice magno deflexo, e segmentis tribus marginatis formatus, anali parvo rotundato mutico. Sexum exemplaris nostri determinare nequeo. Pedes corpore concolores, simplices, postici reliquis paulo longiores; femora antica latere inferiore pilis paucis magis conspicuis ornata, ceterum, ut tibiæ, omnes, non nisi brevissime & parcius pilosulæ. Tarsi tibiis longiores, 5 articulati, articulo basali reliquis simul sumtis longitudine æqualis. Alæ longitudine thoracis scutellique, hyalinæ, margine costali apiceque lutescentibus, nervis fuscis, directione ut supra indicatum; insecto quiescente ad maximam partem a

scutello tectæ. Halteres breves, clavati, lutescentes, sub basi scutelli occultati. Squama subalaris nulla, quantum ego detegere valui.

Methodo systematica locum forte obtineat in familia *Ortalidum* primum, ante *Diopsin* 1. *Sepedonem*.

På Tabellen II, B. föreställer:

- Fig. 1. Naturliga storleken af *Celyphus obtectus*.  
 — 2. Densamma sedd från ryggen, förstorad.  
 — 3. Densamma sedd från sidan, förstorad.  
 — 4. Hufvudet sedt framifrån, i ökad storlek.  
 — 5. En antenn, mycket förstorad.

### III. DIRHINUS.

(Ex ordine *Hymenopterorum*. Fam. *Diplolepidum*).

*Character Generis*: Os inflexum, mandibulis productis acuminatis, apice 2 l. 3 dentatis.

*Antennæ* fractæ, (10-11 articulatæ,) insertæ medio frontis sub oculis, in sulcum capitis profundissimum retrahendæ.

*Caput* supra horizontale, antice productum, profunde bifidum, sulco magno ad stemmata usque divisum, fronte infera oblique descendente.

*Corpus* elongatum, abdomine petiolato, femoribus posticis incrassatis maximis; alarum nervis, præter costalem, nullis manifestis.

Genus maxime affine *Chalcidi*, statura tamen magis elongata, et forma capitis deflexi præsingulæ, unde antennarum insertio & occultatio aliena. Os quam in *Chalcide* magis productum et acuminatum, intra basin pedum anteriorum inflexum. In-

strumenta cibaria interiora examinare mihi non successum. Locus in Systemate: pone *Chalcidem* ante *Eurytomam*.

Etymologia a *ῥίς* bis & *ῥίγν*, *ῥίγος*, nasus.

*Species: 1. Dirhinus excavatus*: corpore punctatissimo atro, pedibus posticis concoloribus; antennis pedibusque anterioribus ferrugineis.

Hab. in Sierra Leona Africes. Dom. Prof. A. Afzelius. Mus. Dom. Schönherr. In India orientali. Dom. Kymell. Mus. Dom. Gyllenhal.

Magnitudo *Stigmi minuti* Panz. Caput et truncus atra, undique confertissime rude punctata, pube pallida sericea parcius adspersa. Caput magnum latitudine thoracis, superne visum horizontale, basi angustiore profunde emarginata, antice productum in lobos duos acuminatos margine omni elevato. In vertice stemmata 3-distincta, quorum anteriorius in margine sulci. Caput a latere visum subtrigonum, fronte obliqua deflexa. Oculi rotundati, laterales, nonnihil prominuli, in mortuis glaucopellucidi, nitiduli. Sulcus profundissimus caput antice dividens, usque ad medium ejus excisus, antennarum caulem, majoremque partem flagelli, excipiens et occultans. Antennæ ferrugineæ, vix visibiliter pallide-pubescentes, simplices, statura ut in *Chalcide* & pluribus hujus familiæ. Thoracis lobus anticus (collare,) transversus, antice sinuato-productus, lateribus subrectis, postice emarginatus; lobus medius paulo latior, dorso utrinque sulco obliquo arcuato impressus; lobus scutellaris semiovalis apice rotundato mutico; — omnes conferte æqualiter punctati. Metathorax subplanus, costis nonnullis divisus, utrinque obtuse-unidentatus, versus abdominis insertionem angustatus, ibique impressus. Abdo-



men thoraci multo brevius, petiolo brevi striato\*); ano rotundato, subtilissime pallide-pubescenti, retracto. Pedes anteriores breves, ferruginei, femoribus clavatis, medio nonnihil infuscatis, tarsis dilutioribus. Pedes postici maximi nigri, coxis elongatis glabris, femoribus crassis lenticulatis, subius pone basin dente minuto armatis, ceterum vix nisi omnium subtilissime crenulatis; tibiæ tenues arcuatæ, subulatæ, nigræ; tarsi tenuissime testacei. Alæ infuscatae, nervo-punctoque costali ordinariis fuscis; ceterum nervorum non nisi obsoletissima vestigia. Tegula humeralis lutescens.

*På Tabellen II, C. föreställer:*

- Fig. 1. *Dirhinus excavatus* förstorad, jemte mått af dess naturliga storlek.
- 2. Densamma sedd från sidan.
  - 3. Hufvudet sedt framifrån, nerifrån, för att visa pannans djupa utgröpning och antennernas fäste. (Observeras att på denna och följande figur, måste hufvudet, enligt optiska regler, föreställas i mycken förkortning.)
  - 4. Hufvudet sedt ännu mera nerifrån för att visa hela urgröpningens djup. En antenn föreställes uppböjd, den andra nedböjd.
  - 5. Hufvudet med antenner sedt från sidan.
  - 6. En antenn, ännu mera förstorad.

## II. NYA SPECIES.

1. *Acrydium bispinosum*: fusco-ferrugineum, thorace utrinque unipinoso, scutello abdomine longiore.

Hab. in India orientali. (Mus. Dalm.).

Statura *Acrydii subulati*, sed major; Frons pal-

---

\*) Ceterum ovale, glaberrimum nitidum, dorso bascos concinnet striato.



lida, antennis ferrugineis. Thorax fuscoferrugineus, dorso plano obsolete carinato, lateribus utrinque spina valida, acuta, ferruginea, apice nigra, armatus. Scutellum, a thorace non distinctum, corpore fere duplo longius, apice acuminatum, vix carinatum, fuscum. Pedes forma ut in congeneribus, fusco & ferrugineo variegati. Alæ longitudine scutelli.

2. *Cynips Eucharoides*: petiolo elongato; nigra nitidissima, ore pedibusque pallide-testaceis, antennis filiformibus flavofuscis.

Specimina plura excipulo capta in sylvaticis Westrogothiæ mense Junio; an in Quercu habitans?

Mediæ magnitudinis, sed elongata et gracilis, statura et facie omnino *Eucharidis*, sed alæ *Cynipis*. Antennæ filiformes, tenues, longitudine fere corporis, 14-articulatæ, articulo primo obconico, secundo brevi nodiformi, reliquis subæqualibus longioribus linearibus, colore supra fusco, subtus testaceo, subtilissime albo-pubescentes. Caput transversum, fronte æquali æneo-nigra, in illæsis dense albo-sericeo-pilosa, vertice æneo subtilissime punctato, stematibus tribus elevatis. Oculi magni, globosi nigri; mandibulæ flavæ, intus tridentatæ. Thorax gibbus niger, supra glaberrimus, lateribus striatus; scutellum magnum elevatum, posterius parum productum, obtusum, glabrum. Metathorax punctato-scaber. Petiolus elongatus, longitudine  $\frac{2}{3}$  thoracis, tenuis, teres, niger nitidus, sub metathorace inter coxas pedum posticorum insertus. Abdomen longitudine fere thoracis, ovatum, elevatum, vix compressum, antice posticeque modice attenuatum, nigrum nitidum. Pedes simplices, pallide-testacei, parcius pubescentes, coxis nigris. Alæ hyalinæ, subtilissime ciliatæ, nervis ordinariis *Cynipis* distinctis, flavo-fuscis, nervulo extimo transverso crassiore. Alarum tegula testacea.

*Obs.* Ob habitum a genuinis *Cynipibus* nonnihil diversum, præsertim petiolum abdominis elongatum, Entomologis nonnullis forte videatur peculiaris generis, cui tunc nomen "*Anacharis*" proponerem.

3. *Chalcis melanuris*: nigra, tibiis tarsisque rufopiceis, alarum tegulis, maculisque femorum posticorum, basali apicisque albis; abdomine petiolato, scutello sub mucico.

Specimina circa 20, semel capta ad villam *Roo* Westrogothiæ, mense Julio, prope aquam volitans, Eodem loco, per plures postea annos, sollicitissime sed frustra quæsivi.

Magnitudo et statura omnino *Ch. sispedis* Lin. (quæ a *Fabricio* *C. clavipes* salutatur), sed præter colorem et signaturam femorum posticorum, ab illa quoque differt tegulis albis, coxis posticis manifeste brevioribus, et antennis magis clavatis. Caput transversum, latitudine thoracis, nigrum punctatissimum, fronte superiore pro antennarum receptione oblique bifoveolata, interjacente carina, infra antennarum insertionem nonnihil descendente. Margo oralis late et sat profunde emarginatus, in medio nonnihil incrassatus. Mandibulæ breves, validæ, nigræ; palpi flavescentes. Intra oculos utrinque punctum albidum. Antennæ nigræ, insertæ medio frontis, (in linea intra marginem oculorum inferiorem ducta,) caule longo cylindrico, flagello cauli plus duplo longiore, (10-articulato,) basi tenuiore, versus apicem sensim sed manifeste incrassato. Thorax niger, immaculatus, copiose rude punctatus, antice truncatus, angulis subrectis, scutello apice obsolete et breviter bimucronato, metathorace cancellatim rugoso. Alarum tegula alba. Abdomen subglobosum, elevatum, atrum, nitidissimum, petiolo illi dimidio brevior, sublævi, concolore. Pedes anteriores nigro-fusci, tibiis rufescentibus basi ex-

teriore pallida, tarsis ferrugineis. Pedes postice nigri, subtiliter punctulati, coxis elongatis clavatis; horum femora maxima, lenticularia, nigra, basi inferiore lunulaque subapicali utrinque, albis; margine inferiore evidenter crenulato, et ad basin dentibus duobus geminis armata, quorum exterior validior albus. Tibiæ arcuatæ femoribus applicatæ, eisque paulo breviores, nigrae, apice inferiore in spinam lutescentem productæ. Tarsi lutescentes, pubescentes. Alæ fusco-hyalinæ, nervo costali, punctoque stigmaticali brevī, nigro fuscis. — Corpus totum, abdomine excepto, pube brevi grisea adpersum, in pedibus subtiliore.

*Obs.* Non nisi feminas vidi; nec alia hujus generis species mihi obvia, quam hujus esse marem suspicari liceat; etenim e *Chalcide sispedi* Lin. et marem et feminam possideo, præter antennarum & ani formam, simillimas.

4. *Diplolepis Patellaria*: læte viridis nitens, punctatissima, ore antennis pedibusque flavis; palpis articulo apicali maximo lentiformi, luteo.

Hab. in Westrogothia & in Uplandia.

Parvā, magnitudine & statura *Dipl. puparum*. Caput magnum, thoraci fere latius, æquale, læte viride, subtiliter punctatissimum, pro antennis vix impressum. Mandibulæ pallidæ, apice fusca. Palpi lutei, articulo ultimo maximo et forma singulari, corpusculum enim globosum l. lentiforme, glabrum, referente; sub gula retrahendi. Antennæ crassiusculæ, forma hujus generis ordinaria, caule lineari cylindrico, flagello sub-fusiformi, luteæ, immaculatæ, insertæ fronti, infra oculos sed longe supra os. Oculi majusculi, obturi. Thorax læte viridis, nitens, subtiliter punctatissimus, lobo collari transverso,

sverso, antice rotundato. Abdomen brevissimum, deltoideum ano truncato, viride, glaberrimum, nitidissimum, thoraci petiolo brevi nigro adnexum. Pedes flavissimi, ungulis nigris, coxis virescentibus. Alæ albo-hyalinæ, nervo costali ramuloque stigmaticali brevi, fusco-flavescentibus.

*Obs.* Palporum singularis structura secundum methodum Fabricianam genus proprium indicare videtur, sed forma reliquorum corporis partium omnino ut in *Diplolepibus*.

5. *Gonatopus* \*) *ephippiger*: glaber, flavus, metathorace scabro nigro.

In Vestrogothia rarissime mihi obvius.

Parvus, vix magnitudine *Bethyli hemipteri* Panz., totus flavo-luteus, exceptis oculis et metathorace nigris. Antennæ luteæ vix pubescentes; articulus primus major cylindricus, secundus bevis obconicus, 3, 4, 5, 6, lineares, 7, 8, 9, crassiores, apicalis acuminatus. Caput quam in reliquis minus transversum, postice parum emarginatum, glabrum, luteum, oculis subovatis nigris, mandibulis palpisque pallidis, illis summo apice fuscis. Collare angustum, subquadratum, antice rotundatum, luteum, glabrum nitidum. Thorax subtus et antice flavo-luteus; sub metathorace ante basin pedum utrinque punctum nigrum. Metathorax niger, scaber, postice declivis, convexus, vix nisi obsolete cancellatus. Abdomen luteum, glaberrimum, basi apiceque attenuatum, segmentis quinque, petiolo

---

\*) *Gonatopus* Klug. Genus a Dom. Latreille in Gen. Crust. & Ins. Tom. IV. pag. 39. determinatum et descriptum ibique *Dryinus* nominatum, quæ denominatio vero a Cel. Fabricio jam alio *Piezatorum* generi imposita. (Syst. Piez. p. 200.)



vix ullo. Pedes flavi immaculati, forma ut in reliquis hujus generis, videlicet femoribus ante medium incrassatis, versus apicem attenuatis, tarsisque anticis raptoriis. Alæ pallido hyalinæ, nervis stigmatæque flavissimis, directione omnino ut in reliquis hujus generis.

6. *Gonatopus melaleucus*: niger, capite antice albo macula verticali trigona nigra; pedibus anterioribus totis, tarsisque posticorum, albis. (♀.)

In Vestrogothia captus.

Fere minimus hujus generis, statura reliquorum, femoribus tamen minus clavatis. Antennæ non longitudine thoracis cum capite, filiformes, nigrae, articulis (10,) distinctis, brevibus, subæqualibus; apicis parum crassioribus. Caput magnum, antice niveum, palpis mandibulisque albis; postice et subtus nigrum, macula verticali magna, subtriangulari, oculisque magnis, nigris. Truncus et abdomen nigra immaculata, metathorace declivi convexo, subtiliter punctatissimo. Pedes albi, anteriores immaculati, posticorum femora et tibiæ nigro-fusca, tarsi albidis apice obscurioribus. Alæ hyalinæ, nervis stigmatæque fuscis.

7. *Gonatopus collaris*: niger, antennis pedibusque testaceis, collare rufescente. (♀.)

In Vestrogothia lectus.

Inter minores generis. Antennæ tenues, testaceæ, immaculatæ; articulo basali reliquis majori, secundo brevi, ceteris longitudine subæqualibus, apicalibus vero crassioribus. Caput nigrum, glabrum nitidum, nec punctatum nec pubescens, mandibulis palpisque flavescentibus. Collare capite multo angustius, subquadratum, antice rotundatum, rufescens margine antico infuscato. Thorax vix lati-

tudine capitis, nigrum, nitidum, metathorace concolore, punctulato, vix cancellato. Abdomen nigrum, glabrum, nitidissimum, ano piceo. Pedes forma hujus generis ordinaria, pallide testacei, femoribus valde obclavatis, posticis apice fuscis. Alæ hyalinæ nervis flavescentibus.

8. *Gonatopus flavicornis*: niger, fronte albo-sericea; ore, antennis pedibusque pallide testaceis. (♂. ♀.)

Hab. in plantis et fruticibus, præsertim Pomonæ, passim.

Maximus hujus generis mihi obvius. *Femina*: Antennæ capite vix triplo longiores, filiformes, flavo-testaceæ; nudæ, articulo basali reliquis longiore, subtus albo, articulis ceteris longitudine subæqualibus, apicis vero paulo crassioribus. Caput cum oculis ipso thoraci latius, nigrum nitidum, subtilissime punctulatum, antice pube tenui albo-sericea vestitum; mandibulæ pallidoflavæ, apice saturatiori, palpi elongati albicantes. Collare breve transversum, nigrum, punctulatum. Thorax niger nitidus, metathorace concolore punctulato, leviter cancellato. Abdomen nigrum, nitidum. Pedes pallidi flavo-testacei, immaculati, femoribus posticis saturatioribus. Alæ hyalinæ nervis stigmatumque flavis.

*Mar*: duplo minor, antennis paulo longioribus, linearibus, manifeste pubescentibus, subciliatis; abdomine brevior, obtusior; ceterum quoad formam et colores feminæ simillimus. Rarius occurrit.

9. *Gonatopus ruficornis*: niger, nitidus mandibulis pedibusque lutescentibus, antennis longioribus fusco-rufescentibus, articulis 1 et 2 testaceis. (♀.)

Hab. in Vestrogothia passim.

*G. flavicorni* minor, præsertim angustior, sed antennis multo longioribus tenuioribus, et vere distinctus. Antennæ longitudine capitis thoracisque, tenues, articulo primo crassiore tereti, secundoque brevi, flavis; ceteris fusco-rufescentibus nudis, 3 et 4 basali multo longioribus, reliquis sensim decre-scentibus. Caput nigrum nitidum, æquum, oculo armato subtilissime parcius punctulatum, fronte parcius et obsolete sericeo-pubescente. Palpi et mandibulæ lutescentes, hæ basi apiceque fuscæ. Collare angustatum nigrum, subtiliter punctulatum. Thorax niger nitidus, metathorace concolore, convexiore, punctatissimo, tenue pubescente, haud cancellato. Abdomen nigrum nitidum. Pedes rufotestacei immaculati. Alæ hyalinæ nervis stigmatæque flavescentibus.

10. *Gonatopus frontalis*: niger nitidus, fronte mandibulis pedibusque rufotestaceis, antennis longioribus nigris, articulo basali luteo, metathorace retuso. (♀.)

Valde affinis *G. ruficorni*, sed distinctus videtur, cum semper paulo minor, et macula frontis constans, metathorax quoque magis retusus videatur. Antennæ longiusculæ, tenues, pilosulæ, nigrae, non nisi articulo basali luteo. Mandibulæ et palpi flavescentes. Frons albo-pilosula, macula magna lutea intra et supra antennis, ad os usque descendente. Caput, thorax et abdomen nigra, nitida. Metathorax niger, conferte punctatus, non cancellatus, valde retusus. Pedes lutei immaculati. Alæ nervis lutescentibus.

11. *Gonatopus basalis*: niger nitidus, mandibulis pedibusque flavo testaceis, antennis longioribus crassiusculis nigris, articulis 1 et 2 flavo testaceis. (♀.)

Hab. in Smolandia. A Dom. Bogeman mihi communicatus.

Statura et summa similitudo *G. ruficornis*, sed paulo major, et distinctus videtur. Differt præsertim antennarum flagello fere duplo crassiore quam in *G. ruficorni*, toto nigro, non rufescente; articulus basalis etiam paulo longior videatur.

Antennæ corpore breviores, articulo basali cylindrico flavo, crassiusculo; secundo tenui pallido; reliquis nigris immaculatis, breviter pubescentibus, apicem versus sensim crassioribus. Caput thorace multo latius, nigrum, subtiliter punctulatum, callo parvo supra os, et inter antennis. Frons nigra immaculata, albo-pubescentibus. Mandibulæ lutescentes, palpi pallide-flavi. Thorax niger nitidus, punctulatus, metathorace rugosulo, retuso. Abdomen nigrum nitidum. Pedes forma ordinaria, pallide-lutescentes, immaculati. Alæ nervis testaceis.

12. *Gonatopus brevicornis*: niger, capite subtilissime coriaceo, ore pedibusque rufopiceis; antennis brevibus crassis nigris, basi rufopiceis; alis stigmate fusco. (♀)

In Vestrogothia captus.

Medius in hoc genere, distinctus colore obscuro, et antennis quam in reliquis crassioribus et brevioribus. Caput thoraci manifeste latius, nigrum, subtilissime coriaceum, canalicula frontis tenui longitudinali, regione oris albo sericea. Mandibulæ lutescentes basi piceæ; palpi testacei. Antennæ vix ultra dimidium thoracis assurgentes, nigrae, basi piceæ; articulus primus reliquis longior obconicus, secundus parvus breviter obconicus, tertius longior cylindricus, reliqui perspicue crassiores, ultimus conoideus, apice acuminatus. Thorax niger nitidus, metathorace concolore punctatissimo, basi dor-



sali cancellata, apice declivo æquali. Abdomen nigrum glaberrimum. Pedes omnes rufo piceï, femoribus saturatoribus, tarsis pallidis. Alæ fusco-hyalinæ, nervis pallide fusciscentibus, stigmate nigro-fusco.

13. *Gonatopus pedestris*: elongatus apterus, niger, ore antennarum basi pedibusque testaceis, femorum basi infuscata; vertice depresso, thorace subiereti binodo. (♀.)

Hab. in Vestrogothia passim rarius.

Longitudine fere *G. flavicornis*, sed angustior; statura singulari et facie fere Formicæ, sed antennæ, pedes &c., omnino hujus generis. Antennæ non longitudine capitis cum thorace, fusco-testaceæ, graciles, articulis 1 et 2 crassioribus flavescenscentibus, 3:tio longitudine præcedentium simul sumtis, gracillimo, apicalibus perparum crassioribus. Caput thorace fere duplo latius, nigrum nitidum, glabrum, læve, regione oris flava, mandibulis concoloribus; postice late et sat profunde emarginatum, supra depressum, lateribus cum oculis prominulis elevatis, unde excavatum videtur; subius crassiusculum convexum, nigrum. Thorax valde angustatus, difformis, bipartitus; Pars antica (verum collare), oblongo-subglobosa, posterius valde elevata, subtruncata, nigra nitidissima; pars posterior (thorax proprius) teretiuscula, subdepressa, minus nitida, apice opaca. Abdomen capite latius, nigrum, nitidum. Pedes omnes pallide-testacei, femoribus ad basin nigro-fuscis, coxis posticorum concoloribus. Tarsi antici raptorii, omnino ut in reliquis hujus generis. Alarum nullum rudimentum.

---

*Anm.* Dessa ofvanföre beskrifne *Gonatopi* utgåra utan tvifvel lika så många olika arter, emedan deras skiljemärken äro nog tydliga, och alla äro af ett och samma kön. Om deremot de tvänne följande, hvaraf jag endast sett hannar, höra till några af de här beskrifne honorne, eller till egna arter hvars honor äro mig obekante, kan jag nu icke afgöra. Det torde dock vara lämpligast att beskrifva dem såsom särskildte, till dess erfarenheten får lemna dem en säkrare plats.

14. *Gonatopus fuscicornis*: niger, ore pedibusque testaceis, femoribus basi piceis; antennis nigris pubescentibus; alarum nervis stigmatique fuscis. (♂.)

Hab. in Vestrogothia, minus infrequens.

Magnitudo *Evania* minutæ. Antennæ capite cum thorace evidenter longiores, nigrae, lineares, valde pubescentes; articulus basalis brevis crassiusculus, basi interdum picea; secundus parvus breviter obconicus; tertius articulo basali fere duplo longior, cylindricus, reliqui tertio statura et fere longitudine æquales, apicalis attenuatus. Caput nigrum nitidum, palpis mandibulisque flavis. Collare breve, antice rotundatum, nigrum nitidum. Thorax niger nitidus, metathorace concolore punctatissimo, declivi convexo, non cancellato. Pedes obscure testacei, femoribus basi piceis, coxis concoloribus. Alæ hyalinæ, nervis stigmatique fuscis, obscuris.

15. *Gonatopus pubicornis*: niger, ore pedibusque rufopiceis, femoribus basi obscurioribus, antennis nigris pubescentibus, articulis brevioribus, alarum nervis stigmatique fuscis. (♂.)

Hab. in Vestrogothia.

Affinis *G. fuscicorni*, sed duplo minor, ore pedibusque multo obscurioribus, et antennarum articulis multo brevioribus, unde omnino distinctus. Antennæ vix longitudine capitis cum thorace, nigrae, valde pubescentes, articulo primo cylindrico brevi, reliquis tamen non brevioribus, secundus brevior obconicus; tertius fere brevior basali, oblongus; reliqui tertio similes, apicalis acuminatus. Caput cum oculis thorace latius, nigrum, subtilissime coriaceum, mandibulis palpisque piceis. Collare breve transversum, antice rotundatum nigrum. Thorax niger nitidus, metathorace punctatissimo, convexo, declivi, obsolete subcancellato. Pedes picei, tibiis tarsisque dilutioribus femoribus obscuris, basi nigricantibus. Alæ nervis stigmatibusque nigro-fuscis.

16. *Ceroplastus testaceus*: corpore pedibusque testaceis, antennis tarsisque obscurioribus, alis sordide lutescentibus, costa intra medium et apicem infuscata.

Hab. in Vestrogothia rarissime; specimina duo capta in fenestris domicilii amoeni *Sparresäter Domini* Schön herr. Anne *Merulio* destruenti inhabitans?

Specimen nostrum masculum. *Ceroplaste tipuloidi* minor, præsertim multo angustior. Antennæ lanceolatae, omnino compressae, longitudine fere thoracis cum capite, fusco-testaceae, fronti superiori intra oculos insertae; constant articulis 15 (excepto processu articuliformi frontis ad antennarum basin); articulus 1:0 parvus cyathiformis, 2:0 major, lunatus, reliqui transversim sublunati, medio baseos subsinuato, angulis inferioribus rotundatis, superioribus acuminatis; articulus ultimus semi-ovatus. Caput parvum deflexum suborbiculare, testaceum,

subtilissime fusco-pubescens, oculis magnis obscuris, capitis partem anticam fere totam occupantibus, relicto fronte angustissima immersa, testacea. Os pallide lutescens, palpis oblongis concoloribus. Stemmata 3 pellucido nitidula, in macula nigra verticis locata, non in triangulum, sed in linea subrecta 1. parum arcuata. Thorax gibbosus testaceo-lutescens, albido-sericeus, marginibus fusco-ciliatis, in dorso lineolis longitudinalibus 4 fuscis, obsoletis, interioribus antice divergentibus; et in utroque latere sub alis maculae 2 1. 3 fusco-brunneae. Scutellum semi-circulare pallide testaceum. Abdomen thoraci plus triplo longius, lineare, subcylindricum, testaceum fusco-pubescens; in summa basi utrinque punctum fuscum punctisque obscuris 3 1. 4 obsoletioribus ad latera ventris notatum, anoque pallido, breviter biunguiculato. Pedes gracillimi testacei, parum pubescentes, tibiis striatis omnibus apice unispinosi, tarsi fuscis. Coxae posteriores magnae, pallidae, puncto in medio fusco. Alae abdomine multo breviores, sordide lutescentes, nervis ordinariis fuscis; pone medium costae vitta marginalis fusca, parum determinata, versus apicem non nihil descendens, apicem alae non attingens. Margo alae interior obsolete et inaequaliter infuscatus videtur. Halteres pallidi, capitulo fusco.

*Femina* hujus speciei olim a Dom. Schönherr Holmiae capta. Mari magnitudine, statura et colore simillima, modo abdomen crassius, sublanceolatum, depressum, fusco-testaceum, immaculatum. Anus valvulis duabus brevibus; inferiore latiori, obtusa; superiori angusta, acuminata, in medio subgibbosa.

---



# BESKRIFNING

## öfver Slågtet *Pedicellaria*;

af

E. NILSSON.

---

**D**e små maskkråk som utgöra slågtet *Pedicellaria*, äro först upptäckta af den skarpsynte OTTO FREDR. MÜLLER. Denne Naturforskare kände redan tre arter deraf, hvilka han införde i sin *prodromus*, samt derefter beskref och afteknade i *Zoologia Danica* (Fasc. I. p. 16. Tab. XVI).

Hos ingen af de sednare Författare, som jag har till hands, finner jag någon art anteknad utom de MÜLLERSKA, och hvad de anföra om dessa, synas de lånat af MÜLLER. Ingen enda art af detta slågte är, mig vetterligt, hittills anmärkt som Svensk. Jag tror mig derföre göra våra Faunas vänner ett nöje, då jag nu kan anmäla fyra arter deraf såsom hörande till *Fauna Svecica*. Af dessa arter är den ena, som jag vill kalla *Pedicellaria dentata*, otvifvelaktigt ny: de andre tre äro förmodeligen de samma som MÜLLERS, fastän resultaten af mina observationer icke alltid instämma med denne berömde Forskares. Jag har derföre äfven beskrifvit och låtit afteckna dessa sistnämde arter, och jag hoppas, att

den, som jemför Naturen med både de MÜLLERSKA och mina beskrifningar, icke skall finna de sednare öfverflödiga. Jag får nämna, att mina beskrifningar äro gjorde efter observationer genom enkelt microscop med spegel. Figurerna äro ritade, dels i naturlig storlek, dels efter nämnde microscop af Medicinæ Licentiaten Herr A. RETZIUS.

*Pedicellaria*, som jag på svenska ville kalla *Stjelkdjur*, hör till de ofullkomligare djuriska organismer, hvilka ännu stå nära gränsen af vextriket. Som *Djur* har *Stjelkdjuret* armar att fänga sitt rof, en mun att uppsluka det, och en mage, att digrera det. Som *Djur* har det äfven en frivillig rörelse: men denna är likväl blott partiel; ty liksom vextens, är dess fot för alltid bunden vid den punct, der händelsen först fästade den. *Stjelkdjuret* hör derföre till de länkar i Djurkedjan, hvilka icke fullkomligt hunnit lösslita sig ur vextnaturens band, och framstå som fria och sjelfständiga djur. Dess hufvud är djurets, dess fot vextens. Dess rörelser inskränka sig derföre inom en obetydelig krets, och dess jagtpark utgöres af den cirkelrunden, hvaraf foten bildar centren, och armarnes ändar beskrifva peripherien.

För att gifva Läsaren en riktig föreställning om *Stjelkdjuret*, får jag be honom efterse figurerna på Tab. III. Den nedersta, smalaste delen af Djuret är dess fot (*pedicellus*) med hvilken det är fastvuxet vid en främmande kropp, hvarifrån det ej utan våld kan lösryckas. Denna fot är smal, trind, ogenomsigtig, oftast böjlig, någon gång kalkartad och skör. Håri märkes intet teken till djuriskt lif. Foten omgifves merendels af en tunn pellucid hinna (*epidermis*) (Fig. 6. c) som blir mera

synlig, sedan Djuret legat en liten stund i färskt vatten. Fotens öfversta ända har oftast en knapp, som inskjuter sig i en membranös säck, (b) hvilken är tjockare än foten, och hos de flesta arter cylindrisk. Denna membranösa säck är pellucid, och försedd med långsgående ganska fina fibrer. MÜLLER kallar denna del af djuret dess *hals* (column). Men hos ett Djur, som naturen försett med så utbildade anfallsvapen för att fånga rof — hvilket vi strax gå att visa — kan man väl knappt annat än föreställa sig ett betydligt organ, i hvilket det fångade rofvet nedsväljes och der digererar. Den pellucida fibrösa membranen, (som utantill äfven är omgifven och skyddad af en annan membran) synes mig otvifvelaktigt vara ett sådant organ. Uppåt drager den sig något tillsammans, och försvinner mellan de tre *knölar*, som utgöra armarnas basis, och svalgets omkrets. Denna säckformiga membran måste derföre vara på en gång matsruhe och mage, och der den slutar sig (i fauces) förrättar den troligen functionen än af svalg och än af anus. Denna del af Djuret kallar jag derföre *abdomen*, och jag får tillika anmärka, att den finnes ganska tydlig hos alla arter, fastän MÜLLER nekat den hos *Pedicellaria globifera*. Efter magen följer det så kallade *hufvudet* (Fig. 8. a), som är den tjockaste del af Djuret. Detta består af tre \*) *armar*, som innesluta munnen. Rotåndan af armarna är hos alla arter knölig och tjock (d). Dessa knölar articulera sins emellan, och omgifva svalget. MÜLLER kallar dem flikar (lobi). Från dem uppskjuta armarna i olika form hos olika arter (a). Men hos alla kunna de, genom rotknö-

---

\*) Jag har äfven sett individer med 4 och 2, men mycket sällan.

larnes articulerande, öppna och tillsluta sig efter djurets behag. Hos alla äro de kalkartade och sköra.

Då man löstagit ett Djur från den främmande kropp, hvarpå det suttit, har det merendels armarna tillslutna (Fig 2); men sedan det legat något litet i färskt vatten, dör det; alla muscler återtaga då jemvigt sedan viljan icke mera verkar på adductorerne. Djuret utsträcker dertfore armarne rätt fram, och i denna ställning förblifva de. Af samma orsak tyckes vattnet, hvari Djuret ligger, nu få fritt inlopp genom det lilla svalget; ty magen blir mera uppsvåld och ram, äfven hos *Pedic. ovata* som i lefvande tillstånd har den slingrig (Fig. 8).

*Armarne*, som man kanske lika så väl kunde kalla *käkar*, äro mera fullkomligt utbildade, än man hos ett så ofullkomligt djur skulle förmoda. För att visa detta vill jag välja *Pedicularia dentata* (Fig. 1—4).

Jag har förut nämnt, att armarne vid rotändan äro tjocka och knöliga. Sådane synas de utvändigt. Invändigt äro de concava och man finner, att dessa synbara knölar äro tunna, trekantiga utbredningar af armarnes rot. I nedre hörnet äro de tandade med tre tänder (Fig. 4. *d*), och längs åt den inre concava sidan går en upphöjd smal crista (Fig. 4. *f*). Denna bildar således tvenne caviteter, hvilka äro fyllda med ett köttlikt ämne, som synes fibröst, då det macereras i vatten. Detta ämne är djurets muscler, hvarmed det hopdrager armarna m. m. Från nämnde rotutbredning uppskjuta armarne i början smala \*), derefter mera

---

\*) Här äro de dertfore skiljda från hvarandra, äfven då ändarna äro hoplagda (Fig. 2). Det är möjligt, att Djuret äger ett retractilt sugrör, för att komma åt det rof, som fasthållas mellan armändarna.



utbredda, lancettformiga, innantill concava, utan till convexa och med längsgående rygg. Från midten, der de äro bredast, till ändan, äro de i kanten randade, och dessa tänder inpassa noga mellan tänderna i de andra armar, då Djuret slotat dem (Fig. 2). Armarne hafva således sitt skelett och sin muskelbyggnad.

Jag har äfven nämnt, att hufvud och armar äro kalkartade och sköra. Man bör likväl icke föreställa sig en oorganisk kalkmassa. Tvärtom råder här den regulieraste organisation. Med sin sköna cellulösa structur likna de (öfver spegeln) ett slipadt crystalglas, hvori oräkneliga små punctformiga oceller ligga i rader strödda öfver allt, undantagande i brådden, som är jemnbred, slät och klar.

Det är en af Physiologerna antagen och på erfarenheten grundad sats, att Naturen vid utvecklingen af de djuriska kropparna går ut ifrån en och samma grundform, följer samma våg; men låter en del organismer för alltid stadna vid en utbildningsgrad, som hos andra blott är en hastig öfvergång \*).

Är denna sats allmänt gällande, att vi hos ett fullkomligare Djur finna det som öfvergångsperiod, hvilket vi hos ett ofullkomligare finna permanent; och om det fullkomligaste Djur, under sin successiva utveckling genomvandrar alla former af de lägre djurklasserna; så följer häraf, att vi äfven hos det fullkomligaste Djur — människan —

\*) Es giebt keinen guten Physiologen, den nicht die Bemerkung treppire hätte, dass die ursprüngliche form aller Organismen eine und dieselbe ist, und dass aus dieser einen Form sich alle, die niedrigeren wie die höheren so entwickeln, dass diese die permanenten Formen der ersten nur als vorübergehende Perioden durchlaufen. Meckel Beyträge zur vergleichenden Anatomie, 2 B, 1 Abth, p. 3.

skola finna en period, i hvilken dess form har någon likhet med Stjeldkjurets. Det är klart, att denna period bör sökas inom de första veckorna af fostrets tillvärelse.

I denna första utvecklingsperiod visar sig menskliga fostret, som en liten aflång klump med hufvudändan tjock och rundaktig, och den motsatta ändan tunn tillspersad. Intet spår gifves ännu till ögon, öron eller andra öppningar; intet teken till extremiteter. Äfven brist på all inre Benbyggnad sätter menskliga fostret ännu bland *Animalia non vertebrata*. — Till 10:de—12:te veckan äro mun- och näshålor förenade och utgöra en enda cavitet. Äfven bröst- och buk-caviteterna äro i början förenade. Tarm-canalen är ej längre, än kroppen. Magen är blott en obetydlig utvidgning. Undre ändan af tarm-canalen är till 16:de veckan tillsluten. På det stora hufvudet, som icke genom någon hals är skild från kroppen, äro *hokarna* \*), tidigare än alla öfriga ben, i hög grad utvecklade \*\*).

Man finner således i denna första utvecklingsperiod en långt större öfverensstämmelse, mellan menniskofostret och de lägsta djurformer, hvartill äfven *Stjeldkjuret* hör; än mellan fostret och den fullkomligt utbildade människan.

Ännu en physiologisk anmärkning må tillåtas mig vid *Stjeldkjuret*: Det torde förefalla besynnerligt, att finna så fullkomligt utbildade, och så skönt organiserade rofvapen hos ett Djur,

---

\*) Jag har nämnt, att hvad jag kallar *armar* hos *Stjeldkjuret*, lika så väl kunde kallas *hakar*. Troligen vore också den benämningen i sig sjelft riktigast. Jag har likväl bibehållit denna för analogien skull med de andra polypartade djuren.

\*\*) Meckel Beyträge zur Vergleich. Anat. 1. B. 1. Abth. p. 57 o. f. — D:o 2 B. 1. Abth. p. 1. &c.

hvars kropp blott är en tunn membrands säck, och hvars fot ännu tyckes stå kvar inom Floras gebiet.

Detta phenomen är märkvärdigt och lemnar oss ännu ett bidrag till den sats, att Naturen vid bildandet af djurformerna, icke blott iaktager en viss analogie, utan äfven utvecklar sig i samma direction, nemligen från den åndan af djurkroppen, der hufvudet finnes till motsatta åndan. Att detta inträffar hos *Stjeldjuret*, är klart af det föregående. Jag skall äfven framdraga några få bevis för denna sats af de andre Djurklasserna:

Hos *menskliga fetus* utbildas först hufvudet, i förhållande till öfriga kroppen. Då extremiteterna visa sig, framkomma de öfre, som sitta hufvudet närmast, förr än de nedre. Hos *Skålhunden* finnas väl både främre och bakre extremiteter, men de främre äro långt mera utbildade, och hafva 5 tår, som äro försedde med naglar. De bakre äro nästan hopvexta med svansen. Hos *Hvalen*, som bland *Mammalia* står på en än lägre utvecklingsgrad, äro de främre extremiteter fenlika, och dess utgreningar (tårna) gömda inom den allmänna betäckningen; således ändå långt mera utbildade än de bakre, hvilka endast visa sig som en horizontal klufven fiskstjert. Hos de fullkomligare *amphibier* (t. ex. *Rana*, *Lacerta* &c.) finnas både främre och bakre extremiteter. Hos *Sirenen*, som står på en lägre grad, utveckla sig aldrig mer än de två främre. Hos de öfriga af samma klass (ormarna) försvinna äfven dessa främre.

De flesta Fiskar äro försedde med *fenor*, som tyda spåren efter båda slags extremiteterna. Hos *Apodes* försvinna de bakre, och endast de främre återstå.

Detta



Detta ämne får jag kanske tillfälle att närmare utveckla en annan gång. Nu åter till *Stjelkdjuren*.

De finnas i större eller mindre mängd sittande mellan taggarne på alla de *Sjdborror* (*Echini*) som finnas i hafvet vid Scandinaviens kuster. Således bebo de så väl Ishafvets våg vid *Finnmarken* och *Nordlandet*, som Öresunds vid kusterne af Skåne.

1. *Pedicellaria* (*globifera* Müll.) brachiis ovatis, apice aculeo introrsum flexo terminatis; abdomine subgloboso; pedicello longo. (Fig. 10—12.)  
*Pedicellaria globifera*, Müll. Zool. Dan. I. p. 16. Tab. XVI. Fig. 1—5.

*Descriptio*: Animalculum hocce florem corollæ tripetalæ, germine infero bene refert; scil. *Brachia* corollam, *abdomen* germen et *pedicellus* pedunculum repræsentant. *Brachia* tria, rarius duo, ovata extus convexa, intus concava costâ in medio elevatâ. Hæc, costa ultra membranam foliaceam, coloratam, ovatam, qua extus tegitur, adscendit et in aculeum, introrsum flexum, terminatur. *Abdomen* subglobosum, parvum, membranaceum, pellucidum. *Pedicellus* plerumque tenuis et longissimus, extremitate inferiori cylindraceo-incrassata, superiore capitata. (Hoc capitulum per membranam abdominis perspicitur). Color varius pro varia sede, jam olivaceus, jam albidus, jam rosæus apice et margine brachiorum purpureis.

*Habitat* inter spinas *Echini Drobachiensis* et *Swartzii* \*).

\*) Vide *Collectanea Zool. Scand.* Nilsson. Lund 1817. p. 7. Et in. *Drobachiensis* ulterius describendus est.



2. *Pedicellaria (ovata)* brachiis ovatis muticis, abdomine cylindrico, brevioribus; pedicella brevi (Fig. 7—8.)

*Pedicellaria triphylla* Müll. Zool. D. Tab. XVI. f. 6—8. Obs. *Pedicellaria* lobis quadratis (Fig. 9) quam l. c. p. 16. descripsisse videtur Müllerus, ad hanc speciem vix pertinet.

*Descr.*: *Brachia* tria, ovata, obtusiuscula, mutica, extus convexa, intus concava margine leviter crenata. *Abdomen* cylindricum, l. teres, flexuosum, longissimum (brachiis triplo longius) longitudinaliter subtilissime striatum, pellucidum; superne parum coarctatum, membrana cingente dilatata. *Pedicellus* brachiis longior, abdomine brevior, tenuis, opacus, fragilis, membranula cinctus, superne capitatus.

*Habitat* inter spinas *Echini Drobachiensis* et *Swartzii*; præsertim vero in membrana, os horum cingente, copiosissime insidet.

3. *Pedicellaria (aristata)* brachiis linearibus, abdomine cylindrico longioribus.

*Pedicellaria tridens* Müll. Zool. Dan. Fasc. I. p. 16. Tab. XVI. Fig. 10—15.

*Descr.*: *Brachia* tria, rarius quatuor, aristiformia; attentius tamen observata linearia, extus teretia, intus subcanaliculata marginibus l. integris l. pone apicem leviter crenulatis. *Brachiorum bases* nodosæ, nodi subtriangulares, extus convexi, intus concavi, lineâ, in medio, longitudinali elevata. *Abdomen* cylindricum, superne parum coarctatum, membranaceum subtilissime striatum, membranula cinctum brachiis brevius. *Pedicellus*, longitudine brachiorum, linearis, opacus extremitatibus incrassatis, membranula vestitus.

**Color:** Pedicellis fere albidus, abdominis roseus, capitis l. olivaceus, l. roseus.

**Hab.** inter spinas *Echini Swartzii* et *Sphæra*.

4. *Pedicellaria (dentata)* brachiis petiolato-lanceolatis, dentatis; abdomine cylindrico subæqualibus.

**Descr.** Brachia tria, rarius quatuor, lanceolata extus convexa, intus concava, marginibus a medio ad apicem dentatis; basi nodosa; nodi subtriangulares, extus convexi, intus concavi, linea longitudinali elevata. Abdomen, longitudine fere brachiorum, cylindricum, membranaceum, longitudinaliter subtilissime striatum, membranulâ, cinctum. *Pedicellus* longitudine fere abdominis, tenuis, linearis, fragilis, albus extremitatibus incrassatis.

**Hab.** in *Echino saxatili* sat frequens.

## UPPSTÄLLNING

af de i Sverige funne Vårtsvampar  
(Scleromyci);

af

ELIAS FRIES.

(Fortsättning. \*)

**O. ОБТЕСТЪ.** Hylshusen insänkte, betäckte af veden, barken eller vexternes öfverhud.

211. *SPHÆRIA fimeti*, crustacea fimicola, sphærulia suboblongis immersis nigris, collis prominentibus subobliquis.

*Sph. fimeti. Pers. syn. p. 64. Albert. et Schwein. p. 33.*

Vexer på gödsel i skogsmark, icke sällsynt.

Genom skorpan och de insänkte hylshusen är den lätt skild från *Sph. albitans* γ. och *Sph. stercorearia* Sow. Man har af denna tvenne artsförändringar, den ena med svart skorpa, hvilken hos oss är allmännast och träffas på spillning efter kor; den andra med blågrå skorpa finnes på hästgödsel mera sällsynt.

212. *SPHÆRIA livida*, entoxyla, sphærulis suboblongis immersis nigris, collis subprominulis, materia cinereo-livida cinctis.

\*) Se K. V. Acad. Handl. 1817, St. II. p. 245.

*Sph. livida*. Pers. syn. p. 80.

Sällsynt, uti gammal ved.

Skorpan bildas liksom hos samsligtingarne af det utbrytande fröslemmet, hvarföre den hos denna art icke är svart, emedan fröslemmet är blekt (*cæsio-albida*, *cinerascens*). Öppningarnes halsar genombrade, korta, knappt utstående.

213. *SPHERIA maura*, entoxyla, sphæruleis globosis immersis nigris, capitibus hemisphæricis inæqualibus crustaceis.

Vexer uti gammal ved, sällsynt.

Liknar en svart skroflig skorpa; men inuti vreden sitta hylshus måst lika *Sph. eutypa*. Halsen knappt märkbar; men dess spets är mycket utvidgad, halfrund, ojemn. Hylshusen sammanflyta icke.

214. *SPHERIA astroides*, entoxyla, sphæruleis confertis globosis nigris, capitibus stellatis macula indeterminatae atræ insidentibus.

Vexer på nedfallne qvistar, sällsynt.

Skorpan ganska tunn, alldeles svart, obegränsad, ej fullkomligen slät. Hylshusen merendels smärre än hos följande art, men sitta tätare tillsammans. Halsarne mycket korta med utstående spetsar hvilka äro oregelbundet kantade, ofta stjärnlika. Den bör icke förblandas med *Attidium*; ty sjelfva öppningen är rund.

215. *SPHERIA eutypa*, entoxyla, sphæruleis sparsis globosis nigris, capitibus depressis in macula determinata nigricante prominulis. Liljeb l. Sv. Fl. ed. 3.

Lichen eutypus. Ach. Lichenogr. Prod. p. 14.

*Sph. operculata*. Pers. syn. p. 80.

lc. Sowerb. t. 217.

Icke sällsynt på vissnade grenar af *Asp*, *Ask* o. s. v.



Den skorplika fläcken är långsefter utdragen, i kanterne begränsad, fullkomligen slät och ljus. svart. Hylshusen hopfalla icke. Halsarne variera utdragne och ganska korta, allt efter som de äro djupt insänkta i veden. Spetsarne utstående i den svarta fläcken, blifva snart skällike.

216. *SPHÆRIA hiaseus*, entoxyla, sphærulidis difformibus atris, ligno superne nigricante immersis, capitibus superficialibus tuberculatis delabentibus. Vexer i hård bokved.

Under sjelfva ytan, som, då den icke är beklädd af ett parasitiskt brunt ludd, är slät, är veden svart, hvarifrån äfven ofta utgå svarta ränder, som genomtränga den inre hårdare veden. Hylshusen olikformige. Halsarne ganska korta, knappt märkbara, men deras utstående spets är stor, svart, (liksom sammansatt af flera små knölar,) hvilken slutligen affaller och kvarlemnar gropar i veden.

217. *SPHÆRIA crypta*, entoxyla, sphærulidis globosis immersis sparsis nigris, ostiolo prominulo, collo maculaque nullis.

Funnen i ved af *Pyrus malus*.

Hylshusen tämmeligen stora, klotrunda, mycket glesl växande uti veden, utan att förenas af någon skorplik fläck. Öppningen punktförmig i sjelfva vedens yta.

Arten distinct, men bör närmare undersökas.

218. *SPHÆRIA strobilina*, conigena, sphærulidis gregariis erumpentibus difformibus nigris nitidis, astomis.

*Sph. strobilina.* Holl. et Schmidt Deutschl. Schwämme.

Växer på nedfallna grankottar, sällsynt.

Från *Doshidea pithya* β. är den lätt skild ge-

dem de utbrytande inuti tomma hylshusen; mera närmar den sig till *Hysterium conigenum*, hvilken den ock till vexesatt och utseende fullkomligen liknar. Vanligen sitta 2 eller 3 hylshus tillhopa och utbryta i en smal spricka, blifva sedan nästan bara, till formen ganska oregelbundne, slåta, glatta, glänsande svarta. Tydlig öppning har jag icke sett; troligen är den enkel.

219. *SPHÆRIA mamillana*, sphaerulis sparsis hemisphaericis prominentibus nigris, epidermide concolori tectis, ostiolo papillæformi.

Vexer på mindre qvistar af *Cornus*, *Euonymus* o. s. v.

Hylshusen skulle man lätt anse för superficiella och bara, emedan de äro mycket utstående och den betäckande barkens öfverhud öfver hvarje år slåt och svart. Formen halfrund, nedtryckt med slåt dunkel yta. Öppningen värlig, central. Egentligen vexer den spridd, men icke sällan sammanflyta 2—3 hylshus.

220. *SPHÆRIA Xylostei*, corticola, sphaerulis globosis innatis atris in crusta late effusa indeterminata atra prominulis, ostiolo pertuso.

*S. Xylostei*. Pers. syn. p. 84.

Mycket allmän på stammen och qvistarne af *Lonicera Xylosteum*.

Skorpan vidt utbredd, olikformig, tunn, dunkel, svart. Hylshusen äro väl alldeles beklädd af barken, likväl, med densamma mycket utstående och utan halsar. Öppningen liknar en fin por, är mäst bar. Ofta sammanflyta flera, då den liknar *Sphæria uda* P.

221. *SPHÆRIA rhodostoma*, subcorticalis, sphaerulis globoso-depressis aggregatis, in crusta nigra innatis, ostiolo denudato roseo.

*Sph. rhodostoma*. *Albert. et Schwein. p. 42.*

*t. 4. f. 3.*

Finnes om våren på vissnade qvistar af *Rhamnus Frangula*.

Skorpan uti den inre barken är dunkel, svart och merendels begränsad. Hylsbysen rättmätligen stora, måst runda, efter omkreisen något strimliga, svarta. Papillen är conisk, svart, vidhängande barkens öfverhud, hvaraf då den afdrages, den rödletta öppningen blir bar.

222. *SPHÆRIA pupula*, subcorticalis solitaria, sphaerulis orbiculatis depressis glabris nigris, disco impresso plano albo, papilla sublutescente.

Vexer på den inre barken af nedfallne qvistar af *Acer pseudoplatanus*; funnen i mängd vid Lund.

Hylshusen fullkomligen kretsrunda, likformige, efter omkreisen fint strimliga, glatta, dunkelt svarta; vidhånga ej öfverhuden, som genomstickes af den centrala gulaktiga papillen. Disken, som blottas då öfverhuden afdrages, är nedtryckt, platt, af olika finare bildning och till färgen hvit.

Till form och vexesätt kommer *Sph. subsecrata* *Sowerb. t. 373. f. 8.* nära denna, men är säkerligen skild.

223. *SPHÆRIA Tilia*, subcorticalis sparsa, sphaerulis globosis immersis glabris nigris, collo erumpente inæquali nigro.

*Sph. Tilia*, *Pers. syn. p. 84. Alb. et Schwein. p. 42.*

Vexer allmänt under barken af *Lind*.

Är liksom föregående utan all skorpa och fullkomligen glatt. Hylshusen klotrunda, släta, insänkta uti den inre fibrösa barken, sällan hopfallande, dunkelt svarta. Fröslemmet utbryter merendels i form af en klänge, hvarföre den äfven



fördes till släktet *Namaspora* af REBENTISCH; ibland bildas deraf ett svart skrynkligt bihang, som PERSSON beskriver *l. c.* under *β. Sph. constricta*.

224. *SPHÆRIA lanata*, subcorticalis sparsa, sphæ-  
rulis globosis strigosis olivaceo-nigris, collo erum-  
penti disciformi inæquali nigro.

Vexer under barken af *Rhamnus Frangula*,  
sällsynt.

En ganska besynnerlig art, hylshusen meren-  
dels spridde, träffas mer och mindre ludne, mörkt  
gröngula; hopfallande har jag icke sett dem. Dis-  
ken utbrytande, ojämn, oregelbunden, dunkel,  
svart. Med *Sph. circumscissa* P. och *Sph. clausa*  
Schum., hvilkas plats är emellan denna och före-  
gående, är den mindre besläktad än med följande.

225. *SPHÆRIA hirta*, subcorticalis incusa, sphæru-  
lis irregularibus depressis subtiliter villosis ni-  
gricantibus, ostiolo erumpente.

Vexer uti barken af vissnade qvistar på *Sam-  
bucus racemosa*. Funnen vid Lund, ymnigt.

Hylshusen vidhånga barkens öfverhud (af hvil-  
ka äfven perithecia synas bildade), äro olikformi-  
ge, måst runda, något nedtryckte, betäckte med ett  
fint brunsvart ludd, som under bevåpnadt öga lätt  
upptäcket. Öppningen genombryter punktlikt öfver-  
huden, är deruti alldeles invext, så att då den af-  
drages, blifver den qvarsittande delen af hylshy-  
sen skål-lik.

226. *SPHÆRIA personata*, subcorticalis gregaria,  
sphærulis globosis rufofuscis, collabescendo basi  
umbilicatis, collo erumpenti elliptico inæquali  
nigro.

Höstetiden vexer den under björknåfver, ej  
sällsynt.



Sjelfva perithecium synes bildadt af barken; med hvilken den i textur och färg öfverensstämmer. Det liknar ock nästan alldeles conceptaculum hos *Sphæria clandestina*; men sitter tätare tillsammans, och inre daningen är så olik, att de ej synas beslägtade, ty *Sph. personata* är enkel och inuti måst tomm, fuktig uppsvåld, torkad något hopfallande och deraf inunder liksom näslad.

Denna series af nya och väl skilda arter synes undgått författarne i Mycologien, emedan de vexa dolda under barken.

227. *SPHÆRIA ditopa*, subcorticalis, sphærulis sparsis globosis liberis, mox collapsis, nigricantibus, collo convexo nigro nitido in disco heterogeneo pallido exserto.

Vexer på qvistar af AL.

Ganska egen, nära *Sphæriæ circinatae*. Hylshusens daning, hvilka snart hopfalla, är densamma som hos *Sph. quaternata*; disken liknar *Sph. ambians*, men är mindre; och den utstående svarta glänsande runda öppningen är lik den, som finnas hos de fläste af *Obvallatae*. Den är dock väl utmärkt af de alldeles fria och ensamma hylshusen, hvarföre ock endast en öppning finnes i hvarje disk.

228. *SPHÆRIA floccosa*, subcorticalis gregaria, sphærulis globosis lævibus, collapsis concavis, astomis nigris, tomento effuso arachnoideo purpurascenti cinctis.

Vexer under barkens öfverhud på vissnade qvistar af Hyll, sällsynt. Høstetiden.

Hylshusen släta, dunkelt svarta, tunnskalige, hvarföre de från klotrunda snart hårdt hopfalla och blifva skällika; egenteligen äro de glatta, men omgifvas af ett fint, något utbredt, hopväfdt ludd, som merendels är blekt purpurfärgadt.

229. *SPHÆRIA patula*, subcorticalis, sphaerulis tuss-  
serialis minutis tectis rugulosis glabris atris, ca-  
piibus superficialibus minimis punctiformibus.

Vexer med förra, mycket sällsynt.

Hylshusen vexa merendels i råta linier, äro  
mycket mindre än föregående arts, något nedtryck-  
te utan att vara hopfallande, alldeles glatta, tvärs-  
öfver fint färade, men icke inneslotne i öfverhu-  
den. Öppningarne utan halsar, sitta på barkens öf-  
re sida, utan att genombryta den, äro ganska små,  
punkilika, svarta.

230. *SPHÆRIA Juglandis*, gregaria, sphaerulis inna-  
tis globoso-depressis opacis atris, intus griseis,  
astomis, dein epidermide lacerata erumpentibus.

Vexer på smärre qvistar af *Juglans*, hvilka  
vissnat af kölden.

Synes komma *Nemasporæ* P. och några an-  
dra excentriske arter nära t. e. *Sph. atrovirens* och  
är desto säkrare skild från de tvenne följande hyls-  
husen, sitta tätt tillhopa, äro små, runda, något  
plattade, utbrytande och utsående, utan hals och  
tydlig öppning. Färgen dunkel, svart, inuti gråaktig.

231. *SPHÆRIA sarmentorum*, sphaerulis sparsis he-  
misphaericis prominentibus lævibus nitidulis ni-  
gris, intus nigricantibus, ostiolo papillæformi, dein  
pertuso laceratoque.

Vexer på *Menispermum canadense*, i Lunds Bo-  
taniska trädgård.

Hylshusen äro visserligen täckte, ehuru de,  
utan att genombryta öfverhuden äro mycket utsä-  
ende. Då öfverhuden afdrages, vidhånga de den  
till hälften. Till formen äro de halfrunda, måst  
tomma, utan att hopfalla, svarta, dunkla; men den  
utsående delen är glänsande, stundom med en vart-  
lik öppning, men äfven enkel och slutligen ojämn  
af det sönderbristande skalet.

232. *SPHÆRIA sæpinctola*, gregaria, sphærulis tectis globosis opacis nigris subrugosis, intus albis, ostiolo minuto demum pertusis. *Fries Obs.* 1. p. 181.

Vexer på vissnade qvistar af *Rosæ*.

Är större än *Sph. Juglandis* och utbryter icke genom öfverhuden. Hylshusen tillhopasittande, klotrunda, något olikformige, utstående, finskrynkliga, svarta, träffas ofta tomma, utan att hopfalla eller med en hvit kärna fyllde och en svart punkt i centren. Öppningen fin punktformig, merendels otydlig.

*Sph. Pisi Sowerb.* kommer denna nära.

233. *SPHÆRIA epidermidis*, subcorticalis gregaria, sphærulis tectis minimis subglobosis, dein collabescendo planis dilatatis rugulosis astomis atris.

Denna lilla art finnes på spåda grenar af småbuskar, i Lunds Botaniska trädgård.

Liknar *Verrucaria punctiformis*, men är mindre, utan skorpa och vexer inuti sjelfva barkens öfverhud; från *Sph. herbarum* åter skiljer den sig både genom vexesättet och den plattade formen hos de utvexte hylshusen, som äro svarta, nästan glänsande och skulle lätt kunna anses för bara, om ej den skrynkade ytan voro alldeles lika med barkens.

\* \* \*

234. *SPHÆRIA complanata*, sphærulis sparsis semiimmersis subtectis globosis, mox collabescendo planis pezizoideis lævibus atris, ostiolo papillæformi nitido.

*S. complanata.* *Tod. Meckl.* 11. p. 21. *Rebent. Fl. Neom.* p. 338.

*S. herbarum* a. *Pers. syn.* p. 78.

1c. *Tod. l. c. t.* 11. f. 88.

Ganska allmän på vissnade örtstjelkar, i synnerhet höst och vår.

Förblandas lättast med *Sph. patella*, men skiljes genom sin fullkomliga släthet och värtlika öppning, utan fri papill. Hylshusen äro i början alltid täckte, men blifva sedan bare.

235. *SPHÆRIA coniformis*, sphærulic sparsis subtectis erumpentibus conicis nitidis atris, apice truncato pertuso.

Funnen på vissnade örtstjelkar vid Carlskrona af Herr ASPEGREN.

Vexer visserligen under öfverhuden; men då den affaller, blir den fullkomligen bar; är till formen regulier, conisk; ytan slät, glatt, glänsande; spetsen trubbig, näslad, utan papill. Storleken af *Sph. Doliolum*.

236. *SPHÆRIA herbarum*, sphærulic sparsis minutis globosis subdepressis tectis atris, ostiolo prominulo punctiformi.

Vexer på nedfallne örtstjelkar ganska allmänt.

Varierar mycket till storleken, men är alltid mindre än *Sph. complanata* och blir aldrig hopfallande skål-lik, som den. Dess öppning vida mindre och otydligare. Formen föränderlig klotrund, sphærisk eller halfrund. Om den någon gång finnes bar, är stjelkens öfverhud afskild. — *Sph. herbarum*, G. innefattar flera arter. Var. γ. hör säkerligen hit. Alltför när-beslägrade äro *Sphæriæ Sowerb. Fung. t. 370. f. 1, 5. t. 371. f. 3.*

237. *SPHÆRIA alnea*, entophylla, sphærulic sparsis innatis convexis, mox collapsis lævibus opacis nigris, ostiolo subobsoleto. *Fries Obs. 1. p. 185.*

Vexer uti nedfallne vissnade Allöf, mindre sällsynt.

En väl skild art, som är alldeles dold uti bladets substans; men gör dess öfverhud på öfra sidan hvit och slutligen affallande, emedan den icke



genombrytes. Hylshusen, som merändels träffas hopfallne, qvarsitta då som små svarta skålar, hålst långs efter bladets nerver. Öppningen otydlig. En gång har jag om våren sett dem försedde med en hvit por.

238. *SPHÆRIA Taxi*, entophylla, sphærolis subimmersis tectis convexis minutis nigricantibus, ostiolo denudato albido, *Fries l. c. p. 183.*

Ic. *Sowerb. fung. t. 394. f. 6.*

Svampen täckt af barkens öfverhud har ett gråaktigt utseende; ofäst utan öppning; om våren har jag likväl någon gång funnit en sådan bar och hvit. Till formen variera hylshusen mer och mindre runda. Bör ej förblandas med *Phacidium Taxi*.

239. *SPHÆRIA Visci*, entophylla atrovirens, sphærolis subsparsis ovatis immersis erumpentibus, disco subdepresso rugoso cirrhifero.

*Sph. Visci. DeCand. Suppl. Fl. Gall.*

*Sph. atrovirens. a. Albert et Schwein. p. 48.*

Ic. *Alb. et Schwein. t.*

På vissnade blad af *Viscum album*.

I början är den helt och hållit insänkt, mycket mjuk; sedan uppskjuter den något och sönderdelar bladets öfverhud i 3—5 små flikar. Disken är nedtryckt, svart, finskrynklig, försedd med en enkel bar öppning, genom hvilken det grönaktiga fröslemmet uttränger i form af små enkla klängen. Den torde utgöra typ för ett eget nytt slägte.

240. *SPHÆRIA Buxi*, entophylla, cinereo atra, sphærolis immersis globosis, disco tecto depresso albo, demum epidermide lacerata erumpente nudo.

*Sph. Buxi. De Cand. l. c.*

Allmän på bladen af *Buxus sempervirens*, året igenom.

På denna har jag inga klängen sett. Hylshusen något mindre än föregående arts, måst ned-

tryckt - klotrunda, så länge de betäckas af bladets öfverhud, hvilken sedermera sönderdelas i 2 — 4 olikformige flikar, svartgrå eller något brunaktige, med en nedtryckt hvit disk, bildad af bladets öfverhud, hvilken ger den utseende af en *Depazea*.

β. *Sph. Rusci*, entophylla, nigra, sphærulis globosis prominentibus subseriatis.

I Frigidarium Horti Lundensis på *Ruscus aculeatus*.

Liknar alldeles *Sph. Buxi*, men hylshusen mera utstående och disken mindre tydlig.

Otvifvelaktigt kommer framdeles detta artrika slägte, att delas i flera. I andre delen af mine Observationes mycologicæ, har jag föreslagit följande delning:

1. **PORONIA.** Receptaculum marginatum pezizæforme, subtus villosè-corrugatum, disco tantum sphærulifero. Perithecia oblonga, immersa, ostioliis erumpentibus æqualibus.

Hit hõra *Sph. Poronia* P. och *Sph. repanda*. Fr.

2. **CORDYCEPS.** Receptaculum immarginatum clavariæforme erectum, stipite sterili suffultum. Perithecia globosa periphærica, ostioliis æqualibus.

Hit hõra de under första afdeln. A upptagne, utom *Sph. Poronia*. Det är mera skillnad emellan desse tvenne slågten, ånemellan *Clavariæ* och *Pezizæ*.

3. **SPHÆRIA.** Receptaculum immarginatum sessile l. nullum. Perithecia rotundata, rostello nullo, ostioliis æqualibus.

4. **CERATOSTOMA.** Receptaculum immarginatum effusum l. nullum. Perithecia subglobosa, rostello contiguo, ostiolum æquale nudum sustinente.

Hit hõra *Sphæriæ macrostomæ* (H.) och *Sph. rostellatæ*, subpustulat. et circinnatæ; samt *Sph. ceratosperma*, spiculosa, spinosa.

5. CORYNELIA. — Är ej funnen i Sverige. *Sphær. turbinata*, P.
- 

## II. LOPHIUM. *Fr. Obs. 2. p. 345.*

Receptaculum nullum. Perithecium rotundatum l. compressum, rostello nullo, intus gelatina thecigera farctum. Ostiolum lineato-rimæforme, labiis elevatis compressis cristatum.

*Ann.* Slågtet har med *Sphæriæ* varit förent; *Doct.* PERSON förde dess arter först till en egen afdelning (*Platystomæ*). Som *Sphæriæ* i flera slågten bör delas, har jag anført dem såsom ett eget slågte. Fröredningen är väl den samma som hos *Sphæriæ* och *Lichenes Pyrenocarpi*, men öppningen visar en väsentlig skillnad, och att den, som grund för generiskt bestämmande är användbar, det visar icke blott caps lens mynning hos *Phanerogamerne* och *Mossorne*; utan äfven de fläste *Gasteromyci* och följande *Scleromyci* bestämmas efter öppningen.

Kanterne kallas långa, då de äro längre än hylshusens diameter (*Labia longissima*); äro de lika dermed, kallas de jämna (*æqualia*); kortare *brevia*, *abbreviata* o. s. v.

1. *LOPHIUM excipuliforme*, peritheciis erumpentibus denudatis ovatis nigris, labiis collo brevi longioribus.

*Sph. excipuliformis. Fr. Obs. Myc. 1. p. 177. Ic. l. c. t. 4. f. 5.*

Vexer på gröfre barken af gamla Ask- och Lönnstammar.

Hyls.

Hylshusen olikformige, måst ägglike, med något plattad bas; uppskjuta ur barken och blifva slutligen bara, åro försedde med en kort cylindrisk hals, som egentligen tillhör *Ceratostoma* och ingen annan i släktet. Öppningens plattade kanter åro längre än denna, glänsande (som de fleste arter,) svarta; varierar mycket.

2. *LOPHIUM diminuens*, peritheciis tectis prominulis globosis subdepressis nigris, labiis brevibus compressiusculis, interdum rotundato-conicis.

*Sphæria diminuens*. Pers. syn. p. 75. Albert. et Schwein. p. 29.

Vexer på mindre qvistar, hvilkas bark ännu qvarsitter.

Hylshusen hos denna art upphöja den tunna barken och blifva slutligen nästan bara, utan att omgifvas af någon svart fläck. Till formen klotrunda, ofast något plattade. Ytan dunkel, svart, ojäm. I dess sista ålder synes den derföre ej skild från *Sph. libera* Pers. l. c. Kanterne vanligen plattade, bilda stundom en conisk öppning.

3. *LOPHIUM curtum*, peritheciis confertis prominentibus globosis nigris, labiis linearibus nudis brevibus.

Vexer på vissnade grenar, sällsynt.

Hylshusen sitta tätt tillsammans, stundom hopflyta 2—3, till hälften upphöjda öfver veden, som är beklädd med en svart skorpa. Till formen nästan klotrunda. Kanterne jembreda, kortare än hylshusen, glänsande och slutligen affallande. Får då utseende af *Sph. pertusa*. P.

4. *LOPHIUM medium*, peritheciis sparsis globosis immersis nigris, labiis ellipticis nudis æqualibus cristatis.

*Sphæria media*. Pers. syn. p. 55.

K. V. A. Handl. 1818. St. I.



Vexer med förra.

ALBERTINI och SCHWEINITZ hafva med skål väckt tvifvelsmål emot sjelfständigheten af en del arter, som höra till detta släktet. Hylshusen klotrunda, mindre än följande arts, dunkelt svarta, spridde; men träffas äfven ofta tillhopasittande. Kanterne af hylshusens längd, bredare och mera kamlika, än hos följande art.

5. *LOPHIUM angustatum*, peritheciis immersis demum prominulis globosis nigris, labiis linearibus nudis æqualibus.

*Sph. angustata. Pers. syn. p. 55.*

Vexer på barklösa qvistar, rar.

På det närmaste förenad med föregående och följande. Qvistarne beklådas likaledes af en svart fläck. Från följande skiljer den sig genom ej hoptryckte hylshus, som slutligen blifva något utstående, och öppningarnes kortare kanter. Hylshusen utfalla omsider, och qvarlemna gropar i veden.

6. *LOPHIUM compressum*, peritheciis totis immersis compressis nigris, labiis linearibus prominulis longissimis.

*Sph. compressa. Pers. syn. 56.*

Vexer med föregående.

Öppningarnes kanter, hvilka ensamt äro höjde öfver veden, likna *Hysterium lineare*; men äro dubbelt smalare; för öfrigt 1 lin. långa, jämbreda, jämbhöga, glänsande; svarta. Hylshusens plattade sidor helt och hållit insänkte i veden, hvilken de icke en gång göra upphöjd, beklädd med en svartaktig fläck.

7. *LOPHIUM herbarum*, peritheciis immersis globoso-ellipticis nigris, labiis elliptico linearibus nudis distinctis æqualibus.

Vexer på vissnade örtstjelkar, nåsslor, o. s. v., sällsynt.

Hylshusen något plattade, fullkomligen insänkte, utan att göra öfverhuden något upphöjd; inuti merendels tomma, hvita. Kanterna äro smala, men midpå bredare af hylshusens längd, bara, öppna sig tydligen och blifva åtskiljde. Har varit förd till *Sph. dehiscens*. Pers.

8. *LOPHIUM Lonicerae*, peritheciis sparsis nudis subglobosis nigris glabris, labiis ellipticis distinctis brevibus.

Vexer på vissnade stjelkar af *Lonicera periclymenum*.

Är alldeles svart och glatt, så att *Sph. dehiscens* γ Pers. bör icke föras hit, utöm såsom en yngre status. Bör ej förblandas med *Sph. Lonicerae*. Denna hopfaller aldrig och har den olika kamlika öppningen.

9. *LOPHIUM Arundinis*, peritheciis erumpentibus tectis globosis confluentibus rugulosis atris, labiis compressis brevibus.

*Sph. cristata*. β Pers. syn. p. 54.

Vexer på vissnade strån af vass, ej sällsynt.

Hylshusen, af hvilka merendels 3—5 sammanflyta, omgifne af en svart fläck, utbryta genom stråets sprickor, men betäckte af dess öfverhud, hvaraf ytan är finskrynklig och svart. Sphær. *Arundinis* Sow, hör snarare hit, än till *Sph. striæformis* hvilken *Lophium Arund.* är mycket beslägtad med. Kanterne äro alldeles bare, korta, glänsande.

10. *LOPHIUM crenatum*, peritheciis confertis nudis globosis atris, labiis longissimis cristatis crenatis.

*Sph. cristata*. α. Pers. syn. p. 54.

1c. Pers. l. c. t. I. f. 15.

En af de större och skönare arter i släktet, väl utmärkt af sina långa kamformige naggade

kanter. Hylshusen svarta, dunkla, runda, något hoptryckte, tätt tillhopasittande, utan att sammanflyta eller vara insänkta i veden.

11. *LOPHIUM episphaerium*, gregarium, peritheciiis nudis compressis rubris, labiis longissimis cristatis.

*Sph. episphaeria*. *Pers. syn. p. 57. Tod. Meckl.*

2. p. 21.

Ic. *Tod. l. c. t. II. f. 89.*

Vexer på andra större Sphaerier, i synnerhet *Sph. stigma*; äfven på *Sph. fragiformis*, *cohærens*, *disciformis* m. fl.

Hylshusen äro ganska små, af en nijuk substans, hvarföre de eljest slåta, från sitt upprätta, platta, kamformiga utseende genom torkning blifva hopfallande och krusige. Äro alldeles bara. Fårngen är högröd, hvilket jemte vexestället lätt utmärker den. Med *Sph. coccinea*  $\beta$ . har jag likväl sett den förblandas.

12. *LOPHIUM mytilinum*, gregarium, peritheciiis superficialibus compressis pedicellatis, sursum dilatatis, striatis, rimoso-dehiscentibus. *Fr. Obs. 2. p. 345.*

*Hysterium mytilinum*. *Pers. syn. p. 97. Albert. et Schwein. p. 54.*

*H. pedicellatum*. *Schum. Sæll. II. p. 135.*

Vexer på gammal tall- och granved, allmänt.

Veden, hvarpå den vexer, beklådes af en svart skorpa, hvilken sällan saknas. Skaftet ganska kort, ofta doldt i skorpan. Hylshusens plattade, kamlika, nedtill något uppblåste, svarta; med en spricklik öppning längsefter, inom fina omärkliga kanter. Ytan är tvärsöfver strimmig, inuti är den måst tom.

13. *LOPHIUM barbarum*, peritheciis erumpenti-superficialibus hemisphæricis lævibus nigricantibus, demum in labiis tumidis fissis.

Vexer sållsynt på barkfallne qvistar.

Skiljes från alla föregående, att det icke har tydliga skilda kanter, utan att sjelfva hylshuset, som är tämmeligen stort, halfrundt, i början tillslutit, öppnar sig långsefter som hos *Hysteria*. Dess inre daning är alldeles af detta slägtet; ty det bleka fröslemmet hoptorkas snart, utan att det hopfaller. Ytan glatt, måst slät. Närmare undersökte, torde en del *Hysteria* böra föras hit.

## II. BOSTRYCHIA *Fries.*

*Perithecia globosa*, mollia, collo elongato instructa, receptaculo inclusa (*l. simplicia?*). Gelatina soluta, in cirrhos erumpens.

*Anm.* Under *Næmasporæ*, perithecio instructæ, har Doct. *PERSOON* och dess efterföljare upptagit dess arter. Från *Næmasporæ*, som sakna perithecium, äro de såkert lika så skilde till slägte, som *Stilbosporæ* och *Sphæriæ*, ehuru en synnerligen gemensam habitus förenar dem. *Næmasporæ* komma således att föras till *Epiphytæ*. En ny art (*N. tremellosa*, tuberculo crispato cellulari plano, gelatina profusa abnormi aurea) har mycken likhet med *Stilbosporæ* på ytan och en annan svart, kan jag icke säga, hvilket slägte den snarast bör föras till.

Arterne af detta slägtet hafva en synnerlig likhet med *Sph. tuberculata discoidea*, att jag ofta varit frestad, att anse dem för yngre åldrar af dem.

\* *Egentlige*, med fäste (*Compositæ*).

1. *BOSTRYCHIA rubescens*, depressa, disco erumpenti convexo sordido, cirrho rubescente.

Vexer på vissnade qvistar, om hösten.



Till att upplysa detta så tvåtydiga släkte, utbeder jag mig få anföra dess utförliga beskrifning, på Botaniska språket.

Receptaculum more congenerum subcorticale et in hac specie, *Sph. niveæ* instar, incusum et subcircumscriptum, orbiculare, depressum, includens stroma albidum cum rudimento sphæularum circumstantium et in centro Perithecium molle virescens, quod continuatum, discum formans, epidermide lacerata, erumpit. Nucleus globosus niger firmus, gelatinam flavo-rubram e centro propellens. Structura sane singularis! Discus erumpens, ellipticus, carnosus, sordidus (olivaceo-nigrescens l. fuliginus), junior pruinosis, mox nudus, astomus; truncatus monstrat collum perithecii et ductulum tenuissimum nigrum, nucleo contiguum dissectum cirrhos mox propellens. Cirrhi longissimi, tenerrimi flavo-rubri.

2. *BOSTRYCHIA chrysosperma*, subconica truncata atra, cirrho luteo.

*Næmaspora chrysosperma.* Pers. syn. p. 108. *Albert. et Schwein.* p. 67.

Ic. Pers. Obs. Myc. I. t. 5. f. 8. Sowerb. t. 137.

Vexer på vissnade qvistar af Lind, Al, Poppel o. s. v.

Bildar runda upphöjda vårtor på barken. Den utbrytande disken är svart, med en, sällan flera öppningar. Inre substansen mjuk med rudimenter till flera hylshus; klängena gula, ensamma.

3. *BOSTRYCHIA leucosperma*, depressa atra, cirrhis albidis.

*Næmasp. leucosp.* Pers. syn. p. 108. *Alb. et Schwein.* l. c.

Ic. Hoffm. Veg. Crypt. t. 5. f. 1.

Fåstet består af svarta celluler; under regnväder framskjuter dess, liksom de öfriges, klängen, som åro hvita. Troligen förblandas flera arter härunder. Är icke sällsynt på Bok, Afvenbok, Alm o. s. v.

4. *BOSTRYCHIA melasperma*, depressa atra, cirrho concolori.

Vexer på Björkgrenar.

Fåstet liknar en *Sph. tuberculata circumscripta* med gråsvart stroma, och tydliga runda svarta hylshus. Disken utbrytande, ojämn, svart. På samma ställen förekommer en likafärgad art; men utan hylshus. Ibland liknar den fullkomligen en *Stilbospora*.

*Anm.* Flera förekomma visst; men då jag misstänker dem vara en yngre ålder af *Sphæriæ*, torde vara tjenligt förbigå dem.

\* \* *Oegentlige, utan fåste (simplices).*

Ännu mera misstänkte åro desse. *Sph. Tilia*, *juglandis*, *atrovirens* m. fl., skulle kunna upptagas här. Jag anför endast tvänne, men högst besynnerlige, vextformer.

5. *BOSTRYCHIA rhuina*, perithecio globoso solidiusculo pallido, cirrho tenerrimo concolori.

Næmasp. *rhuina*. *Fr. Obs.* 2.

På vissnade qvistar af *Rhus typhina*. Vid Lund.

Hylshuset rundt, mjukt, slätt, glatt, blekt, utan tydlig kärna, derföre närmast *Sclerotium*. Klånget ganska fint, träffas mycket sällan.

6. *BOSTRYCHIA globifera*, tuberculo difformi sublobato stramineo nigro-limitato, gelatina globosa flavofusca.

Vexer uti inre barken af *Spiræa Opulifolia*.

**Paradox.** Ehuru fröslemmet bildar klot, kan den icke föras till följande slagte Sphæronæma; detta klot sitter ensamt öfver barken, är qvarsittande (persistens), ibland aflångt. Fåstet är alldeles invext uti den inre fasta barken, att det icke kan skiljas särskildt, är blekgult, med svart rand i kanten, flera merendels hopasittande eller flikige, att det blir nästan cellulårt.

(Fortsättning i sednare Häftet af detta års Handlingar.)

---

# PHYSIOGRAPHISKA OBSERVATIONER

*under en Resa genom vestliga delarne af Gestrikland, Helsingland och Jämtland;*

af

CARL JOH. HARTMAN,  
Med. Stud.

**F**å vetenskaper kunna interressera menniskan och gagna medborgaren mera än läran om de alster, som beklåda ytan af vårt klot, deras egenskaper och förhållanden till sig sjelfva, till deras rum och deras klimat. Med förbigående af den intellectuella nyttan för utvecklingen af en mängd i philosophiska hänseenden viktiga ideer, är Naturalhistorien, äfven till sin theoretiska del, ett af medicinska konstens kraftigaste stöd, såsom den, hvilken bestämmer affiniteten i byggnad och följaktligen, med vissa modificationer, analogien i verkningar; samt då den med kännedom och urskillning användes, en af jordphysiologiens förnämsta hjälpredor. Det förre af dessa Naturalhistoriens ändamål, har redan från vetenskapens första gryning legat dess idkare mer eller mindre tydligt för ögonen, dess sednare del eller Vextgeographien har först i nyare tider utvecklat sig i bredd med de öfrige i linda liggande empiriska vetenskaper, bland hvilka den förtjenar ett utmärkt rum såsom en af grundvalarne för den



rationella hushållningen och statistiken. Hvad sednare tidens Physici åtgjort i denna våg är obestrideligen af högt värde, ehuru man ej undgår att stundom stöta på theoretiska uppgifter, hvilka byggde på ensidiga åsikter, eller icke nog undersökte phenomenoner, sakna den tillförlitlighet och allmänna användbarhet hvarpå de göra anspråk. Den sammansatta verkan af mångfaldiga orsaker, som inflyta på hvarje naturphenomen, fordrar den måst ihårdiga undersökning, och endast en rik fond af observationer, kanske mera nödvändig här än i andra vetenskaper, kan gifva osvikliga resultat. Det är därför jag vågar hoppas att Kongl. Vetenskaps-Academien, tackes såsom ett litet bidrag till denna fond, med benågenhet mottaga följande afhandling, ämnad till fäderneslandets bättre kännedom i denna våg, så lyckligen banad af en WAHLENBERG, med hvars iakttagelser jag i de flesta afseenden funnit min egen yngre erfarenhet instämma, och hvilka jag anser lika naturenliga som enkelt framställda. Då en del af våra provinser genom hans rasilösa ifver så lyckligt blifvit undersökte, har jag trott det lämpeligt att underkasta dem jag år 1813 hade lägenhet att besöka en dylik öfversigt, för hvars detalj, hvilken jag af flere anledningar ansett böra i geographisk ordning framställas, jag utbeder mig Kongl. Vetenskaps-Academiens upplysta granskning.

Redan inom nordliga gränsen af Upland begynner vegetationen antaga ett mera nordiskt skick, en stor del vanligare sydländtare växter öfverskrida näppligen *Dalelfven*, hvilken synes utgöra en tämligen naturlig gräns mellan den sydliga och den mera nordliga vegetationen. Dem jag funnit här upphöra, äro följande:

Myosotis Lappula.  
 Cynoglossum offic.  
 Campanula Trachelium.  
 Jasione montana.  
 Viola hirta.  
 Asclepias Vincetox.  
 Sium latifolium \*).  
 Armeria vulgaris.  
 Acorus Calamus.  
 Rumex Hydrolapath.  
 Mespilus Cotoneast \*).  
 Pyrus Malus.  
 Cratægus Oxyacanth.  
 Pulsatilla vulg.

Galeopsis Ladanum.  
 Melamp. nemorosum.  
 Ononides.  
 Anthyllis Vulneraria \*).  
 Orobus niger.  
 Trifolium agrarium.  
 Serratula tinctoria.  
 Onopordo. Acanth.  
 Carlina vulgaris.  
 Orchis sambucina.  
 Stratiotes Aloides \*).  
 Potamogeton crispus.  
 P. lucens et compressum.

Vid eller få mil norr om Gæfle (Latit, 60°40')  
upphöra följande:

Pulmonaria officin.  
 Primula veris \*).  
 Rhamnus Cathart.  
 Ornithogal. luteum L. 1)  
 Saxifraga granulata.  
 Lythrum Salic.  
 Euphorbiæ \*).  
 Cratægus Aria. L. Fl. Sv.  
 Potentilla reptans.

Tilia europæa.  
 Helianth. vulgare.  
 Leonurus Cardiaca.  
 Vicia sepium.  
 Trifolium hybridum.  
 T — arvense.  
 Typhæ.  
 Alnus glutinosa.  
 Quercus Robur \*\*).

\*) Visa sig väl någon gång i de öfre provinserne, men ytterst sällan. Äfven bör anmärkas att då i det följande vexters nordliga gräns omtalas, gäller det endast för de från hafvet aflägsne trackter, hvilka jag besökt; som bekant är, fortplanta sig vexterne högre upp närmare hafs-kusten.

\*\*) Mest nordlig 1½ mil n. om Gæfle vid Storbron i Hille Sökn der den temmeligen ömnigt finnes på holmarne i Ava-ån, och hyser i sin skugga den eljest så sydlande *Osmunda regalis*.

Till ersättning för de vexter, som i denna trackt upphöra, begynna de mera nordlände att ömnigare visa sig här omkring:

Aira bothnica.	Carex aquatilis.
Ribes rubrum.	C — chordorrhiza.
Rubus arcticus.	C — capillaris.
R. Chamæmor.	C — Buxbaumii.
Potentilla norveg.	Alnus incana.
Anemone vernalis.	Betula nana.
Linnæa.	Salix limosa.
Carex norvegica.	Equisetum reptans. (Östl.)
C — glareosa (Östl.)	Lycopodium selaginoides.
C — loliacea.	L — — complanatum.
C — globularis.	

Af sällsyntare vexter förekomma omkring Gefle utom redan nämnde:

*Fritillaria Meleagris*, på ångarne nedom Sockerbruket.

*Hyacinthus botryoides*, på Printzens ång i Urfjäll.

*Draba nemorosa* blandad med *Dr. verna* i vestra trackten af staden.

*Trifolium spadiceum*.

*Carduus nutans* och

*Senecio Jacobæa*, inkomne med ballastsanden, men sedan bosatte på flere ställen.

*Eupatorium cannabinum*.

*Achillea Ptarmica*.

*Malaxis monophyllos* vid Verkfjärden på Edskön i Hille.

*Cypripedium Calceolus* vid Siggebodarne, 2 mil från staden.

*Zannichellia palustris* alltid i salt vatten.

*Hippophæ*.

*Asplenium Breynii* på vallbacken (Östl.)

*Botrychium rutaceum*.

*Lycopodium inundatum* (Östl.)

Jordtemperaturen vid Gefle 5°5, (enl. Wahlenb.)

Vid Wi Säteri i Ugglebo Sökn lyckas ännu Ekplanteringen, äfven förekommer ännu i trågårdar *Robinia Caragana*, hvaraf jag fann en vacker buske till och med på Frösön vid Reg. Läkare bostället. I de med gran och björk bevexte kårr, som omgifva vågen i Hille och Ugglebo Söknar, förekommer först *Betula nana*, som här uppnår i höjd nära 3 fot. *Carex globularis* tilltager i öm-nighet vid intrådet i Helsingland äfvensom *Rubus arcticus*, hvilken med sina röda blommor betäcker vågkanterna samt alla vid diken, rödjningar o. d. st. uppkastade jordhögar \*).

Jordtemperaturen vid Långbo G. g. i Skog Söken *Helsingland* omkring 4°, enligt en ganska rik kallkälla, hvars värmegrad den 9 Junii var 3°5. Kallkällornas vatten, som i denna trackt framtränger öfverallt i skogskårren, betäckes med tjocka lager af *Stellaria uliginosa* 2), *Bartramia fontana* och *Jungermannia pallescens*.

Höga skogsvexta berg omgäfvos å ömse sidor Ljusna-elfven, som man möter nära dess sista krökning mot hafvet. Dessa berg, af hvilka Bollberget är det förnämsta hysa intet märkvärdigt \*\*). Vid sist-nämnde bergsfot anmärktes den sista stam af *Alnus glutinosa*. Ängarne få härstädes ett magert utseende och äro bevexte endast med smärre gräsarter, *Potentilla verna* (var. *major*.) *Geranium sylvat.* och *Ra-*

---

\*) I synnerhet visar den sig öm-nig på svedjelanden, der den straxt efter svedjandet uppskjuter, om än ganska långt från sitt vanliga uppehåll, hvilket bevisar att jorden redan förut varit försedd med dess frön. Att björken förhåller sig på samma sätt förklaras lätt af dess olikartade frökastningssätt.

\*\*) *Buxbaumia aphylla* vexte i myckenhet på toppen af Bollberget, hvilket är beläget i Bollnäs Sökn.



*nunculi*. *Viola tricolor* gaf dem ofta hel och hållna ett blått utseende. *Ask* skall finnas i skogarne, men *Alm* och *Lind* äro aldeles okände. *Cornus suecica* begynner i Undersviks Socken visa sig vid vattnen, men blir ej rätt allmän förr än vid inträdet i Jämtland. *Pinus hybrida*, som äfven förekommer vid Gefle, träffades i sistnämnde Socken vid Prästgården, och befanns här så väl som på förra stället omgifven af yngre plantor, hvilket bevisar dess förmåga att fortplanta sig sjelf. *Impatiens* och *Circæa alpina* visa sig vid det pittoreska berget Dropphållan i samma Socken, och förekomma sedan icke mera.

Vid det för sin offerkälla och Åttestupa namnkunniga Offerberget i Undersviks Socken, träffas på ången för första gången *Phleum alpinum* med tjockt cylindriskt ax; den förekommer sedan ymnigare i Färila Socken, t. e. vid Laisekrogen, der äfven *Poa alpina* och *Trollius europæus* vidtaga.

Vid det berömda fallet Læforsen befanns jordtemperaturen i en källa, som framskjuter horizontelt utan reservoir ur en höjd, 4 ° \*). Trackterne håromkring voro betäckta med *Lichen polaris*, *Erica vulg.*, *Salix livida* och *Anemone vernalis*, som i myckenhet träffas i dessa omätliga tallhedar. I Ljusdals Socken förekommer *Lychnis alpina*, hvilken skall visa sig på flere ställen i Helsingeland, men observerades icke någorstädes i Jämtland. I allmän-

---

\*) Hvilken temperaturgrad synes vara den naturliga och stämmer bättre öfverens med Latituden 61°45' än den sist observerade i sydligaste Helsingeland. Måne ej de tjocka skogarne och kärren som så önnigt betäcka vissa trackter, hindra betydligt lufttemperaturen att verka på jordens? Jag har åtminstone funnit att på dylika ställen temper. alltid varit disproportionallt (till Lat.) låg mot på cultiverad eller torr mark, oaktadt årstiden och källsprängens beskaffenhet varit enahanda.

het åro få fjällörter så benägne till utvandring som denne, hvilken, utan att vara bestånd till någon viss byggd, träffas i mängd ån i högsta fjälltrackterne i Luleå Lappmark ån i östra Dalarne (Hedemora), i Helsingelands slättbyggheder och på Ölands kalkberg.

Vid denna höjd (Lat. 62°) mögnar Rågen och Kornet ungefärligen på samma tid. Den förra sådesartens odling aftager småningom till dess man på Storsjöns stränder åter möter Rågåkrar, hvilka merendels mogna sednare ån kornet, hvarigenom skördetiden i dessa nordliga trackter få ett omvänt förhållande till det södra Sveriges.

Vidsträckt tallskogar vidtaga närmare gränserne mellan Helsingeland, Herjedalen och Jämtland, hvilka dessutom bestämmas af bergshöjder, som nedstiga från secundära fjällryggar eller utgreningar från stora grånsfjällen. Således afskåres vägen nära Jämtnas gräns af en landthöjd kallad Klackåsen, som synes utgöra en fortsättning af de nära intill belägna Klöfsjö fjällen.

Man har knappt öfverstigit dessa fjällhöjder, förrän man i de vattnen omgifvande delar blifver öfverraskad af den täcka *Viola biflora* (Lat. 62° 22'), som med sina små gula blommor lifvar den unga grönskan och vittnar att man icke inträdt i en fjällprovins. Detta bestyrkes af de många Pilarter (*Salix limosa*, stor och fruktbärande, vid Gessle alltid steril; *S. livida*, *phylicifol.* *nigricans* m. fl.) som uppfylla alla kärr: af källornes och de öfrige vattnens större klarhet: den stora myckenhet af *Aconitum septentrionale*, som uppfyller hvarje obrukadt ställe, och i synnerhet beklåder foten af de mera kågelformiga och brustna klipporna: de branta landthöjderne, på hvilkas södra sluttning Bonden anlaggt sina små åkerstycken, och framför allt af utsigten till de snöklädda glänsande fjällen, hvilka

snart framstålla sig i horisonten. En minskad jordtemperatur (vid Böhle Gästgifvaregård)  $3^{\circ},5$ , öfverensstämmer med de öfriga omständigheterna.

Vid inträdet i Jämtland denna våg, upphörer aldeles *Rubus arcticus*. *Carex globularis* aftager åfven tills den i fjällen aldeles försvinner.

Hofverberget i Bergs Socken Jämtland, ehuru ett fullkomligt isolerad skogsberg, hyser dock i sin skugga de första egenteliga fjällväxter, nemligen: *Juncus triglumis*, *Serratula alpina*, *Carex alpina* (jämte *C. ornithopoda*) och i ömninghet den täckaste af Svenska Ormbunkar, *Aspidium montanum*. *Thalictrum alpinum* och *Orchis nigra* begynna redan på hårdvallsångar att blifva mer och mer ömninge, lika som *Pedicularis Sceptum* Car. på de vattensjuka \*).

*Plantago media* och *major* äro här allmänna, men *Pl. lanceolata* har alldeles upphört; *Stellaria nemorum* och *Struthiopteris vulg.* uppfylla alla Bäckdalar, och *Cardamine amara* källorna, sedan *C. pratensis* nästan helt och hållet försvunnit.

Vid Oviks Prästgård synes aldraförst på torra ångar *Astragalus alpinus*, vid dess första blomning (den 20 Junii) nästan fullkomligt *acaulis*, sedan med mera än quarters hög stielk; i sumpiga ångar (t. e. den nedom Prostgårdens åker) *Salix myrsinites*, *Tofieldia borealis* samt den vackra *Carex capitata* blandad med *C. dioica*. *Andromeda polifolia* och *Corallorhiza* visa sig här långt skönare än i de sydliga provinserne.

Jordtemperaturen  $2^{\circ}9$ .

När-

---

\*) *Pedicularis sylvatica* tillbars mig lefvande af Klockaren i Berg, tagen på en ång nära kyrkan; vexande har den icke förekommit mig sjelf.

Närmare Frösön (Lat.  $63^{\circ}, 10'$  — höjd öfver hafvet 640 fot) vidtager *Primula stritta* Hornem.; ännu blandad med den ömnigare *P. farinosa* 3), från hvilken den lätt urskiljes genom sin högre men få-blommigare stielk. Jordtemperaturen vid Mångård i Sunne  $4^{\circ}2$ , äfven mötte mig oförmödad vid landstigandet på Frösön, den allt från Gefle saknade *Primula veris*, som dock var både sparsam och fåblommig. Tvänne goda kalkkällor på Frösön visade (d. 25 Junii) den ena vid Rödösundet  $4^{\circ}2$ , den andra ungefärligen midt på ön  $3^{\circ}8$ . Orsaken till dessa tvenne sednare källors högre temperatur jämförd med förut observerade temperaturer, ligger otvifvelaktigt dels i trackternes större odling på östra Storsjöstranden, dels i deras större aflägsenhet från fjällen, hvilka som en halfcirkel omgifva Storsjöns västra byggder. Äfven torde det kalkartade solum som både utmärker Frösön och omgifvande Socknar (t. e. Brunflo och Lith) hårtill bidraga \*). De under resan gles spridda sydligare växter tyckas åter församlat sig omkring Botanisten, och ses här *Phleum* och *Alopecurus pratensis* åter, ehuru de tyckts upphöra med Helsingeland, *Chara vulgaris*, *Eriophorum latifol.*, *Lychnis dioica alba*, *Leontodon palustre*, *Hieracium cymosum* och *Polygala amara*. Mera öfverraskande är det att härstädes träffa *Ophrys myodes*, då ej ens *Orchis bifolia* förekommer i Jämtland \*\*).

\*) Kalken, som synes utgöra grunden för en stor del af ön, förekommer under trenne olika former: den rödaktigt bruna, som visar sig i större strycken och är den allmänaste; svart med hvita ränder (*Calcareus æquabilis niger*, *lineis albis not.* Wallerius), hvars fasta klyft ej är känd, men uppkastas i smärre strycken öfver allt på stränderne; och hvit pulfverformig, eller så kalladt Bleke, som utgör ett tjockt lager i de fläste kärr på ön, och är tydligen af animaliskt ursprung (Se V. A. H. 1814).

\*\*) *Ophrys myodes* meddeltes mig af Regem. Läk. Gertrich, ta-



För öfrigt har ön oaktadt sin sydliga natur en icke ringa andel af fjällarnes innevånare: *Poa alpina* och *Astragalus alp.* trampas vid hvarje steg. *Polemonium cæruleum* omgifver stenrösen, *Viola biflora* alla bäckar, och kårren äro fyllda af *Splachna* såsom *luteum*, *gracile*, *sphaericum* och i synnerhet *vasculosum*.

Sådesslagens odling lyckas väl i dessa Socknar i synnerhet uti Brunflo. Hvetets lærer äfven vara försökt, enligt HAGSTRÖMS uppgift \*).

*Carduus heterophyllus* och *Serratula alpina* utgöra en betydlig del af kreaturens foder; mera prägt än gagn medförer den ömrigt vexande manns-höga och blomrika *Hundflokkan* (*Aconit. Sept.*) 4), hvilken stundom förekommer med blackhvita (aldrig gula) blommor.

Vid Storsjöns nordliga ända (Alsens Socken, Lat. 63° 21') visar sig först på denna väg, *Gentiana nivalis* som nyss öppnat sina azurfärgade blommor (d. 4 Julii) på torrare ställen af ångar, som på de sankare stundom i ömighet hysa *Juncus carthaneus* 5), hvilken ännu ej blommande åger ett snarlikt utseende af ett *Eriophorum*. På ången närmast Gåstgifvaregården i sistnämnde Socken förekommer utom nyssnämde, *Orchis cruenta* Fl. D. 6), hvilken jag ej observerat flerstädes, och är utmärkt för intensiteten af sina färger och sina starkt fläckade blad. På skogsbergen visa sig *Saxifraga tridactylites* och *petraea* Wahlenb.

Det allmännaste trädet i skogarne, som omgifva fjällbyggderne, är i Jämtland Granen, hvil-

---

gen på en äng hörande till Boställer. Orchidernes migration synes så oregelbunden att de förmodeligen aldrig kunna användas i växtgeographiskt afseende, då icke frågan är om hela jordzoner.

\*) Jämtlands Oecon. Beskrifning. Stockh. 1751.

ken sällan, om ej i sydvästra delen af landet, aflöses af Tallen, hvilken i de trackter jag besökt, är ett tåmmeligen sällsynt träd. Den för nordliga fjällmarkerna (v. Fl. Lapp. Wahl.) gällande theorie är följakteligen icke applicable till dessa sydlandta trackter, der Granen omedelbart aflöses af Björken. De variationer i ordningen, som Doct. WAHLENBERG anmärkt i Umeå Lappmark, synes förbereda det i Jämtland verkligen inträffade omvånda förhållandet.

Redan vid Undersåkers kyrka vidtager en rikare fjällvegetation med den af mig (se Vet. Acad. Handl. 1814, 1 St.) så kallade *regio subrylvatica*. Den bebådas af *Saxifraga aizoides*, *Bartsia alpina*, *Carex alpina* i största ömnighet, och *Weisia Splachnoides* Wahl., hvilka alla omgifva Åre-elfvens stränder.

Det i släutlandet längst framskjutande fjället *Åreskutan*, hvilket på tåmmeligen betydligt afstånd från de stora grånsfjällen, uppreser sig som en barriere för den sydligare vegetationen, synes redan vid Kall- och Årevattnens sammanlopp, från sin skogvexte vidsträckt fot småningom höja sig i en plattad conisk form, med största massan belägen mellan Åre kyrka och Östra Kallsjön. Tvåne af dess toppar uppnå Snöregionen, den högste är 4657 fot upphöjd öfver hafvet och 3100 fot öfver Kallsjön. Den besynnerliga blandning af Nordens och Söderns producter på dess ofta lodrätta sidor, dess med täcka dalar, cultiverade höjder och mörka skogar varierade fot, samt låget mellan tvåne betydliga sjöar, göra det till ett af de intressantaste fjäll i Norden \*).

---

\*) Jag har på ett mera detaljeradt sätt beskrifvit detta fjäll i dessa Handlingar för år 1814 förra Strycket, hvarföre jag här syssel-

På östra Kallsjöns stränder förekommer redan *Salix glauca* 7), hvilken icke befunnits nedstiga till egentliga slåtlandet, och således kan räknas till de vexter som beståmina fjällens skogsregion \*).

Vid besigtigandet af detta fjäll (Lat. 65° 30') möta fjällväxterne i följande ordning:

(D. 9 Juli.) På ömse sidor om karrvägen från Huså Hytta till Bjelkesgrufvan: *Stellaria uliginosa* var.  $\beta$ , *Saxifraga aizoides*, *stellaris* 8); *Veronica alpina*, som vid denna sin nedre gräns ofta är 7—10 tum hög; *Stellaria Cerastoides* L. 9); *Alchemilla alpina*; *Silene acaulis* 10). (D. 20 Juli.) *Eriophorum capitatum*; *Juncus castaneus*, båda stundom på sjelfva vägen; *Astragalus Oroboideus* vid Skutåns stränder ofta mera än fothög; (D. 24 Aug.) *Gnaphalium supinum* Wild. 11) på grushögarne ofvanföre Bjelkesgrufvans vindhus; *Gnaph. fuscatum* bland buskarne öfver allt; (9 Julii.) *Pinguicula villosa*, som i Jämtlands fjäll endast träffas på den mera plana subalpina region, hvilken består af moss-lager, i synnerhet af *Sphagna*, och är beväxt med *Sal. glauca* och *Empetrum*; *Pedicularis lapponica* 12), den förstnämndes alltid säkra följeslagerska; *Betula alba humilior*, mycket sällan (i Ulldalen) blandad med en Mellanart (*B. pumila mihi l. c.*) emellan *alba* och *nana* 13); *Salix herbacea* 14), blandad med den nu mera knappt fingershög *Betula nana*, som begynner försvinna; *Arbutus alpina* \*\*); *Diapenzia lapp.* vid omkring 300 famnars sluttande

---

sätter mig endast med vexternes progression på dess sidor, såsom på en gång upplysande för vextgeographen och botanisten.

\*) *Papilio Embla* och *Chrysomela lappon.* L. bebo i ömnhet denna region.

\*\*) Blommade icke 1813, hvarföre knappt något enda bär syns om hösten; andra år skall den producera en myckenhet af blommor.

höjd från Grufvan, utmärkande *Regio alpina*; *Juncus spadiceus* Wahl. Fl. Lapp. 15). *Menziesia caerulea*; *Salix reticulata*; (20 Jul.) *Dryas octopetala*; *Erigeron uniflorus* 16); (9 Jul.) *Cardamine bellidifolia*; *Rheum digynum*; *Cerastium alpinum villosum* 17); *Saxifraga oppositifolia*, hängande i famnslånga ruskor i de lodrätta klippväggar som vidtaga i *regio frigida*, samt i smärre sprickor; (20 Jul.) *Andromeda hypnoides*; *Saxifraga nivalis minor* och *S. rivularis* i klyftor dit solstrålarne sällan eller aldrig intränga; den i Jämtland alltid enblommiga *Ranunculus glacialis* 18) och *Ran. pygmaeus*.

Så snart desse högsta fjällväxter begynna vidtaga, träffas de alltid på våtare ställen, ej sällan i sjelfva vattnen, som framvälla undan snödrifvorne; men ju högre man följer dem, på desto torrare ställen uppstiga de.

Den högste phanerogam på Fjällen är *Juncus arcuatus* Wahl. som bebor till och med öfversta toppen af Åreskutan, der föröfrigt intet finnes utom *Andreaea alpina*, och några få *Lichenes*, såsom *Cedri*, *cylindricus* och dylika.

Dålderne, som omgifva de många nyfödda bäckarne, tillocka sig de lägre växterne, såsom *Bartsia*, *Viola biflora* *Alchemilla vulgaris* *Rheum digynum*. *Tormentilla*, *Geranium sylvaticum* m. fl. På dylika ställen, utan bestämd plats, förekomma *Aira alpina* L. 19). (af mig endast tagen i Blästensdalen den 25 Juli) *Poa laxa* 20) och *flexuosa*, jämte *Agrostis alpina* 21).

I de angenäma dalar, som ligga mellan Åreelfven och Åreskutfjället observeras följande, hvilka icke synas inskränka sig inom vissa höjder, men dock icke afslägsna sig från fjällets fot: *Tussilago frigida* 22) (d. 16 Julii utblom.); *Erigeron alpi-*



num, hvilken jemte *Gentiana nivalis* pryder alla ångar och i myckenhet Åre kyrkogård. På sistnämnde ställe fanns nära Elfstranden *Hieracium prenanthoides* Willd. 23) som längre in uti Augusti, öfverallt in subsylvaticis lyste med blekgula blommor, *Carex atrata* 24), *Epilobium alpinum* under båda formerne 25), *Aspidium Lonchitis* och *Hieracium alpinum* 26) träffas i mängd i bäckdalarne; *Anthyllis Vulneraria*, *Mespilus Cotoneaster*, *Silene rupestris*, *Gnaphalium dioicum* (forma max.), *Veronica saxatilis*, hvars blommor i storlek och färg täfla om ej öfverträffa *V. Chamædr.*; *Woodsia hyperborea*, och *Juncus spicatus* betäcka Humlarnes branta sida, i hvars mera fördolda sprickor *Asplenium viride* sparsamt träffas, *Cheiranthus Erysimoides* 27) Smith. Fl. Lapp, ses på samma ställen täfla med *Epilobium angustifolium*. (alla blom. d. 16 Juli). I steniga bäckar *Poa glauca* 28) och öfverallt på fjällfoten *Apargia Taraxaci* 29). hvilken högre på fjället alltid är simplicissima och högst svartluden till stjeltens öfre del och blomsodret, alldeles utlännigarnes. Den blommar tidigt och sätter frö (d. 30 Juli) redan innan *A. autumnalis*, som i stor mängd framkommer i höstmånaderne, hunnit få blommor.

Då man öfvergifver Åreskut-fjället, som ligger nästan fullkomligt isoleradt från andra betydliga höjder, för att besöka de närmsta gränsfjällen, hvilka till en del äro betydligt högre än Åreskutan, möter man i de af många vatten genomskurne trackterne en del af de högre fjällvexterne: *Hieracium alpinum*, *Apargia Tarax.*, *Alchemilla alpina*, *Juncus spicatus* och ändteligen på Handöls-fjällens lägsta fot *Azalea procumbens*, hvilkas nedstigande på slätlandet, i synnerhet den sistnämndes, bevisar dels att landet småningom höjer sig, dels att Åreskut- och

Renfjällen utestånga från dessa bygder de mildare vindarne.

Jordtemperaturen (Tjufkällan vid Tångbøle, d. 15 Juli)  $2^{\circ}6-3^{\circ}0$  (d. 30 Aug.).

*Snaasahögen*, det betydligaste af Handøls fjäll, anser jag vara en fjerdedel högre än Åreskutan eller omkring 5800 fot öfver hafvet, dels af den större höjdvinkel detta fjäll synes äga, dels af vegetationen, som redan är subalpin vid de foten omgifvande vattnen. En del af de högre regionernes vexter visa sig till och med ömnigt nog omkring strömmarne, t. ex. vid Handølans fall, få fot öfver Ånnsjön: *Salix reticulata*, *Rhodiola*, *Arabis alpina* och *Cerastium alpinum*. Detta fjälls subalpina region är mera gräsvegetation än Åreskutans och hyser i myckenhet (d. 16 Juli) *Phaca frigida* 30), *Kobresia caricina* 31), som blommande, knapt är fingershög, men fröbärande 7—8 tum. *Carex rupestris*, *ustulata*, *saxatilis* 32), *pulla* m. fl. hvilka högst sällsynta på Åreskutan, utgöra här en betydlig del af vegetationen. *Angelica Archangelica* 33), som utmärker sig från alla mig bekanta arter genom sin, i proportion mot bladen och umbellernas storlek och alla delars tjocklek, korta stielk, samt blomornas färg, *Rhodiola* och *Pedicularis lapponica*, äro här ömnigare än annorstädes; vid vattnen begynner den sköna gullgula *Pedicularis versicolor* Wahl. 34) och tilltager i mängd ju högre man uppstiger på fjället. *Saxifraga cespitosa* (utbl.) mycket sällsynt på torra klippor, *Alsinella biflora* och (1 Sept. utblom.) *A. stricta*, vaxa blandade på fugtiga klippor med *Astragalus Oroboides* o. d. Nedom högsta coniska toppen af fjället finnes blandad med *Salix herbacea* Doct. Wahlenbergs *S. polaris* 35), som äfven utan blommor, lätt urskiljes med sina

mycket jemnare (ej så ådrige och skrynkliga) blad, samt ludne ax.

De mellan Snaasahögen och Riksgränsen lig-  
gande trackter tilltaga till den höjd att äfven de  
högsta Fjällvexterna, såsom *Ranunculus glacialis* och  
*Andromeda hypnoides*, nedstiga på flodernes (Ena-  
äns och Handölsans) stränder.

Sydlandtare hit uppstigande växter äro:

<i>Anthoxanthum.</i>	<i>Fragaria</i> & <i>Comarum.</i>
<i>Festuca ovina</i> & <i>rubra</i> $\beta$ .	<i>Ranunculus acris</i> 36).
<i>Viola palustris.</i>	<i>Caltha palustris.</i>
<i>Pimpinella saxifraga,</i>	<i>Melampyrum sylvat.</i>
<i>Carum.</i>	<i>M. pratense.</i>
<i>Chærophyll. sylvestre.</i>	<i>Linnæa.</i>
<i>Geranium sylvaticum,</i>	<i>Polygala amara.</i>
<i>Trientalis.</i>	<i>Vicia Cracca.</i>
<i>Vacciniæ.</i>	<i>Leontod. Tarax. &amp; palustr.</i>
<i>Cucubalus Behen.</i>	<i>Carex filiformis</i> 37).
<i>Rubus saxat. &amp; Idæus.</i>	

Detta fjäll hyser de sällsyntaste växter i myc-  
kenhet, och förtjenar Botanistens fortsatta undersök-  
ningar,

Fjällbygderne Nordligt och N. V. från Åre-  
skutan, hvilket fjäll ligger lika, som i medelpunc-  
ten af en stor fjällcirkel, höja sig icke betydigen  
öfver regio subalpina; Anjeskutan och Manshög-  
arne i Norr, och stora Kluken i väster synas dock  
härifrån göra undantag, emedan dessa fjäll, i syn-  
nerhet det förstnämnde, äro snöbeklädde nästan hela  
sommaren. I dessa trackter är Toltan (*Sonchus al-  
pinus*) rådande jemte en mängd storvexta grässlager,  
hvilka göra dem till de tjenligaste platser för Fä-  
bodar. Det allmännaste grässlaget i dessa skogri-  
ka trackter är en afart af *Aira flexuosa*, hvilken  
mer än sannolikt är von LINNÉs *A. montana* 38).

Af *Holcus borealis* märkes en vacker, kanhända skiljd artförändring med dubbelt större ax och mörkare färg än vanligt 39).

Sjöarne, som utgöra Kalls vattudrag, hänga genom sund och forsar tillsammans ända öfver gränsen, och utmärka sig dels genom sitt djup och branta stränder, dels genom sin sena isläggning, hvilken försäkrades inträffa först i Januari månad, ja Kallsjöns stundom ej för än Kyndelsmässan. Lika sen är deras isgång om våren; innevarande år sades sistnämnde sjö icke varit alldeles isfri 14 dagar före Midsommar, och berättades det att Commministern i Föllinge ej sällan skall hindras af is vid sitt Midsommarsbesök i Frostvikens Kapellag. Få växter träffas i dessa djupa och kalla vatten, de enda jag anmärkt äro *Chara vulgaris* och *flexilis*, *Potamogeton natans* och *rufescens* 40), *Hippuris* och *Nymphaea*.

Det enda sådesslag som ifrån Undersåker, der rågen ännu ehuru mindre allmänt odlas, uppföre dessa vattendrag kan trotsa klimatets strånghet år kornet, hvilket säs i slutet af Maj och ej sällan i Juni. Skörden inträffar den 10—20 Augusti, påskyndad af de ofta ganska varma sommarmånaderne och åkrarnes låge på solsidan af höjderne. Detta låge förorsakar dock under torra somrar (t. ex. 1813) den olågenheten, att kornet dels alls icke, dels i förtid, ännu knappt af en half aln längd, sätter ax och brämnar, hvilket på landets språk heter *afskina*, en händelse, som i de trackter den inträffar, medförer en föga mindre tryckande nöd än frostens åverkan \*).

---

\*) Contrasten i klimatet i dessa bygder och dess verkningar, kunna väl förklaras, men svårligen förstås utan af den, som själf erfarit dem. Här beror allt på läget och klimatet kan, då blott individuella saker omtalas, sägas vara lika mångfaldigt som detta.



De långs efter Kalls vattudrag uppåt gränsen tillstötande fjällryggar utmärka sig genom sina ovanliga, merendels branta former, hvarföre Hatt- Såte- och Skutnamnen öfverallt äro använde. Gundalsfjället vid sjön Torröns nordliga ånda, begynner en ny sträckning, som förlorar sig i stora Grånsfjällen, hvilka här upphöra att förtjena sitt namn\*). Den numera endast genom Norrige strykande Kölen, består af mer och mindre spridda dels högrika, dels sockertoppformiga berg, hvilka sednare dock äro mera sällsynte; af förra slaget må anmärkas stora Blåbergen och Harskölen omkring Bergli, hvilka nästan hela sommaren äro snöfrie och näppligen höja sig till alpina region. Gråsrike, till godt bete använde fjälldalar äro här ömnige och utgöra omliggande Norrske Socknar, Snaasens och Liernes förnämsta rikedom.

Egenteliga fjällvexter äro sparsamma; *Carex pulla* och *Juncus bighumis* 41) äro dock mera allmänne här än någorstädes. I desse trackter äro äfven inhemska: *Gnaphalium fuscum* Willd., på magra gråsvallar omkring fåbodarne, *Polytrichum arcticum*, *Saxifraga nivalis* β 42), *Draba hirta* 43), och i största ömnighet i de ofta lodrätte bäckstränderne, *Rhodiola*. Mindre allmänna äro *Saxifraga oppositifolia*, *Saxifr. aizoides* var. 44) och *Stellaria Cerastoides*. Vid Quedli (i berget äfvan gården) betäckte *Saxifraga Cotyledon* med sina blomrika, ofta alnslånga nedhängande blomvippor, de lodrätta bergväggarne, hvilka vid sin fot hysa i skuggan, den på Svenska sidan blott en enda gång anmärkte *Myosotis de-*

---

\*) Gränsen afviker neml. från stora Kölen djupt in uti Svenska slättlandet, hvarigenom skillnaden mellan de åt Nordsjön och Östersjön fallande vattnen, här upphörer att vara den gällande principen för gränsbestämningen. Genom detta förfarande förenas den egentligen på Svenska sidan liggande Socknen Sörli med Norrige.

*flexa* 45). Med den förra funnos blandade *Veronica saxatilis*, *Silene rupestris*, *Cheiranthus Erysimoides* och *Asplenium viride*, hvilken sistnämnde dock förekommer ömnigare på Svenska sidan. I samma trackt förekomma de eljest mycket sällsynte, *Actæa spicata*, *Urtica dioica* (fol. glabris), *Stachys sylvatica* och *Pteris aquilina*.

Uti grånstrackternes ofta djupa och af *Rubus Chamæmorus* i yttersta mängd bevexta kårr, äro *Narthecium ossifragum* \*), *Juncus squarrosus* 46) och *Carex saxatilis*, äfvensom på något högre ställe *Carex Buxbaumi* var. 47), och *Pinguicula villosa* mycket ömnige. Vid norra stranden af sjön Björkvattnet på gränsen mot Sörli, vexer sparsamt *Carex Wormsköldiana* Fl. D. och hvarest jag endast funnit hannen 48).

Det af Svenska Geologer så mycket omtalade *Portfjället*, förekommer på det stället der Riksgränsen från sin afvikning åt slättlandet åter inträffar med stora fjällryggen. Det är i Botaniskt afseende föga märkvärdigt, och bör endast anses som ett förberg till de, om ej högre, dock snörigare berg som tillstöta inom Norrige. Icke eller synes Kölen i allmänhet återfå den betydande höjd, som utmärker densamma i sydvestra delarne af Jämtland, utan aftager den småningom mot gränsen af Åsele Lappmark, för att icke återtaga sin förra höjd förrän vid inträdet i Piteå Lappmark.

Sjelfva *Portfjället*, som fått sitt namn af en från längre håll synbar öppning eller remna på fjället, till  $\frac{3}{4}$ delar af dess höjd, uppnår knappt alpina region och hyser på sina högsta toppar *Ranunculus pygmæus*, *Diapenzia* mycket sparsamme,

---

\*) Kallas i Jämtland Svululök, och bönden säger att då den första d. ä. den nedersta blomman utvecklar sig, blommar kornet, och då den öfversta blommar är det moget.

blandade med *Empetrum*, *Salix glauca*, *lanata*, *Sibbaldia* och *Erica vulgaris* ganska liten. I sjelfva porten: *Saxifraga nivalis* högst sällsynt, *stellaris*, *Phleum alp.* och *Carex lagopina* Wahl. På sidorna: *Rheum digynum*, *Rhodiola*, *Viola biflora*, *Trollius*, *Sonchus alp.* *Aconitum sept.* *Geranium sylv.* *Epilobium angustif.* och *alpinum*, *Veronica alpina* och *Saxifr. oppositifolia*; vid foten något litet af *A. Lonchitis* och *Myosotis deflexa*, blandad med *Myosotis arvensis* ( $\beta$  *alpicola* 49); vid de omgifvande vattnen vexer i myckenhet *Ranunculus reptans*. (med de fina nästan trädlika bladen, som Dr WAHLENBERG omtalar, men är föröfrigt hvarken till frön eller andra omständigheter åtskild från den vanliga, stundom vidga sig bladen till tämmelig bredd mot åndarne \*).

I dessa högsta delar af Jämtland, hörande till Frostvikens Capell (Lat.  $64^{\circ}38'$ ), är sådes-odlingen mycket ringa; korn, rotvor och Potatoes, äro de enda sådesarter som förekomma med sparsam afkastning. De sistnämnde äro likväl i det öfriga Jämtland och i synnerhet i Herjeådalen med mycken framgång cultiverade. Gumriks-kornet mognar ej i nordligaste delarne af provinsen, hvarföre allmogen anser det för ett ogräs då händelsevis något deraf finnes blandadt i det vanliga kornet. Lin har stundom med framgång blifvit odladt i Kall, men försökes sällan, då det lättare erhålles såsom en bytes-artikel från de tillstötande provinserne.

En fullkomlig brist på goda kallkällor gör undersökningen af jordtemperaturen i dessa track-

---

\*) Porfjällets Hälle-art är en i vågor liggande ganska fast Breccia af flere ojämt blandade bergarter, hvaruti stora kilar af Quartz i synnerhet utmärka sig. Den är hopgyttad i vågiga och tjuriga massor, som merendels gå perpendiculärt i ziczac form, hvarigenom stundom formeras håligheter i bergväggen, hvilkas kanter alltid äro släta och afnötta. Det är mer än sannolikt att detta jämte åtskillige tillstötande fjäll i Norrige, t. e. Brandsberget, äro af vulkaniske ursprung.

ter åfvensom i de egentliga fjällen högst osäker; de som finnas äro oduglige, dels emedan de för stenartens fasthet ej kunna tränga tillräckligt djupt, dels emedan de på närmare eller fjärmare håll uppkomma från qvarliggande snödrifvor och bibehålla en derefter proportionerad lägre eller högre temperatur, så att man efter behag kan få temperaturen sänkt ända till fryspuncten \*).

Vid nedstigandet af fjällen på den *Norriska sidan*, (Snaasen Socken Lat.  $64^{\circ}16'$ ) antager naturen ett mildare utseende än på den östra sidan, och betäcker en leende grönska höjderne der landtman-  
nen anlagt sin koja och sin lilla åker. Ett kortare och följakteligen brantare affall för fjällens vatten åt denna sida än åt den Svenska, förekommer bildandet af de vidsträckta kärr och myror som utmärka den sednare, och solstrålarnes hastigare verkan på en mera vattenfri jord böra, i förening med hafsluftens inflytande, (hvilket synes bestå i en jämnare fördelning af lufthphenomenen,) göra den Norriska sidan vid samma bredd som den Svenska, vida mildare och tillgänglig för en sydländtare eller så kallad maritim vegetation. Således skall hvetet ofta med fördel ännu odlas tätt under fjällen i Snaasen Socken, och äppletråden gifva afkastning vid ägendomar 4 mil norr om Trondhjem, hvars latitud är  $63^{\circ},25'52''$ . Äfven är denne mot eftermiddagsso-  
len mera direct vända sida af fjällryggen under lika polhöjd, långt mindre rik på fjällväxter, hvilka då de finnas, tagit sin tillflykt i de för solstrålarna bäst gömde skrymslor af de branta bäcksträn-

---

\*) I följe hvaraf man när som helst kan erhålla en och samma vext, i alla möjliga tillstånd, och således ingen bestämd blomningstid för fjällväxter uppgifvas; jag fann t. e. d. 16 Aug. på Portfjället efter olika höjd och afstånd från den qvarliggande snön, Hvitsippan och Viola biflora, fruktbärande, blommande och nyss germinerande.



derne o. d. st. och framställa endast frodiga och slappa former, hvilka merendels förebåda annalkandet af deras nedre gräns. Kråkan, som i Jämtland är en flyttfågel, tager också vid vintrens annalkande alltid sin tillflykt öfver fjällryggen till de Norrske kusterne \*).

I allmänhet äga de Jämtska fjällen icke de branta lodräta former som utmärka södra Europas fjäll, utan bilda de merendels plattadt coniska höjder, som alltid med mer eller mindre möda äro tillgängliga, ofiast på alla sidor; äfven äro de så isolerade att man ej må föreställa sig någon för ögat synbar sammanhängande rygg, ehuru de på sina ställen ses samlade i tätare grupper. Så förekomma de i Handöls gränsdistrict i Norrska Socknarne Sör och Norli. De i botaniskt afseende sannolikt märkvärdige äro, utom de af mig besökte \*\*): Sylfjällen, Anjiskutan och de inom Norrska gränsen i Norli liggande Stortunnfjället, Handalsfjället, Pill- och Gufjället, hvilka möjligen torde hysa några af de återstående af mig ej funna öfre Lappmarkernes vexter \*\*\*). Äfven är det ganska san-

\*) Sannolikt dirlockad äfven af en rikare tillgång på föda.

\*\*) I början af October besökte jag de i sydliga Jämtland belägne Oviksfjäll, hvilka jag, så mycket den sena årstiden tillät anmärka, fann i botaniskt afseende föga rika. Dock sågs på toppen af Hundshögen spår till Andromeda Hypnoides. Dessa fjäll kunna bestigas med häst ända till spetsen.

\*\*\*) Dessa äro efter Dr: Wahlenbergs Flora:

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. <i>Pinguicula alpina.</i>  | 10. <i>Campanula uniflora.</i>     |
| 2. <i>Kobresia scirpina.</i>  | 11. <i>Gentiana glacialis.</i>     |
| 3. <i>Agrostis algida.</i>    | 12. <i>Juncus arcticus.</i>        |
| 4. <i>Arundo lapponica.</i>   | 13. <i>Juncus parviflorus.</i>     |
| 5. — — <i>strigosa.</i>       | 14. <i>Rhododendron lappon.</i>    |
| 6. <i>Holcus alpinus.</i>     | 15. <i>Andromeda tetragona.</i>    |
| 7. <i>Aira atropurpurea.</i>  | 16. <i>Saxifraga bulbifera.</i>    |
| 8. <i>Koenigia islandica.</i> | 17. — <i>cernua &amp; palmata.</i> |
| 9. <i>Galium svaveolens.</i>  | 18. <i>Alsinella rubella.</i>      |

nolikt att en stor del af desse finnas åfven här, då de hvilka närmast hinna snögränsen, såsom *Ranunculus glacialis*, *Pedicularis versicolor*, *Saxifraga nivalis* m. fl., i så stor myckenhet bebygga åfven de medlersta delarne af vissa fjäll, såsom Snaasahögen på hvilken man öfverraskas af den ånda från Torneå öfre fjällbygd saknade *Phaca frigida*!

Huru besynnerlig vexternes fördelning är på jordytan och huru litet våra teorier ännu kunna förklara alla fall, synes af den på alla ångar i Jämtland förekommande *Orchis nigra*, som utan att vara egentlig fjäll-vext, med de måst bestämde gränser ej åter ses förrän i Sweitz, och de i Jämtland åter förekommande syd-europeiska formerne af *Pedicularis flammea* och *Kobresia*.

Jämtlands klimat synes beståmmas dels af fjäl-  
len, dels af Storsjön. Den delen deraf, som innefattas af de förre på vestra och Storsjön på den östra sidan, såsom Offerdals, Undersåkers pastorat, Hallen och Marieby af Sunnes, Oviken och Bergs pastorat, synas lida ett betydligt inflytande af fjäl-  
len; en lägre jordtemperatur, färre sydländte och flere fjällväxter och en mindre urbar mark, bevisa detta tydligen, då de på Storsjöns östra sida belägne Socknar, Rödön, Lith, Brunflo och den öfriga delen af Sunne pastorat, åga ett omvänt förhållan-

19. *Arenaria humifusa*.
20. *Lychnis aperala*.
21. — — *alpina*.
22. *Cerastium alp. glabr.*
23. *Potentilla nivea*.
24. *Ranunc. nivalis*, lappon.
25. *Ran. hyperboreus*.
26. *Mentha lapponica*.
27. *Pedicularis hirsuta*.
28. — *flammea*.
29. *Draba alpina*.

30. *D. Androsac. & muricella*.
31. *Phaca lappon. & sordida*.
32. *Ophrys alpina*.
33. *Carex microglochin*.
34. — — *rotundata*.
35. *Carex tenuiflora*.
36. — — *laxa*.
37. — — *pedata*.
38. *Salix myrtilloides*.
39. *Preris crispa*.

de, hvarföre Sådes-culturen dels är, dels bör kunna drifvas vida högre än i de förra.

---

Föregående observationer visa att vexternes progression i det inre af riket förhåller sig i enlighet med den af D:r WAHLENBERG antagna sats, att de mera sydländte, i denna riktning upphöra vid en lägre latitud än vid hafvet, och att fjällvexterne nedstiga nästan i samma proportion längre mot söder likasom de förra till mötes. Förundransvärdt är det dock i afseende på de förra, att i medelpunkten af Jämtland återfinna en del af söderns länge saknade alster, och synes det som en något varmare zon, längs efter de från Storsjön till Medelpad (der D:r WAHLENBERG mött ungefär samma vexter) flytande vattnen, skulle afbryta den vanliga ordningen. Vid de sednare åter eller fjällvexterne bör ej förbigås, att de i sin väg mot södern denna kosa ej så långt aflägsna sig från sitt rätta hem som man torde föreställa sig; ty då t. e. *Phleum alpinum* mötes i Undersvik i Helsingland, har den ej aflägsnat sig från Klöfsjö fjäll längre än omkring 15 mil. I allmänhet kan fjällvexters progression åt slättlandet då endast fullkomligt bedömmas, när man i vinkelrätt kosa nalkas fjällen (ungefär såsom D:r WAHLENBERG under sin resa i Umeå Lappm. 1810); emedan man i en mera parallel riktning snarare följer än afskär deras gränser.

---

## Botaniska Noter till föregående Afhandling.

1) *Ornithogalum luteum* Linnæi, quod *O. sylvaticum* Willd. H. Berol. — *O. luteum* Ejus apud nos rarissimum in cultis Blekingiæ, Hallandiæ et unico tantum loco Holmiæ nuper detectum; Fries nostro (Fl. Hall. Diss.) *O. stenopetalum*.

2) *Stellaria uliginosa* sc. a), occurrit enim duplici forma:

a) *fontana*: foliis oblongis glaucis, pedunculis subaggregatis, plerumque ramosis. — Hab. ad fontes totius Sveciæ.

β) *alpestris*: fol. lineari-lanceolatis, pedunc. solitariis unifloris. — In fossis exsiccatis subsylvaticis alpium.

Utraque convenit: foliis basi ciliatis integerrimis, pedunculis axillaribus, calyce obsolete nervoso petalis, in var. β præsertim fugacibus, longiore. Indoles prioris quam maxime varia limites inter utrasque certos dari negat; quo enim sicciore loco crescat eo strictior, simpliciorque fit, omnibus partibus gracilior, usque dum extremum, quod varietate β significatum volui, attingat.

3) *Primula stricta et farinosa* utraque vera *Androsaces* species: capsula constanter quinquevalvi, nec non fauce manifeste coarctata in corolla hypocrateriformi. Primo caractere a *Primula*, cui capsula 10-valvis optime distinguenda. Definiantur tali modo:

*Androsace farinosa* (Spreng. Pug. 2): calycibus oblongis tubum subæquantibus, foliisque oblongis albo-farinosis, involucri erecto pedunculis subbreuiore.

*A. stricta*: cal. abbreviatis laxè ovatis, foliisque oblongis nudis, pedunculis involucri erecto duplo longioribus.

*Primula Hornemanniana*, Lehman Monogr.

Corollæ lacinie in hac angustiores magisque cuneatæ et divergentes; calyces ad formam globosam magis accedentes elevato-punctati tubo duplo breviores; folia plana basi magis angustata denticulata (quod et in illa observ.); caulis altior pauciflorus; pedunculi elongati; flores pallidiores fragrantiores.

K. V. A. Handl. 1818. St. I.

10



Hujus etiam generis indubitate sunt *Pr. Finmar-  
chica* (cui etiam capsula 5-valvis) et *P. Egalicensis*,  
pluresque forsân exterorum.

4) *Aconitum sept.* Flores luteos numquam vidi.  
Planta Helvetica satis differre videtur: caule magis  
ramoso, ramis foliisque floralibus glabratis nec visco-  
sovillosis, foliis profundius divisis, laciniis tamen den-  
tibusque divaricatis obtusioribus, corollæ galea ad  
eandem longitudinem duplo fere latiore.

*Juncus castaneus* Sm. J. stygio proximus est.  
Descriptio ex vivo: *Radix* descendens brevis tenuis,  
raro fibro laxo laterali alii plantæ connexa. *Cul-  
mus* erectus, basi stolonibus plerumque duobis fili-  
formibus squamosis sub terra horizontaliter repenti-  
bus instructus, foliosus, ima parte vaginis soliorum  
aphyllis squamosus, superne nudus, subpedalis. *Folia*  
vaginantia subdisticha 4—6, inferiora breviora usque  
dum vaginæ inf. aphyllæ tantum supersunt, canalicu-  
lata, caulis latitudine, apice triquetro subulata, sum-  
mum bractæ vicem supplens cymam florentem parum  
superans, caulina una cum vaginis spithamea. *Ca-  
pitula* florum bina ternave 5—7 flora breviter pedun-  
culata, unum sæpius subsessile, omnia bracteata, flo-  
ribus sessilibus densis fastigiatis, squamis membrana-  
ceis brunneis uninervibus integris æquantibus, ful-  
cratis. *Calyx* foliolis 6, ovatis acuminatis apice rigi-  
dis acutissimis nitidis nigrofuscis. *Stamina* 6, longi-  
tudine calycis. *Pistilla* 3, raro 4 filiformia. *Capsula*  
magn. J: i *stygi*, oblongæ rotundato-triangulæ, obtusæ  
vel rostello terminatæ, fuscæ nitidæ, calyce duplo  
longiores, semi-3-loculares; dissepimentis sursum  
evanescentibus; *semina* plurima lanceolata arillata.  
Tota planta glaberrima, robusta.

6) *Orchis cruenta*. Media quasi inter *O. macu-  
latam* et *latifoliam*. *Radices* palmatæ, digitibus fero  
distinctis longe attenuatis. *Caulis* 3—4 pollicaris, et  
quod excurrit, vaginato-foliosus. *Folia* ovato-lanceo-  
lata patentia, supra maculis rotundis crebris purpureo-  
violaceis notata, subtus pallidiora. *Spica* ovata floribus  
confertis, *O. latifoliæ* duplo minoribus; *bracteis* inter-  
persis lanceolatis acuminatis longitudine florum ple-  
rumque sanguineo-maculatis. *Corollæ* purpureæ, petalis  
2. exterior. lateralibus patentibus, 3: tio supero cum 2  
interior. erectis galeam formantibus. *Labellum* rotun-

datum, lateribus subdeflexum, antice 3 lobum crenulatum, petalis concolor, litoris flexuosis saturatioribus pictum, basi tumidum, velutinum. *Calcar* conicum, germine  $\frac{1}{3}$  brevius. *Germen* tereti-attenuatum, angulis membranaceis undulatis. Vera species *Orchidis* et a congeneribus diversa videtur, licet *O. latifoliae* proxima, etiam labello, quod indivisum antea perperam describitur. Habitu eximie maculoso et germine facile distinguitur. Swartz.

7) *Salix glauca*. Hoc loco frutices occurrunt aliquot, lusu inflorescentiae valde singulares: *germinibus* in singulo pedicello intra squamam *binis, univalvibus*. Secundum suturam valvulae ad basin usque discretae sunt nec plantae alioquin discrepant.

8) *Saxifraga stellaris* a) L.

$\beta$  *comosa* differt: flore subsolitario terminali, calyce minimo, foliolis obtusis, petalis unguiculatis, limbo ovato basi emarginato. Hab. in Lapponia Lulensi. In Jæmtia non inveni.

In vulgari planta calyx corollae dimidium æquans, foliolis acutis, sæpe acuminatis, petala lanceolata nec tam insigniter unguiculata. Ad var.  $\beta$  pertinet Fig. Floræ Lapp. Lin. t. 2. f. 3.

Caulis in *S. comosa* altior et strictior; planta ceteroquin valde memorabilis ob luxuriam florum lateralium, qua foliola calycina, abortiente corolla, in squamas concavas foliaceas excrescunt.

9) *Stellaria Cerastoides* Linn. est *St. multicaulis* Willd. sec. diagn. et specimina Wulfeniana; caespitosa sæpe est, foliis lucidis glaberrimis carnosiusculis etc. Synon. Flor. Dan. Fl. Brit. et Engl. Bot. ad hanc pertinent; *Stellariam vero trigynam* (foliis villosis) Vill. ex qua Willd. *St. Cerast.* suam constituisse videtur, propriam nobisque incognitam duco. Nostram *Cerastii* esse speciem docent petala bifida, nec bipartita, et habitus, quo *C. alpino*  $\beta$  maxime affinis. Styli sæpe 4—5, indeque capsulae apice 8—10-valvæ.

10) *Silene acaulis* sæpius est dioica, floribus masculis germine abortivo instructis. Mares a foeminis discreti in ripis subgraminosis rivulorum occurrunt, sed in cacuminibus altioribus soli adversis germinem fere semper in omnibus prægnans reperitur.

Caulis brevissimus sed pari ratione ac *Saginae* ali. æque ramos diphyllos floriferos (pedunc. Wahl.) ex

axillis inferioribus exserit, ut acaulis proprie non sit dicenda. Petala in regionibus elatioribus interdum alba.

11) Duas in hisce alpinis species adesse judico: *Gnaphalium supinum* Willdenowii et *Gn. fuscum* ejusd.

*Gnaphalium supinum*: caule herbaceo simplicissimo procumbente, foliis linearibus acutis tomentosis, floribus capitatis. Willd. Loiseleur.

*Gnaph. pilulare* mihi Act. Holm. 1814, p. 103.

β? *Gn. pusillum* Hænke, Willd. caule 2-3 unciali sæpe unifloro, de cetero simillimum. In herb. Cel. Swartzii vidi.

*Gn. fuscum*: caule herbaceo erecto simplicissimo, foliis linearibus acutis tomentosis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis. Willd. Lois. *Gnaph. supinum* Smith Britt. Engl. Bot. 1193. Wahlenb. Fl. Lapp. *Gn. alpinum* Lightf. Fl. Dan. 332.

β *subacaulis*. *Gnaphal. supinum* β Wahl. (excluso *Gn. pusillo* Hænke).

Illi radix supra humum in caules plurimos debiles undique procumbentes divisa, flores 2-4 in cavitulo denso terminali bracteato aggregati, nunquam, quantum vidi, pedunculati, squamis plerumque totis nigricantibus. Huic radix sub terra repens, caules erectos exserens, flores 2-5, quorum unus terminalis, ceteri in axillis summis laterales, infimi pedunculati, squamis maxima parte viridibus, marginibus fuscis pelucidis cinctis. Semina in utroque hispidula.

Nomina Willdenowii retineri satius puto, quia primus ille plantas distinxit, et optima imposuit nomina. Aliter agendo unum saltem nomen novum ægre evitandum; præterea non dubito quin plerique utraque commiscuerint.

12) *Pedicularis lapponica*: Certissime perennis, radicem in nuper germinantibus ultra pedem longam inveni, nec non caules emarcidos cum florentibus in una radice.

13) *Betula nana* β: Frutex 4-6 pedalis, trunco crassitie 1-2 unciali, foliis orbiculatis diametro 6-12 lineas latis, basi truncatis rigidis fere glabris, grosse serratis, serraturis rotundatis apiculatis sæpe incisis, petiolis 2-3 lineas longis. Florentem non vidi. Medium ita tenet inter utrasque affines, ut cui propius accedat vix dicam. Hybridam dicerent veteres!

14) *Salix herbacea* variat aliquando foliis oblongis utrinque integris immo acutiusculis. Itaque forma foliorum in hac eodem modo variat ac in *S. polari* (v. inf.), quo habitum, in hoc genere insolitum, ne dicam præternaturalem exuit.

Variat etiam pedicellis et germinibus elongatis.

15) *Juncus spadiceus* Fl. L. Huc usque mihi propria species videtur et habitu et characteribus in Flora Lapp. a Cel. Wahlenberg datis, horum optimum ex bracteis bracteolisque fimbriatis (in *J. parvifloro nudis*) sumtum habeo. Pili in foliis sparsi non raro in spec. Jæmtiacis inveniuntur, qui differentiam a Clarissimo Auctore stabilitam inter hanc et Villarsii plantam valde vagam reddunt. Specimina exotica in Herb. Cel. Swartzii examinata, nunc nostro simillima, nunc *J. arcuato*, foliis nempe angustis et floribus confertis, affinia. *J. parviflorum* Wahl. in Jæmtia non vidi.

Exoptandum est ut *Luzulæ* sic dictæ, accuratiori indagationi subiciantur, nulla enim harum diagnosis, nisi Wahlenbergii in Fl. Lapp. nec descriptio postulatis diligentioris examinis respondent.

16) *Erigeron uniflorum*: caule semper unifloro vix digitali (1—3 unc) rarius basi purpurascente, floribus minoribus, foliis calycinis latioribus (ovato lanceolatis), radiis albis.

Fig. Fl. Dan. t. 1397.

*E. — alpinum*; caule 1—3-floro palmari (6—9 unc.) purpureo, floribus majoribus, foliol. calyc. angustioribus (lineari lanceolatis), radiis rubris.

Fig. Fl. D. 292. (Erig. uniflorum.)

Hoc semper in ima alpium regione s. subsylvatica crescit, dum prius in reg. alpina cum Diapenzia etc. occurrit.

Characteres fere omnes, præsertim ex vestitu petiti, admodum incerti, ut habitus pæne solus restet in dijudicandis speciebus. Figuræ Floræ Dan. extrema utriusque optime representant.

17) *Cerastium alpinum*  $\beta$  *glabratum* Wahlenb., his in alpiis, etsi diligenter quæsitum, numquam inventum, diversam crederem plantam:

Calycibus pedunculisque glaberrimis nitidis una cum marginibus superioribus foliorum purpurascentibus (nec viridibus pilis longiusculis glandulosis



dense villosis). — Foliorum margines et nervus dorsalis rati pubescentes, pagina vero glaberrima est. Stellaris Cerastoidi magnitudine et succulentia foliorum simulans. Var.  $\alpha$ ) sæpe pedalis.

18) *Ranunculus glacialis* in Jæmtia semper uniflorus, interdum tamen adest rudimentum secundi.

19) *Aira alpina* L. Wahlenb. est *Aira lævigata* Smith. Lin. Trans. Vol. x., et Engl. Bot. 2102 sec. figuram et specimina optima ad Cel. Swartz missa. Cum planta utut Lapponica jam a Cel. Smith cognita sit, mirandum sane est identitatem plantarum eum effugisse.

20) *Poa flexuosa* Sm. et *P. laxa* Willd. varietates summum esse videntur, sic determinandæ:

*Poa laxa*: panicula angustata laxiuscula, ramis lævibus, spiculis oblongis trifloris, glumis corollinis dorso pubescentibus subliberis, caule lævissimo.

$\alpha$ ) panicula contracta subracemosa pauciflora.

*Poa laxa* Willd.

$\beta$ ) *flexuosa*: pan. flexuosa ramis 2—3 floris.

*Poa flexuosa* Smith.

Hanc ex figura et speciminibus Britannicis (ut sæpe in nostra viviparis), illam ex spec. Wahlenbergianis agnovi. *Poa flex.* Wahlenb. in Lapponia crescens a nostris rigiditate ramorum discrepat.

21) *Agrostis nov. spec.* Act. Holm. 1814 p. 95 hujus (*A. alpina*) est monstrositas floribus dipetalis, quod Gaudin. (Agr. Helv.) jamiam in hac specie observavit.

22) *Tussilago frigida*, hic semper polygama, nec a me umquam foeminea Wahl. s. discoidea observata. Radix longe repens primum folia edit, postero anno scapum. Flosculi disci circiter 36 hermaphroditi abortivi, 5 fidi, clavato-infundibuliformes, staminibus inclusis, pistillo exserto clavato bifido, germinibus pappo destitutis; flosc. radii foeminei circ. 14 fertiles, ligulati, stylo brevi filiformi leviter bifido, seminibus pappo piloso hispidulo instructis.

23) *Hieracium Prenanthoides*: caule multifolio villosa simplici, foliis oblongis acuminatis denticulatis ciliatis basi amplexicauli cordata, floribus cymosis glanduloso-hispidis. All. Ped. t. 27 f. 3 (f. 1. ejusd. ad aliam plantam spectat.) Wahlenb. Fl. Carpath. p. 243?

*Caulis* tripedalis medio præcipue admodum albo villosus. *Folia* inferiora longiora quam in ceteris.

sæpe latolinearia, sæpius oblongolanceolata, superiora præsertim cordata basi caulem amplectentia undique pilosa, acuta, inf. interdum integerrima, sup. mucronato-denticulata, dente plerumque uno alterore majore. *Panicula* circiter 8 flora subfastigiata ramis subsimplicibus s. pedunculis 1–2 pollicaribus subsquamulosis, pubescentia brevi glandulosa sparsa, una cum calycibus, tectis, floribus quam in *H. sylvatico* multo minoribus, pallide luteis.

*H. sylvaticum* Floræ Dan. differt: caule sparse piloso, foliis ovato lanceolatis basi magis angustatis, sessilibus, profunde dentatis; pubescentia pedunculorum canescente densa eglandulosa, calycum vero articulata vix glandulosa; floribus saturate luteis majoribus. *H. sylvaticum* Anglorum nobis dubium est. Specimina a Cel. Wahlenberg e Carpathia allata differunt: foliis nonnihil latioribus, basi subsagittatis, dentibusque majoribus carentibus. Cet. eadem.

24) *Carex atrata*, foliis latis, spiculis grossis pedunculatis pendulis. Varietas tamen adest: spiculis minoribus infima tantum pedunculata, omnibus erectis, ut a *C. alpina* nisi spiculis oblongis parum majoribus non distinguatur.

25) *Epilobium alpinum* a) *minus*: caule procumbente 1–2 floro, foliis oblongis denticulatis.

β *majus*: caule basi adscendente, racemoso, foliis subovatis dentatis.

In utroque stigma semper integrum et caulis bifariam pilosus, ut var. β non potest non huc pertinere, quamvis magnitudine (quod jam observavit Cl. Wahlenb.) *Ep. montano* minori vix cedat. Forte satius esset eam cum *Anglis* (*Ep. alsinæfol.* Sm.) ut propriam distinguere.

26) *Hieracium alpinum* variat caule nudo vel folioso, unifloro v. 2–4 floro, foliis hirsutis v. glabratiss, grosse dentatis v. subintegerrimis. (*H. alp.* Persoon tamen a nostro ob calycis diversam pubescentiam potius tomentosam quam pilosam, distinctum existimo.) Calyx semper hirsutus, pilis substrigosis basi nigra incrassatis, sursum albis, quod ad formam breve cylindricus sive basi truncatus nec in caulem attenuatus.

27) *Cheiranthus Erysimoides* L. Sm. l. c. (pone indicem) stellato pubescens, caule erecto simplicissimo, angulato, foliis radicalibus marcescentibus, cau-

linis inferioribus lanceolato-obovatis (plus minus) obtusis, superioribus lanceolatis acutis, omnibus remotissime denticulatis raro serrulatis, floribus pedunculo brevi duplo, siliquis sexies longioribus.

*Cheiranthus alpinus* Wahlenb. Fl. Lapp.

Biennis. E radice interdum ramificat, caulis sesquipedalis, pedunculi  $1\frac{1}{2}$ —2 lineas longi, flores lutei, calyce connivente basi primum debiscente, canescente, petalis angustis cuneatis truncatis, siliquis quadrangulis incanis sesquipollicaribus erectis patulis, interdum tamen cauli adpressis, stylo brevissimo, stigmatibus annulato capitato plano leviter emarginato (ut in omnibus affinibus, in uno genere collocandis.) Planta e maritimis sinus Botlnici omnino eadem, pubescentia tantum paullo obsoletior est et flores sæpe flavi.

Smithii de hac planta testimonium maxime æstimandum puto cum specimina authentica (a Solandro ex Ostrobotnia et Lapp. Pitboensi Linnæo allata) possideat. Fatendum tamen est Linnæum (in adnot. ad Flor. Svec. in exempl. proprio manuscriptis) specimina illa ad *Erysimum suum Hieracifolium* retulisse, cui etiam speciei sane floribus parvis et foliis radicalibus marcescentibus proxima,

*Cheir. Erysimoiden* floribus magnis, ut in Flora Sv. a Linnæo describitur, nec ad arcem Bohusiensem, nec alibi in Svecia postea lectum scio, ut nobis prorsus ignotus. *Ch. Erysim.* Willd. aliisque, seu melius *Erysimum Cheiranthus* Pers. ob Jacquinum semper citatum incertus.

*Cheir. alpinus* (ab Ad. Murray ex Italia reduce, beato Bergio datus) a nostro eximie differt: statura minore, floribus majoribus, foliis caulinis anguste linearibus radicalibus persistentibus paullo latioribus repando-dentatis, pubescentia totius plantæ sericea nec stellari quæ omnia Cheiranthi Erysimoidis Jacq. secundum figuram, quam et Linnæus in mantissa alt. pag. 428 ad *Cheir. alpinum* suum revocat. *Cheir. alpinum* Jacq. ad *Erys.* diffusum Willd. etiam Bessero in Fl. Galiz. adserente, referunt. *Ch. alpinus* o *Sibiria* (Laxman) unico a Willd. citato loco (præter Lapponiam, ad quam allegandam a Smithio l. c. p. 214, correctione in erratis ut videtur, illi ntut aliis elapsa, inductus est) a nostro et ceteris Erysimis lon-

gissime distat: foliis longis omnino linearibus incanis, foliis Ch. incani textu et vestitu simillimis. Hac planta nihil in re botanica obscurius, quot enim auctores tot species diversae. Quod pro certo dicere valeamus est, nullum ex allatis hucusque in Lapponia inventum esse, quare nomen e Flora nostra longe relegandum.

28) *Poa glauca* Florae Hallandicae Fries est *P. caesia* Engl. Bot. t. 1719.

29) *Apargia Paraxaci* Willd. caule basi adscendente subunifloro, summa parte incrassata calyceque tomentosis, foliis lanceolatis integris, vel linearibus profunde sinuato-dentatis.

Engl. B. t. 1109 (Exteriorum paullo differt foliis et dentibus latioribus.)

*Radix* praemorsa, fibrosa. *Caulis* spithameus suberectus simplex, uni (ad aquas rarius) — 2 — 3 florus, sub flore fistulosus in calycem sensim incrassatus; *folia* varia, vel lanceolata subintegerrima, vel profunde dentata ut in Leont. palustri; nunc glaberrima, nunc dorso, praesertim in nervo hispida, exsiccatione fragillima; *calyx* oblongus, foliolis paucioribus ac in *A. autumnali* constructus, (caulisque pars huic proxima) tomento molli nigricante rarius virescente; saepe longissimo denso vestitus; florum magnitudine cum *A. autumnali* aemulatur.

Culta faciem tantopere mutat ut quidem diversa haberetur: caule ramoso, foliis magnis profundissime dentatis pilosis etc. *Apargiae autumnali* proceriori hoc statu simillima nisi eadem, at tempus florentiae differentiam inter utrasque aliquam indicare videtur.

30) *Phaca frigida* his ex alpebus ab austriaca aliquantum differt.

a) *lapponica*: foliis 4—5 jugis, foliolis ovatis basi rotundatis apice subretusis.

Fl. Dan. t. 856 (bona, sed foliorum basis nimis cordata).

β) *austriaca*: foliis 5—6 jugis, foliolis lanceolatis (utrinque angustatis).

Fl. Austr. t. 166.

Plantae austriacae pedunculi angustiores et strictiores, calycesque glabrati sed inconstanter, cetera accurate eadem. Specimina Enontekensia glabritie et forma foliolorum austriacae appropinquant. Var. β) a



planta lapponica distinctam esse opinatus est Cel. Smith in Fl. Lapp. Ed. II.

31) *Kobresia Caricina* Willd. spica ovata, spiculis confertis inæqualibus multifloris, apice masculis, foliis carinatis. Fig. Sv. Bot. 527. bona. Elyna Bellardi Act. Holm. 1814 p. 107. — Schoenus monoicus Engl. B. t. 1416. *Carex simpliciuscula* Wahlenb. Caricogr.

Descr. ex vivo: *Radix* cæspitosa; *culmus* teres sursum subangulatus, subnudus; *folia* subulata carinata apice triquetra, radicalia fere filiformia caulem floriferum subæquantia; *spica* fructifera magis divergens et ob spiculas inferiores majores ovata, initio florescentiæ suboblonga; *spiculæ* circ. 6, quarum superiores magis paucifloræ, omnes floribus masculis ternis apice instructæ, basi femineæ, involucro squamæformi acuminato abbreviato fulcratæ; *flores masc* unipaleacei, staminib. ternis, antheris angustis extremitate filamento affixis; *flores fœm.* bipaleacei, palea altera interna s. perianthio, membranacea angusta pistillum amplexente, stigmatibus ternis initio brevibus deinde perianthium longe superantibus deciduis; *fructus*: nux oblonga teretiuscula fusca nitida apice truncata.

(*K. Scirpina* Willd. spica lineari, spiculis bifloris apice masculo, foliis filiformibus; sec. Wahlenb. (fol. teretibus sec. specim.)

*Carex Bellardi* All. Elyna spicata Schrad. Scirpus Bell. Wahl.

Characteres hujus generis ad modum Brownii (Prod. Fl. N. Holl.) sic emendentur:

Flores diclini, amentacei, squamis undique imbricatis unifloris. Masc. Perianthium nullum, Stam. tria. Fœm. (inferiores in eodem amento) Perianth. monophyllum squamæforme persistens. Stigmata tria. Nux perianthio arcte involuta.

Squamam interiorem (Wahlenb. aliisque) capsulæ sic dictæ Caricum vicem efficere exinde patet, quod cum fructu primum cadat, et quod flores masculi eadem careant. Illa floris pars, quæ germen Kobresiarum et Caricum ambit, proprie pericarpium non est dicenda, cum styli illi non affigantur; perianthii potius esse speciem demonstrat arista in Carice microglochin Wahlenb. præsentia, hucusque in pericarpio vero numquam observata. Illa speciei nuper dictæ

*Caricis indoles* characterem infirmat distinctivam *Unciniarum*.

32) *Carex saxatilis* a *C. rigida* Anglorum non separanda, caulis enim et foliorum rigor in diversis stirpibus diversus.

33) *Angelica Archangelica* pedunculis pedicellis-que glabris, foliis biternatis, foliolis incisive inæqualiter serratis, terminali tripartito lacinia intermedia triloba, petiolis communibus striatis intus applanatis, partialibus unisulcatis.

Cum idonea nulla adsit descriptio, liceat mihi quam ex viva planta confeci, subjungere:

*Radix* fusiformis, fibras emittens flabelliformes; *caulis* teres hinc inde subangulatus geniculis parum intumescens, glaber, pedunculis sub umbellis interdum paullo pubescentibus, plerumque una cum pedicellis glabris; *folia* inferiora bipedalia petiolata ternata, brachiis bijugo-pinnatis cum impari ad basin usque tripartito, intermedio ad medium trilobo, superiora plerumque biternata glaberrima læte viridia, subtus lutescenti-glauca tenuia, foliolis ovalibus acutis 2—3 pollicaribus inæqualiter serratis incisisque, serraturis obtusiusculis mucronulatis, incumbenibus, petiolis tantum striatis, vaginis amplectentibus saccato-tumidis glabris rubro-striatis. *Umbellæ* pedunculatæ 3—vel plures terminales, florentes hemisphæricæ, seminiferæ globosæ magnæ diametro 5—12 unciales, umbellulis subglobosis, involucrio universali 1—3 phyllo, foliolis caducis inæqualibus, partiali foliolis numerosis linearisetaceis deflexis, pedicellis florum paullo brevioribus. *Flores* breviter pedicellati, pedicellis glabris, imis deflexis; petalis patulis obovato-ovalibus carinatis, pagina interiori uninervi apice unguiculato acutissimo inflexo, staminibus elongatis, antheris oblongis, pistillis in umbella florente obsoletis, in deflorata elongatis divaricatis, in seminibus maturis filiformibus deflexis, stigmate annulato-clavato. *Semina* ovalia, convexa, marginibus planis acutis a se invicem hiantibus, dorso tricostatis, costis in maturis elevatis lævibus (in sem. immaturis membranaceo-alatis.) — Planta robusta sed parum alta 3—4 pedalis, umbellis maximis floribusque virescentibus insignis.

(*Ang. sylvestris*: pedunculis pubescenti-scabris, foliis subbipinnatis æqualiter serratis vix lobatis,

petiolis communibus partialibusque carinatis. —  
*A. littoralis* ab hac parum differt præter magnitudinem, qua priori utraq[ue] antecellunt.)

34) *Pedicularis versicolor* (quæ *Ped. Oederi* Danor.) differt a *P. flammea*, in Lapponia tantum lecta: petiolorum supr. bractearum calycumque marginibus costisque lanuginoso-pilosis, corolla tota flammea, apice tantum galeæ obtusæ subincurvo ferruginea, laciniis lateralibus faucis latioribus, stylo exserto, capsulis calycis duplam longitudinem haud attingentibus. Corolla præterea nullo modo parva sed magnitudine *P. sylvaticæ*, adeoque *P. flammeæ* duplo major. Interdum omnino glabrescit.

35) *Salix polaris* his locis occurrit foliis integris (nec emarginatis) qua nota *S. herb. A) Liljeblad* Sv. Fl. magis convenit quam illi a Cl. Wahlenberg descriptæ et in Fl. Lapp. defiguratæ. Ex specimine nostro fig. in Sv. Bot. t. 493 est delineata. Folia Salicis herb. eodem modo variare supra vidimus.

36) *Ranunculus montanus* Willd. foliis radicalibus tripartitis: laciniis trifidis obtusis integerrimis, caulino sessili digitato integerrimo, caule subunifloro, calycibus glabriusculis, stigmatibus revolutis. Wahl. Fl. Carp. Cum *Ranunculo* acri a nostratibus hucusque confusus videtur. In alpibus adest varietas ut dicunt hujus pumila uniflora, quam *Ranunculum* Willdenowii sæpius esse puto, verum saltem ego hunc *Ranunculum* ex alp. Quickjockensibus nuper missum posideo.

37) *Caricis filiformis* diagnosis sic mutanda:

Spicis lanceolato-oblongis subsessilibus erectis, bracteis breviter vaginantibus, foliaceis; capsulis ellipticis villosis bifurcatis, foliis canaliculatis subfiliformibus culmo filiformi obsolete angulato longitudine et latitudine æqualibus.

*C. lasiocarpa* Ehrh. Hoffm.

*Culmus* filiformis semiteres, una linea asperatus; *folia* culmum æquantia erecta; *bracteæ* spicam supr. parum superantes foliis similes, pubescentia capsularum densa ita ut nervi vix transluceant; *squamæ* fere totæ nigrosusæ etc. Huic adfinis est sequens, anno 1816 ad Holmiam prope lacum Brännkyrkeshöjden detecta:

*Carex evoluta* H. Spicis lanceolato-cylindricis crassis, infima pedunculata subnutante, superioribus sessilibus erectis, bracteis brev. vaginantibus foliaceis; capsulis ovato-ellipticis nervosis pubescentibus bifurcatis; foliis planis, culmo firmo exakte triquetro brevioribus duploque latioribus.

*Carex pellita* Schk.: Nnn f. 149? Saltem proxima.

Priori (quacum crescit) multo major, et e longinquo discernenda; solitarie degit quantum vidi, nec cæspitosa ut illa. *Culmus* tri-quadripedalis robustus, acute triqueter, angulis glabris, interne (altius tamen quam in anteced.) foliosus; *folia* culmo plus quam duplo latiora ( $1\frac{1}{2}$  lin.) plana, brevia, culmi nempe dimidium parum superantia (7–9 unc.) nuda, apice valde triquetra et scabra, basi intus elevato-punctata ut folia *Caricis* ripariæ; *Spicæ* scem. biunciales multo crassiores ac *C. filif.*, infima ob pedunculum gracilem pollicarem parum cernua; *bracteæ* foliis similes spicam supremam masc. superantes; *capsulæ* griseo pubescentes evidenter nervosæ subovatæ, squamas ovato-lanceolatas cuspidato-acuminatas maxima parte virides, æquantes. *Carici* acutæ proceriori primo visu non parum similis, ut et a priori me iudice habitu, magnitudine, characteribus supra datis diversissima. Figura Schkubrii præter magnitudinem nostræ convenientissima.

38) *Aira flexuosa*:  $\beta$ ) *montana*: culmo humili, panicula brevi contracta oblonga laxa, spiculis purpurascens nitidis.

*Aira* panicula rara, calycibus fuscis Fl. Lapp. 49.

Gramen avenaceum paniculatum alpinum etc.

Scheuch. Hist. 216. t. 4. f. 16. (in Fl. Sv. II, errore typogr. f. 4.)

Culmi vix pedales glabri, folia setacea brevia, vaginis superne asperulis, panicula bipollicaris laxa, junior interdum cernua, pulchre purpurascens. (divaricatam numquam vidi.)

*Aira flex. a) vulgaris* duplo altior, ramis paniculæ rigidis demum valde divaricatis 2–3 pollicaribus, spiculis basi fuscis maxima parte pallescentibus. Spicularum structura in utraque eadem.

Miror auctores synonymon Scheuchzeri, qui plantam optime descripsit, sic neglexisse, ut veram plantam quærentes inter conjecturas libentius fluctuent,



quam sinant Linnæum in una eademque planta bis describenda cum Scheuchzero errasse.

Quæ in herbario Linnæi adest, sec. Cel. A. Afzelium gaudet "foliis paucioribus, quam in A. flexa), latioribus, setaceis, paullo brevioribus: culmo breviori, subadscendente: panícula arcuatiore, flosculis obscurè violaceis, pedunculis multo brevioribus, crassioribus, parum flexuosis, rachi subasperata, basi villosis." Adnot. manuscr. Ejusd. — *Aira bothnica*, illa pulcherrima Wahlenbergii species, longissime a prioribus distat: foliis et culmo plus quam duplo longioribus ut ipsi Airæ flexuosæ vulg. vix comparanda, flosculis potius Avenæ faciei, pallide virescentibus vix non nisi ætate fuscescentibus!

39) *Holcus borealis*  $\beta$  *biflorus*: spiculis grossis subbinis violaceis, glumis calyc. corolla sesquilogioribus scarioso-acuminatis.

Nullam præterea differentiam inveni.

Habitat in subalpinis Åreskutan, præsertim ad radicem rupis Blåsten dictæ.

40) *Potamogeton rufescens* Schrad. sec. Ad. de Chamisso.

Caule tereti, foliis trinerviis inferioribus sessilibus lanceolato-linearibus obtusis, superioribus oblongis in petiolum folio brevioribus decurrentibus; pedunculis æquali-teretibus.

a) *major*: foliis late lanceolato-linearibus.

P. annulatum Bell. Ex specim. authent. in herb. Cel. Swartzii.

P. alpinum Balb. sec. Loisel. et Cham.

Hab. in aqua profunda lacus Jäfsjön, parœc. Åre, inter Alp. Åreskutan et Handöl.

*Caulis* longus flexuosus; *folia* caulem semiamplectentia, apicem versus paulisper angustata, longit. ad lat. = p. 5:  $\frac{1}{4}$ , nervis præter centalem duobus lateralibus validioribus fuscis notata; *stipulae* vaginantes internodia sup. interdum superantes, inferioribus breviores, ore integerrimæ, insertione (in sicca pl.) annulo elevato incrassatæ. (Fructificatione sequenti similimus, pedunculis crassioribus tantum instructus; (ex specim. exot.) Cum fructific. in Jämtia non legi.

$\beta$ ) *minor*: foliis lanceolato-linearibus, superioribus acutis.

Hab. in aqua 2—3 pedali lacus Björkvättnet prope sacellum Frostviken, ad ostium amnis ab alpe Portsjället profluentis; fructif. 19 Aug.

*Caulis* bipedalis strictior, ut in fructiferis semper est; *folia* inf. ejusdem forma et structura ut in præced., sed long. ad lat. p. 3:  $\frac{3}{2}$ , floralia opposita, in petiolum uncialem attenuata plus minusque acuta, crassiora, nervis subæqualibus; *pedunculi* æquales tenues  $1\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$  unciales; *spicæ* cylindricæ circ. 20-floræ. — Tota planta præsertim pedunculi et folia floralia rufescunt.

*P. lucens* differt præter magnitudinem: foliis multinerviis lanceolatis seu utrinque angustatis, pedunculis crassissimis etc.

*P. heterophyllus* foliis natantibus instructus, diff.: his basi obtusis nec in petiolum acuminatis; dum absunt vero: foliis floralibus sessilibus, foliis inf. acutis et pedunculis incrassatis

*P. fluitans* Engl. Bot. 1285, quo nomine antea habui, certe proximus.

41) *Juncus biglumis* variat sæpe culmo unifloro.

42) *Saxifraga nivalis*  $\beta$  *elatio*: foliis triplo majoribus, petiolis angustis folia æquantibus, caule palmari paniculato.

Hab. in subalpinis locis umbrosis muscosis.

43) *Draba hirta* variat siliculis glabris et pubescentibus, pedunculis valde pilosis et foliis radicalibus dentatis, ut a numero et forma foliorum caulium solummodo sit cognoscenda.

44) *Saxifraga aizoides* variat foliis margine glabris et ciliatis, unde forsitan species spuria *S. autumnalis* originem ducit.

In subalpinis norvegicis adest varietas insignis:

$\beta$  *aurantia*: foliis floribusque majoribus, petalis saturate croceis, staminibus pistilloque rubris.

45) *Myosotis deflexa* discrepat a *M. squarrosa* (cult): foliis tenuibus pubescentia minus erecta mollioribus, pedunculis fructum æquantibus (in *M. squarrosa* fere nullis), corollis calyce duplo longioribus, aculeis seminum tenuioribus. (*M. marginata* Marsh. a Bieb. forte propinquior?)

46) *Juncus squarrosus* foliis rigidioribus et flori-

bus confertioribus subcapitatis a vulgari planta paululum differt.

47) *Carex Buxbaumii*  $\beta$  *alpina*: spiculis in clavam subapproximatis capsulis glaucis nervosis.

48) *Carex Wormskjöldiana* Hornem. dioica, spica foeminea lineari multiflora, squamis ovatis acutis, germinibus tristigmaticis, obovatis, margine pubescentibus, mascula oblonga. Fl. Dan. 1753.

*Culmus* (in spec. Jämt.) digitalis inæqualiter triqueter, asperulus, ad medium fere foliosus, spicam versus squama aphylla v. rudimento folii sæpe instructus; *folia* semilineam lata culmum æquantia, acuminata striata, margine aspera; *spica masc.* 3 linearis oblonga, squamis fuscis linea vix discernibili alba dorso notatis, infima acuminata; *antheræ* lineares apice integræ (speciminibus masc. ex Grönlandia exasse simillima. *Fœm. spica* omnino linearis 3—7 lineas longa, squamis pæne atris, germinibus ovali-obovatis, margine lanuginosis, ore bidentato, stigmatibus tribus! brevibus. Ex spec. a Cl. Hornemann Cl. Swartz missis.)

Anomala admodum est species, habitu a ceteris unispicatis longe recedens, et Caricibus multispicatis tristigmaticis ita cognata ut ægre ab eorum vicinia divellatur.

49) *Myosotis arvensis*  $\beta$  *alpicola*: patulo-villosa, foliis ovato-oblongis infimis petiolatis, floribus amplioribus.

*M. rupicola* Eng. Bot. 2259? (flores tantum nimis magni.)

*Fol.* lat. ad long. lin. 4: 11, interdum fere ovata, molliter hirta; *calyx* pilis albis uncinatis divaricatis villosus; *florum* limbus duas lineas diametro interdum superans (*Myosotidis palustris*, qui tamen longe distat pubescentia, etiam calycis, strigosa rare appressa).

Propria forsán species? Florum tamen sola magnitudo in specie constituenda vix valere debet.

---

## BESKRIFNING

*på ett vanskapadt Vattenhufvud (Hydrocephalus) af en Kalf, jemte teckning;*

af

A. H. FLORMAN.

**A**f den anledning, att Naturkännedomen icke blott omfattar de normala Naturens former, utan ock sträcker sig till de ovanliga och mera sällsynta, har jag trott följande händelse förtjena att anmärkas och från glömskan förvaras.

Uti Februarii månad innevarande år erhöll jag från en Slagtare här i Staden en Tjurkalf, som fanns död uti en slagrad ko, hvilken sades hafva gått drågtig med detta foster mer än en månad öfver vanliga kalfningstiden. Denna Kalf syntes annars fullvuxen och af den storlek som en vanlig fullburen Kalf, ehuru den ej var bevuxen öfver allt med hår, utan måst naken på sidorna och buken. I öfrigt var hela kroppen ej på något sått vanskapad, utan sträckte sig missbildningen endast till hufvudet, som till den grad fanns vanskapadt, att det blef svårt att såga hvad slags djur det skulle föreställa.

Detta hufvud var mindre än vanligt, men rundare och nästan klotformigt, emedan kåkdelen, som hos dessa djur utgör hufvudets största längd,

K. V. A. Handl. 1818. St. I.

11



alldeles felades. Men i stället för öfverkåk och nos utgick från hufvudet, straxt nedom ögat, en något uppåt krombögd och rörlig snabel (Fig. 1. Lit. a) som vid sitt fäste vid hufvudet var något smalare, men midtpå tjockast och slutades med en rundad ånda, som hade någon likhet af en nos och var försedd med långa utstående hår. Snabelens hela längd var 3 tum och tjockaste delen deraf hölt inemot halftannat tum i diameter. Den beklåddes öfverallt af huden, kändes mera hård midtpå och utåt främre åndan, men den smalare stielken invid hufvudet var mera mjuk, så att den derigenom blef slingrig och rörlig till alla sidor.

En enda ögonöppning (Fig. 1. Lit. b.) midt i pannan tillslutades af ett stort och bredt öfre-ögonlock och ett nedre — som var delt i tvänne halfvor. Då de öppnades syntes ej innanför dem tecken till öga.

Till sidorne hängde tvänne öron (Fig. 1. Lit. f.) rät ned, breda, stora och lågt fästade, utanpå håriga och innantill måst kala. Öronöppningar och yttre hörselgång saknades alldeles. Icke heller visade sig tecken till nåsboror eller nås-cavitet, men midt emellan öronen syntes på hufvudets undre del en glatt tvårgående öppning (Fig. 2. Lit. d.) af en half tums längd, hvilken skulle föreställa munnen, men den var inåt alldeles tillsluten och hade hvarken svalg eller öppen gång till någon strupe.

Till vinnande af kännedom om de inre delars beskaffenhet företogs dissection, hvarigenom be-  
fants att förenämnde snabel till sin smalare del eller stielk, som låg närmast intill hufvudet, bestod af ett tjockt, senigt och till orbita fäst band, samt af en tjock nerfbundt af nervus trigeminus, tillsamman förenade jemte blodkårl genom cellulosa.

Den tjockare, åggrunda och medlersta delen af snabelen danades af en tunn half-genomskinlig benblåsa uppfylld med en klar våtska, som fullkomligen liknade ågghvita. Till benblåsan fästades förenämnde band, åfvensom nerven gick in uti densamma, och efter något förlopp gick ut igen för att delas åt huden. Snabelens yttersta ånda var liksom dess öfrige del beklädd af yttre huden och cellulosan, hvilka likväl hår voro tjockare; föröfrigt bestod den af ett, likt benstrutarne i nåsan, hoprulladt brosk, hvilket innehöll ett hvitt geléeartadt åmne. Sålunda utgjorde hela snabelen en sammanhängande kådja af band, ben och brosk.

Uti õgongropen fanns vid nårmare undersõkning en verkelig õgonglob, men den låg djupt och rundt omkring omgifven af cellulosa, fett och musklar, så att icke en gång dess fråmre del var blottad, hvilket gjorde att ej något õga syntes under õgonlocken. õgongloben var något aflång och ovanligen liten. Dess diameter på tvåren håll 3, lineer och den på långden var en half linea drygare. õgats råta musklar slutades icke som vanligt uti senor, utan gingo tillsamman framom õgat, der de danade ett concentriskt muskellag, som var nåra förenadt med õgats yttersta hinna. På õgat fanns alsingen cornea transparens, utan utgjordes õgongloben uti hela sin omkrets af sclerotica. Denna sclerotica var innantill õfverallt beklädd af en svartfårgad choroidea. I stållet för en ordentlig rund õgonsten låg midt i õgat en oformelig, hvitgrå, ogenomskinlig, råmmeligen fast och flikig massa, som med sina flikar hår och der till sidorna förenades med choroidea. Fram om denna fastare del syntes en liten grop, och bakom den tvåne, hvilka alla innehõllo en tunn svartfårgad våt-

ska. Ingen Iris anmärktes, ingen humor vitreus ej heller nerfhinna eller synnerf.

Munnen var innantill alldeles tillsluten och förmärktes hvarken svalg eller tunga, likväl gick derifrån ett smalt muskelrör af en gäspennas storlek, nedåt halsen och vid tredje halskotan utvidgades till en ordentelig strupe, vid hvilken fästades luftrörs-hufvudet, som var osvantill tilltäpt, men likväl försedt med sina vanliga brosk till och med epiglottis. Der nedanföre voro strupen och luftrörret ordenteligen danade och gingo på vanligt sätt nedåt halsen.

Hufvudets ben voro äfven så ovanliga som yttre skapnaden. Pannebenet (os frontis) utgjordes af ett enda odelt ben, från hvilkets medlersta och främsta del utgick ett ögongrops-hvalf, ty till sidorna och nedantill var ej något ben, utan i stället en bågformig brosk, som fullbordade ögongropen (orbita). Hjessebenen (ossa parietalia) voro tvänne, men större och bredare än vanligt. Nackbenet (os occipitis) hade fullkomlig storlek och bestod af 5 afskildta benstycken nemligen: tvänne för öfre och tunnare delen, tvänne för ledknapparna (processus condyloidei) och ett för kil-utskottet som var ovanligen litet. Deremot var stora nackhålet (foramen magnum) ovanligen stort. Kilbenet (os sphænoideum) var i hög grad vanskapadt och så hopvuxit med fjällformiga delen (pars squamosa) af tinningbenen, att man ej kunde urskilja hvad som hörde till det ena eller andra af dem. Tinningbenen (ossa temporum) hade icke någon yttre hörselgång eller tinningbåge. Mera vanlig form hade den hårda delen (pars petrosa), som äfven var försedd med öppning för hörselnerven (porus acusticus). I stället för silbenet (os eth-

moideum) voro tvänne små benskifvor förenade sins emellan med en hinna.

Af så kallade ansigtes-ben fanns ej något enda utom underkåken och den liknade alldeles icke något vanligt underkåksben hos kalffvar. Det var litet och kort, bestod af ett enda tjockt ben, böjdt i form af en hästsko, men föröfrigt såsom vanligt hade ledgång med tinningbenen.

Hufvudskålens rymd var väl något mindre än den vanliga, men i anseende till hufvudets litenhet syntes den ansenlig, ty den gick till trenne tum på tvären, 3 och en half tum på längden och i lodrät linea två tum.

Hufvudskålsbenen voro tunnare än vanligt, försedde med något rörliga sömmar och hade fyra fontaneller, af hvilka den största var straxt ofvan öfver stora nackhålet, en emellan pannbenet och hjessbenet, samt tvänne vid sidorna, der tinningbenet och hjessbenet störa tillsammans med nackbenet.

Då benen öppnades, uttrann ungefär ett halft ölglas klart gulaktigt vatten, som till större delen hade fyllt hjernskallen, så att föga del af stora hjernan var kvar. Hela dess öfra del, isynnerhet framman till, saknades; endast hjernans botten (basis) hade blifvit bibehållen och den var mera fast och trädig än vanligt. Liknade icke eller vanlig hjernsubstans och kunde ej någon grå och hvit massa urskiljas uti den. På dessa qvarlefvor syntes likväl, utan all præparation, commissura cerebri anterior och posterior och eminentiæ quadrigeminæ, men ingen glandula pinealis fanns. Crura cerebri voro små men tydeliga, och Pons Varoli syntes föga förminskad. Öppningarne till infundibulum och till 4:de hjernkammaren voro ovanligt stora och öppna, äfvensom 4:de hjernkammaren var stor. Af det föregående tyckes vara klart att ej hvarken



sido-hjernakamrar eller den tredje kunde finnas. Lilla hjernan var ganska stor och af vanlig beskaffenhet, åfvensom ryggmärgen, så att den grå och hvita massan i dem kunde urskiljas. Öfver allt, så vål i hufvudskåls-botten som rundtomkring lilla hjernan, voro den mjuka och hårda hjernhinnan på det nogaste förenade och sammanvexta, hvadan ock det var svårt att skilja hjernan och lilla hjernan från sitt ställe. Håraf kom det ock att vattnet i hufvudskålen ej kunde tränga ned uti caviteten för lilla hjernan och ryggmärgen. Från hjernans crura, från Pons Varoli och Medulla oblongata syntes nerver uppkomma, men nervus olfactorius och opticus saknades.

Af anförda beskrifning synes afvikningarne ifrån vanliga formen här hafva varit ganska betydliga, de voro dock märkeligast i anseende till öfverkäken och sinnesorganerna, som nästan alldeles saknades.

Missfoster med ett enda öga äro mindre sällsynta bland djuren, men oftare är detta öga större än vanligt eller ock försedt med tvänne ögonstenar. Här deremot var det mycket litet och i flera afseende ofullkomligt.

Ibland djurs missfoster finnes ock ofta Vattenhufvud, men denna hydrocephalus var vida skiljd ifrån den (ehuru åfven på en kalv) aftecknade och beskrifna uti Kongl. Vet. Acad. Handlingar för år 1794, der vattnet hade trådt utur hufvudskålen och danat en stor såck. Icke eller hade den samma form som den slags hydrocephalus, hvilken jag åfven funnit hos kalvvar, der hufvudskålen ofanteligen utdånes, i det benen gå vidt från hvarandra uti sömmarna och fontanellerna. I sådant fall har jag sett hufvudskålens diameter gå till öfver 8 tum på tvären. Deremot var på detta subject hufvu-

dets rymd något mindre än vanligt, ehuru benen voro sins emellan något rörliga förmedelst mellan kommande sömmar och fontaneller.

Den egna fasta och hårda beskaffenheten, som jag funnit vid detta Vattenhufvud, har äfven en och annan tillförene anmärkt hos hydrocephaliska barn, äfvensom det att hjern-substansen förmedelst pia mater varit fastvuxen vid dura mater. Huruvida denna sammanvext inträffar mer eller mindre ofta vid hydrocephalus känner jag icke. Men åtminstone lär den ej vara för handen, då dermed förenas hydro-rachitis.

#### FÖRKLARING PÅ FIGURERNA. Tab. IV.

##### Fig. 1.

##### *Kalfhufvudet i profil.*

- a. Snabeln: 1. dess stielk, 2. dess medlersta beniga del, 3. dess ånda.
- b. Ögonöppningen med ögonlocken.
- c. Ögonbrynet.
- d. Pannan.
- e. Nacken.
- f. Öronen: 1. yttre sidan af vänstra örat, 2. inre sidan af högra örat.
- g. Halsen.

##### Fig. 2.

##### *Kalfhufvudet en face.*

- a. Snabeln på undre sidan.
  - b. Nedra kanten af ögonöppningen å hvardera sidan.
  - c. Undra sidan af hufvudet.
  - d. Munnen.
  - e. Öronen till sidan utbredde: 1. högra örats inre sida, 2. vänstra örats inre sida.
  - f. Främre delen af halsen.
-

## UTDRAG

### af Kgl. Vet. Academiens Dag - Bok för det förflutne året.

Sedan Kongl. Akademien, med det allmänna, måst dela saken af sin, i lifstiden, Høge Beskyddare, nu Högstsallig Konung CARL XIII som med döden aflidit d. 5 sistl. Febr., och Kongl. Maj:st, vår nu regerande Allernådigste Konung CARL JOHAN, genom Nådig Skrifvelse under samma dag gifvit Akademien tillkänna Dess tillträde till Regeringen, aflades Tro- och Huldhets-Eden på vanligt sätt, d. 9 följande Februarii.

Till biträde i Juridiska mål, då sådane i afseende på Kongl. Academiens æconomiske årender kunna förefalla, har Akademien sedan d. 1 Octob. (1817) antagit Håradshöfdingen Hr P. A. SKÖLDBERG såsom dess Om-budsman.

Då Presidenten och Commend. Frih. E. AF WETTERSTEDT d. 13 Aug. nedlade sitt under de första 6 månaderne förda præsidium, (med ett Tal, "innehållande Reflexioner om lämpligaste utvägarne att befordra ödemarkernes uppodling och indelning till nya bostäder, samt huru deras skattläggning bör inrättas att billighet och jämlikhet må vinnas," —) valdes Stats - Secreteraren och Ridd. N. O., C. KLINTBERG till K. A. Ordförande under sednare hälften af året, hvarest han d. 25 Febr. innevarande år, (äfven med ett Tal: "En kort öfversigt af de Författningar, som sedan äldre tider blifvit vidtagne till Sv. Nationella Sjöfartens befrämjande,") lemnade klubban åt Medicinal-Rådet och R. Sv. HEDIN.

Uti Vetenskaps-Handlingarne hafva under loppet af år 1817 blifvit införde 24 Afhandlingar; nemligen: i Mathematik, Mechanik och Astronomi 7; i Physik och Chemie 5; i Natural-Historien 7; i Oeconomien 3 och i Medicinen 2.

---

Inga Ledamotsval, In- eller Utländske äro detta år af Kongl. Academiens anställda; men såsom Correspondenter äro kallade:

Hr ALEX. MOREAU JONNES (Comte de Carra S:t Cyr), Fransk Gouverneur i Cayenne, och

Hr WILLIAM PECK, Hist. Nat. Prof. i Cambridge Universitet, Massachusetts, N. America.

---

Ett Åminnelse-Tal blef hållit d. 6 Dec. öfver Kongl. Academiens framledne Ledamot, General-Lieut. m. m. VON ARBIN, af General-Majoren och Commend. af TIBELL, (år sedermera tryckt).

---

Bland Academiens Inhemske Medlemmar är Kongl. Förste Lif-Medicus och Öfver-Fält-Läkaren m. m. Dr P. af BJERKÉN med döden afgången; och på den utländska listan äro saknade: Bergs-Rådet N. J. EDL. v. JACQVIN i Wien; den berömde Mineralogen WERNER i Freyberg, och Ryska Stats Rådet RUMOWSKI i S:t Petersburg hvilken längre tid sedan aflidit.

---




## FÖRTECKNING

på de Afhandlingar och Rön, som äro  
införde i detta Första Stycke:

1. **U**ppgift af Rötternas expressioner till  
den af BEZOUT i *Cours de Mathematiques* *Algebre* pag. 231 (Paris 1800), med-  
delta formel för equationen af 5:te gra-  
den, äfvensom af dessa expressioners de-  
termination vid särskilda händelser, m. m.  
af B. BERNDTSON . . . . . pag. 11.
2. Undersökning af en ny Mineral-kropp,  
som innehålles i det vid Fahlun tillver-  
kade Svafvel; af J. AF BERZELIUS . . . . . 13.
3. Undersökning af några vid Utö Jern-  
malmsbrott träffade Fossilier och ett eget  
deri funnet eldfast Alkali; af A. ARF-  
VEDSON, . . . . . 23.
4. Om den Svenska Quarantaines - Anstalten  
på Kånsö; af P. DUBB . . . . . 29.
5. Teckning af en ny art Myrätare eller Bålta  
ifrån Brasilien; af C. P. THUNBERG . . . . . 65.
6. Några nya Genera och Species af Inse-  
cter; beskrifne af J. W. DALMAN . . . . . 69.
7. Beskrifning öfver Slågtet *Pedicellaria*; af  
S. NILSSON . . . . . 90.


8. *Uppställning af de i Sverige funne Vårt-  
svampar (Scleromyci); fortsättning  
af E. FRIES - - - - -* 100.
  9. *Physiographiska Observationer under en  
Resa genom vestliga delarne af Gestrik-  
land, Hälsingland och Jämtland; af  
C. J. HARTMAN - - - - -* 121.
  10. *Beskrifning på ett vanskapat Vatten-  
hufvud (Hydrocephalus) af en Kalf,  
jemte teckning; af A. H. FLORMAN* 161.
  11. *Utdrag af K. V. Acad. Dagbok för  
det förflutna året - - - - -* 168.
-

Tab. I.



K.W.A. Handl. 1813.


*Crocodilus*



*Crocodilus multicaudatus.*




Tab. II.



*Agaon paradoxum.*




*Celyphus ablectus.*



*Dirhinus excavatus.*



Tab. III.



Retzius del.

KWA Handl. 1848.

Ruckman. sculp.

Tab. IV.




Fig. 1.

K. W. A. Handl. 1813.




Fig. 2.

Huckman sc.



7504

KONGL.  
VETENSKAPS ACADEMIENS  
HANDLINGAR  
UNDER  
SEDNARE HÅLFTEN  
AF ÅR 1818.

---

PRÆSES  
HERR DOCTOR C. TRAFVENFELT,  
Professor, Assessor i Kongl. Sundhets-Collegium,  
Riddare af K. Nordstjerne- och Wasa Orden,

---

THE NATIONAL ARCHIVES

1941-1942

## BEVIS

*På Jämnvigts-Lagen för Mechaniska Momenterna på en Häfstång, jämte de Statiska Momenternas härledande ur samma Formel;*

af

ZACH. NORDMARK.

§. 1.

**D**å man med ordet *Mechanik* förstår vetenskapen om fasta kroppars rörelse, och de krafter, hvilka såsom orsaker anses åstadkomma eller hindra densamma; måste nödvändigt *Statiken* blott utgöra en Under-afdelning däraf, så vida den endast betraktar dessa krafter inbördes förhållande under tillståndet af deras jämnvigt, der är, då genom deras ömsesidiga verkan och motverkan all tillåmnad rörelse, hämmas. I nyssnämde del är Theorien om Häfstången ett ibland de första ämnen som plåga afhandlas, så väl i och för sig sjelft som till grundläggning för andra. Också har den Låran, ända ifrån ARCHIMEDIS och till närvarande tid, blifvit så skärskådad och fullkomnad, att därvid nu mera icke tyckes vara något synnerligt att tillägga.

K. V. A. Handl. 1818. St. II.



Men fastän jämnvigt på en Håfstång äger rum emellan tvåne tyngder, när dessa äro till hvarandra tvårtom som deras afstånd ifrån hvilopunkten eller underlaget (*Hypomochlium*); eller, hvilket kommer på ett ut, när bägge tyngderna, hvar och en multiplicerad med sitt eget afstånd ifrån nyssnämde punkt, gifva å ömse sidor lika stora Producter; så följer dock alldeles icke där af, att om tvåne i verkelig rörelse stadda kroppar på en och samma gång stöta emot hvar sin ända af en Håfstång, med Rörelse-Storheter (*Quantitates Motus*), som äro i omvändt förhållande utaf afstånden; det följer icke, säger jag, att dessa rörda kroppars anstötningar hålla hvarandra lika så väl i jämnvigt, som i förra fallet de hvilande tyngdernas tryckningar. Imedlertid antages detta utan bevis af alla *Mathematici*. De handtera blotta Tryckningar och verkliga Rörelse-Storheter på samma sätt: bägge multiplicera de med afstånden ifrån *Hypomochlium*, då Producten i förra händelsen kallas *Statiskt*, och i den sednare *Mechaniskt Moment*: och när dylika Producter af samma slag äro å ömse sidor lika stora, tages för afgjort, att jämnvigt äger rum. Detta är dock blott bevist i förra fallet; men alldeles icke i det sednare.

## §. 2.

Sjelfva begreppet af det så kallade Tröghets-Momentet (*Momentum Inertiæ*) förutsätter likväl detta. Ty låt en kropp svänga omkring en Axel eller Upphångnings Punkt (*Punctum Suspensionis*), och dess vinkelhastighet vara  $c$ , hvilken nämligen är den samma, som Absoluta hastigheten af en punkt, hvilken under svängningen skulle beskrifva Cirkel-Peripherien med Radien  $= 1$ : Om nu  $P$  är en Partikel, hvilken afstånd ifrån Su-

spensions-Punkten är  $r$ ; så är  $cr$  punktens  $P$  Absoluta hastighet i sin Peripherie, och således:  $P \times cr$  dess Rörelse-storhet: och när ändteligen denna Product multipliceras med  $r$ , fås just denna Partikels *Momentum Inertiæ*  $= P cr^2$ , eller  $= P r^2$ , då nämligen  $c$ , som är en Factor för alla Partiklarna, divideras bärt.

## §. 3.

När således fordringarna för *Mechaniska Momenternas* jämnlikhet ännu sakna bevis, torde det löna mödan att söka fylla denna brist. Men under detta bemödande vill jag med flit föreskrifva mig den lagen, att behandla *Mechaniska Momenterna*, så mycket möjligt är, efter samma Method, som de *Statiska* blifvit hitills behandlade; på det dessa sednare må kunna såsom ett *Corollarium* härledas af de förra, och således Analogien emellan Vetenskapens så närslågade Grundsanningar desto klarare inses.

## §. 4.

Hela svårigheten består i valet af den Principe, hvarifrån man bör utgå; sedan kan sjelfva slutledningen därpå icke annat än blifva helt lätt: och jag har, efter flera fruktlösa Deductioner, icke kunnat finna någon till ändamålet ginare Grundsats, än den om Jämnlikheten emellan kroppars Verkan och Motverkan (*Æqualitas Actionis et Reactionis*) vid deras (kropparnas) sammanstötningar. Lyckligtvis för närvarande fråga, så lida icke eller *Collisions*-Lagarne minsta afbräck af Ordatvisten om kropparnes döda eller lefvande krafter; tvärtom är af bägge Parterna erkänt och bevist, att genom Stöten ske i tvänne kroppar lika stora Rörelseförändringar (*Mutationes Motus*), och det åt mot-

satt led; kropparna må för öfrigt vara mjuka, hårda, eller spånstiga, och det sistnämnda, i fullkomlig eller hvilken ofullkomlig grad som helst.

### §. 5.

Låt derföre tvänne Sphæriska kroppar, till ex., hvilkas massor äro  $M$  och  $m$  (Fig. 1), och hastigheter  $V$  och  $v$ , stöta directe emot hvaran i Directionerna  $AE$  och  $BE$ ; så är, i den händelsen då de äro utan all spånstighet, deras gemensamma hastighet efter Stöten =  $\frac{MV - mv}{M + m}$ , hvilken må heta  $C$ .

Då Rörelse storheterna äro lika stora, så att  $MV = mv$ , (den enda händelsen, som i det efterföljande behöfves); blir  $C = 0$ . Kropparna stadna således af, när hela anstötningen är förbi, det är, när de ä ä omse sidor intryckta Segmenterna ernått deras *Maximum*; så att kropparna, som i början af Stöten tangerade hvarandra i punkten  $E$  (Fig. 1), vid slutet däraf hafva ytan  $HeK$  (Fig. 2) till inbördes vidrörningsställe (*Contactus mutuus*).

Om i den nu anförda händelsen, man föreställer sig, att redan i början af Stöten en absolut hård Planskifva  $FG$  (Fig. 1), och hvars Massa icke behöfde komma i någon beräkning, vore stäld emellan kropparna så, som Figuren det utvisar; så skulle ur samma skäl bägge Kulorna ändå stadna af, så snart hvarderas afplattning ernått sitt *Maximum*, svarande till storleken emot de intryckta Segmenterna  $HeK$  i (Fig. 2). Det gifves intet skäl, hvarföre någondera kroppen skulle öfvervåldiga den andra.

Än mera, om tvänne sådana Planskifvor  $FG$  och  $fg$  (Fig. 3), voro skilda ifrån hvarandra medelst obøjeliga Lineen  $Ee$ ; men samma kroppar med lika stora Rörelse-storheter äfven nu stötte emot





Tab.V (pag.176.)

Fig.1.




Fig.2.




Fig.3.




Fig.4.




Fig.5.





Fig.6.







Fig. 7

Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10



1877-1878

dem i motsatta Directionerna  $AE$  och  $Be$ : så skulle äfven i detta fall dessa kroppar förstöra hvarandras rörelser och afstadna.

### §. 6.

Om nu allt annat (Massa, Hastighet och Direction för hvardera kroppen) förblifver som förr, men kropparna antagas fullkomligen spånstiga; så måste de samma, sedan djupaste intryckningen är förbi och hvarderas hastighet  $= 0$ , genom utspänningen bägge begynna gå tillbakas i Directionerna  $eA$  och  $eB$  (Fig. 2), eller  $EA$  och  $EB$  (Fig. 3); samt under allt detta, i följd af verkans och motverkans jämnlikhet, lika starkt trycka Planet  $FG$  eller Planerna  $FG$  och  $fg$ , åt motsatt led, till dess de slutligen lämna det (eller dem) i hvila, och så skiljas ifrån hvarandra med sina fullt återvunna hastigheter  $V$  och  $v$ , och således med sina förnyade lika stora Rörelse-storheter  $MV$  och  $mv$ .

Vore åter spånstigheten ofullkomlig, så gingo väl ändå kropparna tillbakas ifrån hvarandra, men med mindre hastigheter  $U$  och  $u$ , än  $V$  och  $v$  voro; dock blifva allid de motsatta tryckningarna, så länge kropparna verka emot hvarandra, lika stora, äfvensom de slutligen förvärfvade nya *Quantiteter Motus*  $MU$  och  $mu$  blifva det; hvarpå bägge kropparna i ett och samma ögonblick lämna Planet  $FG$  (Fig. 1) eller de genom Lineen  $Ee$  sammanbundna Planerna  $FG$  och  $fg$  (Fig. 3) i tillstånd af hvila, och aflägsna sig därifrån.

### §. 7.

Men en sådan jämnlikhet emellan kroppars verkan och motverkan, och deras därutaf härrörande hvila, när deras Rörelse-storheter äro lika stora, behöfver icke förutsätta *directe* motsatta rö-



relser; de kunna äfven hålla hvarandra i jämnvigt, när de på en och samma gång anstötta hvar sin ända af en Håfstång. För att ifrån en sådan synpunkt härleda jämnvigts-lagen emellan *Mechaniska Momenterna*, blir då allrabåst och med Analogien måst likstämmt, att söka låmpa *Collisions-Lagarna* på någon af de Metoder, genom hvilka man bevisat Jämnvigts-lagen för de *Statiska*.

Ibland sistnämnda bevis, är det ostridigt det måst bindande, till hvilket DE LA HIRE allra först skall hafva gifvit anledning i sin *Tractatu de Mechanica*. Paris 1695, (hvilken jag sjelf icke haft tillfälle att se); och som sedermera är så utförligen afhandladt i MAC-LAURINS *Account of Sir I. NEWTONS Philos. Discoveries*, Lond. 1748, p. 151 *sequ.*; hvarmed också KÄSTNERS bevis i *Veletis et compositionis virium Theoria evidentius exposita*, Lips. 1753, p. VI. *sequ.*, fullkomligen instämmer.

I likhet därmed föreställom Oss *AB* (Fig. 4) vara en lik-armig och alldeles oböjelig Håfstång, man all tyngd, och att tvänne sphæriska kroppar *M* och *m*, med lika stora Rörelse-storheter *MV* och *mv*, på en och samma gång stöta emot dess bägge ändar *A* och *B* i Directionerna *MA* och *mB*; så är klart, att någondera kroppen lika så lättet här kan öfverväldiga den andra, som i (Fig. 1) eller (Fig. 3). Emedan nämligen *AC=CB* (Fig. 4), så är kroppens *m* förmåga att nedtrycka punkten *B*, lika stor med dess kraft att höja punkten *A*; så att i det afseendet gör han i (Fig. 4) samma verkan med sin stöt neder-åt, som han i (Fig. 5) skulle göra med lika stöt up-åt i Direction *mA*; i hvilken (sednare) händelse bägges Rörelse-storheter skulle nödvändigt jämnt up motvåga hvarandra. (Skilnaden är blott den, att i (Fig. 4) emot-

tar Hypomochlium  $C$  bågge anstötningarnes samfalta verkan neder-åt; då det tvärtom i (Fig. 5) har däraf ingen känning.) De lika stora Rörelse-storheterna  $MV$  och  $mv$  äro således på den lik-armiga Håfstången  $AB$  (Fig. 4) emot hvarandra i jämnvigt.

Om kropparna  $M$  och  $m$  voro mera eller mindre spånstiga, så skulle de väl efter stöten lämna Håfstången, men dock alltid återstudsas därifrån med lika stora *Quantitates Motus*  $MU$  och  $mu$ , och, utan att rubba hennes läge, lämna henne i hvila; lika så väl som de samma i (Fig. 1) och (Fig. 3) lämna Planet  $FG$ , eller Planerna  $FG$  och  $fg$ , i hvila. I en sådan händelse vore hela Rörelse-storheterna  $MV$  och  $mv$  hämmade, och de åt motsatt led återställda vore  $MU$  och  $mu$ ; så att hela förändringarna af dem vore  $M(V+U)$  och  $m(v+u)$ , hvilka alltid äro lika stora, i anledning af verkans och motverkans jämnlikhet. En lika lydande anmärkning kan göras vid alla efterföljande händelser, då man antager, att kropparne äro till någon Grad spånstiga; men som sådana tilläggningar på hvar sitt ställe äro ända till öfverflöd sjelfsydliga; vilje vi härefter utelämna dem, och antaga kropparna utan spånstighet.

### §. 8.

I nyss anförda Exempel (Fig. 4), i hvilket  $AC=CB$  och  $MV=mv$ , är klart, att Hypomochlium  $C$  uthårdar Summan af bågge Rörelse-storheternas tryckningar; så att, om man tänker sig en kropp, hvilkens Rörelse-storhet vore  $=MV+mv$ , det är  $=2MV$  eller  $2mv$ ; så skulle dess Directa stöt emot  $C$  ensam förorsaka samma tryckning däremot, som uppkommer af de bågge emot  $A$  och  $B$ . Om derföre  $N$  (Fig. 6) är en sådan kropp och dess

hastighet  $U$ , så att  $NU$  är  $= MV + mv$  (eller  $2mv$ ); och denne antages att, i Direction  $NC$  (motsatt emot  $MA$  eller  $mB$ ), på samma gång stöta emot Håfstängen, i  $C$ ; så skall han jämnt up motverka  $M$  och  $m$ , och alla tre kropparna bringas till hvila, utan att Håfstängen viker undan, eller vrides åt någondera leden.

I denna händelsen är det kroppen  $M$ , som med sin *Quantitas Motus*  $MV$  hindrar punkten  $A$  ifrån att röra sig upåt i Direction  $AM$ , hvarpå eljest de bägge öfriga kropparna  $N$  och  $m$  samfällt arbeta. Men med bibehållande af allt det öfriga i (Fig. 6), kan  $M$  borttagas, och i dess ställe denna rörelsen af  $A$  förekommas därigenom, att i  $A$  supponeras en fast punkt eller Axel, omkring hvilken Håfstängen fullkomligen fritt kan vrida sig, som (i Fig. 7). Därigenom rubbas icke hvarken sjelfva Håfstängens eller kropparnas  $N$  och  $m$  genom stöten upkomna hvila. Således håller  $N$  (Fig. 7). med sin stöt emot  $C$ , jämnvigt emot stöten af  $m$  emot  $B$ , när  $NU$  är  $= 2mv$ , och tillika  $AB = 2AC$ , så att  $NU:mv::2:1::AB:AC$  eller  $N.U \times AC = m.v \times AB$ .

Om nu längderna  $AC$ ,  $AB$ , så väl som kropparna  $N$  och  $m$ , och hastigheterna  $U$  och  $v$ , förblifva för öfrigt de samma, som nyss sagdt är; men Håfstängen utdrages på andra sidan om *Hypomochlium*  $A$  (Fig. 8). så att  $AK = AC = \frac{1}{2} AB$ , och kroppen  $N$  nu mera stöter i Direction  $NK$ ; så är klart, att den har här samma styrka att nedtrycka armen  $AK$ , och med det samma höja armen  $AB$ , som han hade i (Fig. 7). Och emellan den ena kroppens stöt höll jämnvigt emot den andras i (Fig. 7), måste samma jämnvigt äga rum i (Fig. 8), hvaräst äfven ä  $NU = 2mv$ , och

$AB = 2AK$ , eller  $NU:mv :: 2:1 :: BA:AK$ ,  
det är  $N.U \times AK = m.v \times AB$ .

I närvarande (Fig. 8) är klart, att  $A$  uthårdar tryckningen af Summan af Rörelse-storheterna  $NU + mv$ , det är af  $3mv$ ; och om, i stället för stödet  $A$ , supponeras en ny kropp med Rörelse-storheten  $= 3mv$  stöta emot  $A$  neder-ifrån upåt, och så vidare, så bevises på samma sätt, att en Rörelse-storhet  $= 3mv$  i  $K$  är i jämnvigt med en dylik  $= mv$  i  $B$ , om  $AB$  är  $= 3AK$ .

### §. 9.

På samma sätt kan beviset fortsättas till hvad mångfaldighet man vill af den ena Håfstängs-armen emot den andra, eller af den ena *Quantitas Motus* emot den andra; och slutligen ifrån mångfaldiga till hvad förhållande som helst. Denna fortsättningen är alldeles likformig med den motsvarande Methoden med *Statiska Momenterna*, som är allmänt bekant; så att det vore alldeles ofverflödigt, att längre uppehålla sig dervid. Den satsen är således i hela sin allmänhet sann, att — Om tvänne kroppar, hvilkas Massor äro  $M, m$ , med hastigheterna  $V, v$ , på samma gång stöta emot hvar sin Håfstängs-arm  $R, r$ , så att de verka emot hvarandra; så uphåfva de hvarandras Rörelser (eller äro i jämnvigt), när  $MV:mv :: r:R$ , d. ä. när  $MVR = mvr$ .

Denna *Æquation* innehåller Jämnvigts Lagen för de så kallade *Mechaniska Momenterna*, och tilika deras *Expression*.

Det förstås af sig sjelft, och inses af hela Slutföljden, att man här blott betraktat kropparna, såsom begäfvade endast med deras Tröghets-kraft (*Vis inertia*), utan någon tyngd. I alla fall uphåfva de väl hvarandras rörelse, när  $MVR = mvr$ ,



så att emellan sjelfva anstötningarna är jämnvigt och Håfstängen i hvila; men om hvilan åfven efter stöten skall fortfara, när de antagas tunga; så fordras, att anfalls-hastigheterna  $V$  och  $v$  skola förut vara lika stora; åfven så vål som de af Tyngdkraften sedermera tillåmnade Initial-hastigheterna  $dV$  och  $dv$  alltid åro lika stora. I denna händelsen är Jämnvigts Formeln för sjelfva stöten  $MvR = mvr$ ; och för sjelfva Tyngdkraftens verkan efteråt  $M.dv.R = m.dv.r$  eller  $M.2gdt.R = m.2gdt.r$  (då  $2g$  är Tyngdens Skyndkraft (*Vis Acceleratrix*), och  $dt$  en oändeligt liten tid); hvilka, då de lika stora hastigheterna bort-divideras, reduceras till  $MR = mr$  och således  $M:m::r:R$ .

#### §. 10.

Att Jämnvigts-Lagen för *Mechaniska Momenterna* åfven innebegriper under sig, såsom en särskild händelse eller *Corollarium*, Jämnvigts-Lagen för de *Statiska*, kan också på följande sätt tydligen inses. Då nämligen i Formeln för de förra  $V=v$ , och således  $MvR = mvr$ , så är ju alltid  $Mv:m v::M:m::r:R$ ; hastigheten  $v$  må antagas aldrig så stor, eller aldrig så liten. Om den nu föreställes vara, som man säger oändeligt liten; så blifva ock Rörelse-storheterna  $Mv$  och  $mv$  oändeligen små, det vill så mycket säga som, de blifva slutligen för ett ögonblick blott tryckande tyngder. Och om dylika oändeligen små anstötningar tänkas ouphörligen förnyade; så utgöra de fortfarande jämna tryckningar emot Håfstängen, det är, Vigter, hvilka hålla jämnvigt emot hvarandra, när  $M:m::r:R$ .

En hel annan sak vore det, om kropparnas Massor  $M$  och  $m$ , hvardera värderad efter sin *Vis Inertiae*, voro de samma, men Tyngdens *Vis acceleratrix*  $2G$  i  $K$  (Fig. 9) olika med den motsva-



rande  $2g$  i  $L$ . Likheten emellan *Statiska Momenterna* skulle då fordra, att  $M \cdot 2G dt \cdot R = m \cdot 2g dt \cdot r$ , och således  $M \cdot 2G dt : m \cdot 2g dt :: M \cdot 2G : m \cdot 2g :: r : R$ . Men emedan  $2G$  och  $2g$ , såsom olika storheter, icke här kunna bortdivideras, blir här aldrig  $M : m :: r : R$ ,

## §. II.

Om vi, med åsidosättande af Tyngdkraften, återgå till det allmänna förhållandet för jämnvigten emellan tvänne Rörelse-storheter, som verka på en Håfstång, nämligen  $MV : mv :: r : R$ , och antage, att hastigheterna äro Directe, som afstånden; så är  $MV : mv :: MR : mr :: r : R$ , och  $MR^2 = mr^2$ , så att Producten af den ena kroppens Massa med Quadra-ten af afståndet ifrån *Hypomochlion*, bör vara lika stor med den motsvarande Producten för den andra.

En sådan Product för en Partikel af en kropp, som rullar omkring en Axel, är känd under namn af den Partikeln Tröghets-Moment (*Momentum Inertiae*) i anseende till samma Axel; och Summan af alla Partiklarnas så beräknade Momenter utgör Tröghets-Momentet för hela den kroppen i lika afseende.

Låt, nämligen kropparna  $M$  och  $m$ , (Fig. 9), hvilkas Volumer må vara för obetydliga för att behöfva tagas i betraktande, vara fästade vid ändarna  $K$  och  $L$  af den oböjliga och tyngdlösa Linneen  $KL$ , som af hvad orsak som helst är satt i rörelse omkring punkten  $O$ ; så är klart, att  $V : v :: Kk : Ll :: KO : OL :: R : r$ , och följaktligen  $MR^2 : mr^2 :: MV^2 : mv^2 :: MVR : mvr$ . Om nu  $MR^2 = mr^2$ , så blir så väl  $MV^2 = mv^2$ , som ock  $MVR = mvr$ ; af hvilka den sista Æquation instämmer alldeles med den ofvanföre bevista Jämnvigts-Lagen för *Mechaniska Momenterna*: så att om  $KL$  läge stilla, och kropparna anföllo henne med hastighe-

terna  $V$  och  $v$  (som  $R$  till  $r$ ), så att de motverkade hvarandra; så skulle de jämnt up håmma hvarandras rörelse, och  $KL$  förblifva i hvila.

I närvarande händelse återigen störa de icke emot  $KL$ , reläuft till hvilken de äro i hvila; men i dess ställe är  $KL$  sjelf i den rörelse tillika med kropparna, att samma jämnlikhet  $MVR = mvr$  äger rum. Derföre om de äfven nu, i stället för att följas åt, kommo i det låge, att de verkade emot hvarandra, så att t. ex. den ena sträfvade efter att fortfara i bågen  $K\lambda$  och den andra i  $L\lambda$ ; så skulle de också nu bringa hvarandra i hvila. I alla fall hafva de bägge lika stor kraft, att bibehålla stängen  $KL$  vid sin erhållna vinkel-hastighet (*Velocitas Angularis*); så att om hon under sin Rotation möter ett hinder  $P$ , som alldeles håmmar hennes rörelse; så trycker hon emot  $P$  med lika styrka, när  $M$  är allena, som när  $m$  vore allena, så snart nämligen  $MR^2 = mr^2$ ; och när de bägge hjelpas åt, blir således deras samfällta tryckning dubbel emot den ensamma.

### §. 12.

Af det föregående följer, att om Tyngdens *Vis Acceleratrix* vore på det sättet olika för tvänne Vigter  $M$  och  $m$  på en Håfstång, att den förhölle sig som afstånden, så att  $2G:2g::R:r$ ; så förvandlar sig den allmänna Proportion för jämnvigten  $MV:mv::r:R$  uti  $M:2Gdt:m:2gdt::r:R$ , eller  $MR:mr::r:R$ , hvaraf  $MR^2 = mr^2$ ; så att i en sådan händelse skulle *Statiska Momenterna* och *Tröghets-Momenterna* vara ett och det samma.

### §. 13.

Men i stället för det i föregående Paragrapher förda bevisnings sätt, låtom Oss nu till slut un-

dersöka, huruvida NEWTONS Method att bevisa Theorien af Statiska Momenterna må kunna användas på de Mechaniska, med förbehåll likväl, att grunden till de sistnämnda utgöres ändå af samma Præmissor ungefärligen ur Låran om fasta kroppars sammanstötningar, som ofvanföre till samma ändamål blifvit nyttjade.

Föreställom Oss derföre, att en kropp, hvars Massa är  $M$  (Fig. 10) och hastigheten  $V$ , stöter i Kvinkelrätt emot ändan af Håfstängs-armen  $KO = R$  i samma ögonblick, som  $m$  med hastigheten  $v$  stöter i  $L$  vinkelrätt emot ändan  $L$  af andra armen  $OL = r$ . Det frågas, hvad förhållande  $MV$  bör hafva till  $mv$ , på det att den ena kroppens stöt må, medelst Håfstängen, hålla jämnvigt emot den andras.

Låt till den ändan med den större armen  $OL$  beskrifvas en Cirkel, som nödvändigt skall skära lineen  $MK$  i tvänne punkter, af hvilka den ena må vara  $D$ . Sammanbind  $OD$ , och på  $KD$  utdragen låt  $DA$  utmärka Rörelse-storheten  $MV$ , eller, om hållre så behagas, hela den tryckning, som  $M$  hinner göra emot ett motsiående hinder, innan  $MV$  genom dess motstånd blifvit fullkomligen till intet gjord; och uplös  $DA$  i sidokrafterna  $DE$  och  $DC$ , som Figuren visar; i hvilken man för öfrigt antager, att sjelfva Håfstängen, eller hvilken Linea som beviset hålst behöfver, kan antagas som fullkomligen hård och oböjelig, samt utan all både Massa och tyngd.

Antingen nu  $M$  antages stöta directe emot  $K$ , eller hvad punkt som helst såsom  $P$  eller  $D$  på oböjliga Lineen  $MD$ , i hvilka man kan föreställa

sig små Planer  $FG$  eller  $HN$ , som vinkelrätt emot-  
taga stöten; så är klart, att dess förmåga att vrida  
ästad Håfstängen  $KOL$  eller hjulet  $DL$ , är i alla  
dessa tre händelser den samma. Låt derföre sjelfva  
stöten antagas ske i  $D$ ; så är

$$OL : OK :: OD : OK :: AD : DC \text{ och således}$$

$$DC = \frac{AD \times OK}{OL} = \frac{M.V \times OK}{OL} = M.V. \frac{R}{r}$$

Men nu är armen  $OD = OL$ ; och kraften  
 $DC$ , som är det samma som en Rörelse-storhet  
 $M.V. \frac{R}{r}$  verkar vinkelrätt emot  $OD$ , äfven som  $mv$   
verkar vinkelrätt emot  $OL$ : derföre, på det dessa  
motsatta krafter skola kunna hålla jämnvigt emot  
hvarandra, måste de vara lika stora, det är  $M.V. \frac{R}{r}$   
 $= mv$ , och således  $MV : mv :: r : R$ .

#### §. 14.

I nu anförda bevis är antaget för gifvet, att  
en kropps Rörelse-storhet, eller dess förmåga att än-  
dra en annan kropps Rörelse-storhet, kan såsom en  
Diagonal-kraft  $DA$  uplösas i tvänne sådana sido-  
krafter som  $DE$  och  $DC$ .

Men här om äro icke Mathematici ense. Nå-  
gre påstå nämligen, att *Parallelogrammum Virium*  
endast kan lämpas på blotta Tryckningar (*Pressio-  
nes*) och deras verkningar; men alldeles icke till  
Rörelse-storheter och deras verkningar.

Att uprepa allt hvad i denna fråga kan så-  
gas mot och med, vore här för vidlyftigt. Men  
såsom en hufvudsaklig Præmiss till dess granskande  
bör ihogkommas, att kroppars verkan på hvaran-  
dra under stöten måtes genom Summan eller Inte-



gralen af en oändelig mängd stora, men ögonblickliga tryckningar. Nu kan ju hvar och en sådan *Pressio Momentanea* tänkas särskildt vara upplöst i sina sidotryckningar; hvarföre skall då icke Resultatet af alla de förra också kunna tänkas upplöst i sina sido-Resultater?

Imedlertid vill jag icke påstå, att det sist anförda beviset är fullkomligen så bindande, som det förut anförda, hvaråst krafternas Parallelogramm icke behöfs. Och torde ännu flera kunna upptäckas; men troligen komma de alla att ursprungligen grunda sig på Låran om kroppars lika stora verkan och motverkan vid deras sammanstötningar.

---

## N Å G R A

Theoretiska Undersökningar  
rörande Högdmatning med tillhjälp af  
Barometern;

af

NATH. GERH. AF SCHULTEN,

Adjunct vid Kejsarl. Acad. i Åbo.

Sedan LAPLACE uti 4:de Tomen af sin *Traité de Mécanique Celeste* (Paris 1805) så utmärkt arbetat theorien om högdmatning med Barometern, genom anbringande af nästan alla möjliga correctioner, som på resultaterne kunna hafva inslytande, har man allmänt, och det med skäl, ansett denna theori så nära bragt till fullkomlighet, att dervid föga af betydenhet kunde vara att tillägga. Det kan likväl icke nekas, och är af samme store Författare sjelf medgifvet, att en viss punkt af i frågavarande ämne, nemligen vattengasens i luften inslytande, uti nyssnämnde formel ännu saknar behörig utredning, ehuru dess betraktande i densamma visserligen ej är aldeles uraklåtet. Denna corrections intagande, till kompletterande af theorien, har derföre med rätta ådragit sig uppmärksamhet af nyare physico-mathematici, och det så mycket mera, som det ej synts osannolikt, att densamma vid högre sommartemperaturer kunde blifva af större

större inflytande än de vanliga förbättringarne för  
 tyngdens variationer, ja tilläfsventyrs någon gång  
 betydligare än sjelfva correction för qvicksilfrets  
 utvidgning i Barometern. Enligt det jag vet,  
 hafva likväl ganska få Författare, och det visser-  
 ligen med nog korthet, hitintills behandlat föreva-  
 rande ämne; hvarföre dess upptagande ifrån bör-  
 jan ännu icke lär vara för sakens vidare fram-  
 steg aldeles likgiltigt. Ännu en annan omständig-  
 het, åtminstone för större höjden af inflytelse, sy-  
 nes mig förtjena en närmare uppmärksamhet i den  
 theoretiska behandlingen af detta ämne; jag menar  
 aberrationen af värmens verkliga afagningslag uppåt  
 i observations-momentet, ifrån den vanliga hypo-  
 thesen, som äfven ligger till grund uti Laplaciska  
 formeln, att detta aftagande sker i aritmetisk pro-  
 gression; en aberration, hvilken, då den i det hela  
 verkligen är sannolik, till sin verkan på resulta-  
 terne ej är ovärdig en nogare undersökning, åt-  
 minstone vid närvarande tidpunkt, då vi hunnit  
 till en så säker kännedom af luftens rätta utvidg-  
 ningslag af värmets. Utan tvifvel bör det medgif-  
 vas, att, så länge fråga är att beräkna samtida  
 Barometer- och Thermometer-observationer endast  
 uti *tvänne* punkter af verticalen, den ofvannämnda  
 vanliga hypotesen för värmens aftagande, såsom  
 af alla den naturligaste, af ingen annan bör ut-  
 trängas, hvarföre den äfven med mycket skäl i  
 hypsometrisk formel hitintills varit antagen: men,  
 en annan sak är det, om man, vid vigtigare  
 högdbestämningar, vill besvåra sig med ännu en  
*trede* Barometer- och Thermometer-observation  
 emellan sjelfva hufvudpunkterna, hvarigenom en  
 ny bestämning i värme-afagnings-functionen kan  
 erhållas. Då bör denna function visserligen an-

ses innehållande ända till tre constanter, och hufvudresultatet bör härigenom blifva exactare, än efter den vanliga enkla hypotesen, i fall den i det föregående nämnda aberration verkligen åger rum.

Då jag ej påminner mig hos någon Författare, som skrivit öfver närvarande ämne, hafva sett den term i allmänna formeln utvecklad, hvilken uppkommer genom nyss anförde åsigt, och visserligen i flere afseenden kan vara af nytta, skall denna punkt af theorien, utom de i det föregående vidrörda ämne föga allmänna Hygrometer-correctionerne, utgöra hufvudsakliga föremålet för min uppmärksamhet i närvarande afhandling, som jag till Kongl. Academiens skonsamma bedömande ödmjukast får öfverlåta.

Emedan ämnets upptagande ifrån dess första grunder ej kan undvikas, låt, vid verticala höjden  $x$  öfver understa observations-punkten, luftens tätet vara  $= D$ , Barometerhöjden, reducerad till temperaturen  $\vartheta$  (der gradtalet  $\vartheta$ , liksom alla öfriga här förekommande temperaturer, räknas ifrån vattnets fryspunkt längs en gifven rätt construerad qvicksilfver-thermometer)  $= P$ , vattengasens särskildta Barometerhöjd  $= T$ , och luftens temperatur  $= G$ . De fyra quantiteterna  $x$ ,  $P$ ,  $T$ ,  $G$  må, vid understa observations-punkten, öfvergå till  $o$ ,  $p$ ,  $t$ ,  $g$ , vid den öfversta punkten till  $h'$ ,  $p'$ ,  $t'$ ,  $g'$ , samt, vid den i det föregående omtalta medelstation, till  $h''$ ,  $p''$ ,  $t''$ ,  $g''$ . Antag vidare qvicksilfrets tätet vid  $\vartheta^o = \Delta$ , tätheten af fullkomligt torr luft vid temperaturen och Barometer-höjden  $\pi$  (hvars qvicksilfver må ha värmen  $\vartheta$ , och solliciteras af accelerations-kraften  $\phi$ )  $= \delta$ , förhållandet emellan luftens och vattengasens tätet (vid samma tryckning och temperatur)  $= 1:q$ , samt luftens och vattengasens sanna utvidgning i afseende på volumen för  $1^o$



på Thermometern,  $= m$  (då, efter vanligheten, dessa gasers massa och tryckning anses constanta, samt totala volumen vid  $0^\circ$  antages  $= 1$ ). Sätte vi vidare tyngdens accelerations-kraft, sådan den af centrifugalkraften är modifierad, vid understa observations-punkten  $= f$ , samt afståndet emellan denna punkt och jordens medelpunkt  $= a$ , så blir, utan märkligt fel, tyngdkraften vid verticala höjden  $x$  öfver understa station  $= \frac{a^2 f}{(a+x)^2}$ .

Följakteligen, enligt bekanta lagar för flytande Kroppars jämvigt:

$$\frac{-Ddx}{(a+x)^2} = \Delta \cdot d \left( \frac{P}{(a+x)^2} \right),$$

$$= \frac{\Delta \cdot ((a+x)^2 dP - 2(a+x)Pdx)}{(a+x)^4} \dots (1).$$

Men, enligt luftens och vattengasens kända physiska förhållanden, hafve vi æquation:

$$D = \frac{\delta a^2 f \cdot (1+m\gamma) \cdot (P-rT)}{\pi \phi \cdot (a+x)^2 \cdot (1+mG)} \dots (2).$$

der, för korthetens skuld,  $1-q=r$ .

Eliminera  $D$  emellan (1) och (2), så erhålles:

$$\frac{-\delta a^2 f \cdot (1+m\gamma)}{\Delta \pi \phi} \cdot \left( 1 - r \cdot \frac{T}{P} \right) dx = \frac{dP}{P} - \frac{2dx}{a+x} \dots (3),$$

en æquation, hvars integration först bör företagas, sedan, för  $G$  och  $\frac{T}{P}$ , blifvit insatta de functioner af  $x$ , som svara emot de antagne hypoteser för värmens och fugtighetens aftagande emellan begge hufvudstationerne. I närvarande fall, då vi antage observationer vara anställda i trenne särskilda punkter af verticalen, är det väl naturligast att ponera:

$$G = a_1 + b_1 x + c_1 x^2, \quad \frac{T}{p} = a_2 + b_2 x + c_2 x^2;$$

hvarigenom således (3) förvandlas till:

$$\frac{-da^2 f \cdot (1+m\gamma) \cdot (1-r(a_2 + b_2 x + c_2 x^2)) dx}{\Delta \pi \varphi \cdot (a+x)^2 \cdot (1+m(a_1 + b_1 x + c_1 x^2))} \\ = \frac{dp}{p} - \frac{2dx}{a+x} \dots \dots \dots (4),$$

der constanterne  $a_1, b_1, c_1$  och  $a_2, b_2, c_2$ , med tillhjelp af æquationerne:

$$g = a_1, \\ g' = a_1 + b_1 h' + c_1 h'^2, \\ g'' = a_1 + b_1 h'' + c_1 h''^2, \text{ och} \\ \frac{t}{p} = a_2,$$

$$\frac{t'}{p'} = a_2 + b_2 h' + c_2 h'^2, \\ \frac{t''}{p''} = a_2 + b_2 h'' + c_2 h''^2,$$

till sina värden anses sålunda determinerade:

$$a_1 = g, \\ b_1 = \frac{g' - g}{h'} + \alpha \frac{(g'' - g)h' - (g' - g)h''}{h'' \cdot (h' - h'')}, \\ c_1 = \alpha \frac{(g' - g)h'' - (g'' - g)h'}{h'h'' \cdot (h' - h'')}, \text{ och}$$

$$a_2 = \frac{t}{p}, \\ b_2 = \frac{\frac{t'}{p'} - \frac{t}{p}}{h'} + \beta \frac{\left(\frac{t''}{p''} - \frac{t}{p}\right)h' - \left(\frac{t'}{p'} - \frac{t}{p}\right)h''}{h'' \cdot (h' - h'')}, \\ c_2 = \beta \frac{\left(\frac{t'}{p'} - \frac{t}{p}\right)h'' - \left(\frac{t''}{p''} - \frac{t}{p}\right)h'}{h'h'' \cdot (h' - h'')}.$$

Coëfficienterne  $\alpha$  och  $\beta$ , som vi uti dessa uttryck med flit låta vara obestämda, äro här i sjelfva verket = 1, men böra, i de enkla hypoteserne:

$$G = a_1 + b_1 x, \quad \frac{T}{P} = a_2 + b_2 x,$$

anses = 0.

Det återstående af calculen, som nu består uti att integrera den nog complicerade (4) emellan gränssorne  $x=0$ ,  $P=p$  och  $x=h'$ ,  $P=p'$ , samt derefter utveckla  $h'$  uti series efter digniteterna af de små qvaniteterne  $m$ ,  $\frac{t}{p}$ ,  $\frac{t'}{p'}$ ,  $\frac{t''}{p''}$  och  $\frac{\pi}{a}$ , skulle visserligen leda till räkningar af den vidlöfthet, att de med största svårighet kunde verkställas, så framt operationen i fullkomlig allmänhet, eller enligt den method som vid första påseendet erbjuder sig, skulle företagas; men lyckligtvis kan det slutliga resultatet, med bibehållande af all dess accuratesse, ojämförligt lättare på följande sätt erhållas. Låt i allmänhet (4) föreställas med:

$$F\left(m, \frac{t}{p}, \frac{t'}{p'}, \frac{t''}{p''}, \frac{\pi}{a}, h', x, P, \frac{dP}{dx}\right) = 0,$$

och dess fullständiga integral med:

$$F\left(m, \frac{t}{p}, \frac{t'}{p'}, \frac{t''}{p''}, \frac{\pi}{a}, h', x, P\right) = C;$$

så blir följakteligen den förnämsta frågan här att reducera æquation:

$$F\left(m, \frac{t}{p}, \frac{t'}{p'}, \frac{t''}{p''}, \frac{\pi}{a}, h', 0, p\right) - \\ F\left(m, \frac{t}{p}, \frac{t'}{p'}, \frac{t''}{p''}, \frac{\pi}{a}, h', h', p'\right) = 0,$$

till formen:

$$h' = A + Bm + C\frac{t}{p} + D\frac{t'}{p'} + E\frac{t''}{p''} + F\frac{\pi}{a} + \&c.;$$

der  $A, B, C$  &c. äro oberoende af  $h', m, \frac{t}{p}, \frac{t'}{p'}, \frac{t''}{p''}$  och  $\frac{\pi}{a}$ . Men, betrakta vi nogare dessa sex coëfficienter  $A..F$ , hvars bestämmande utgör vårt hufvud-ändamål (så vida de termer, som innehålla

$m, \frac{t}{p}, \frac{t'}{p'}, \frac{t''}{p''}, \frac{\pi}{a}$  sins emellan multiplicerade, såsom mycket små, eller i allmänhet af samma grad med observationernes och hypothesernes fel, redan ifrån början kunna uraktlåtas), så inses lätt, efter

$m, \frac{t}{p}, \frac{t'}{p'}, \frac{t''}{p''}, \frac{\pi}{a}$  på intet vis äro af hvarandra beroende, att de enkla differential-æquationerne:

$$\left. \begin{aligned} F\left(m, 0, 0, 0, 0, h', x, P, \frac{dP}{dx}\right) &= 0 \\ F\left(0, \frac{t}{p}, 0, 0, 0, h', x, P, \frac{dP}{dx}\right) &= 0 \\ F\left(0, 0, \frac{t'}{p'}, 0, 0, h', x, P, \frac{dP}{dx}\right) &= 0 \\ F\left(0, 0, 0, \frac{t''}{p''}, 0, h', x, P, \frac{dP}{dx}\right) &= 0 \\ F\left(0, 0, 0, 0, \frac{\pi}{a}, h', x, P, \frac{dP}{dx}\right) &= 0 \end{aligned} \right\} \dots (5).$$

såsom gifvande hvar och en för sig en utaf æquationerne:

$$h' = A + Bm + \&c.,$$

$$h' = A + C \frac{t}{p} + \&c.,$$

$$h' = A + D \frac{t'}{p'} + \&c.,$$



$$h' = A + E \frac{t''}{p} + \&c.,$$

$$h' = A + F \frac{\pi}{a} + \&c.,$$

måste tillsammans vara tillräckliga till bestämmande af de sex quantiteter vi söka. Säsom nu hvar och en för sig af æquationerne (5) i alla afseenden är handterligare än den allmänna (4), synes lätt fördelen af nu anförde method, som ock är den vi i sjelfva verket följt vid determination af  $A \dots F$ , och hvarigenom, utan särdeles möda, följande allmänna värde på höjden  $h'$  erhållits:

$$h' = \frac{\Delta \pi \varphi \cdot \Phi}{\delta f} \cdot L \left( \frac{p}{p'} \right) \cdot \left\{ 1 + m \left( \frac{g + g'}{2} - \gamma + n \right) \right. \\ \left. + r \left( \frac{p}{2} - \frac{p'}{2} + n_1 \right) + \frac{2 \Delta \pi \Phi}{\delta a f} \cdot \left( 1 + \frac{\ell}{2} \cdot L \left( \frac{p}{p'} \right) \right) \right\} \dots (6),$$

hvarvid:

$$m = \alpha \cdot \frac{\Delta \pi \varphi \Phi}{\delta f} \cdot L \left( \frac{p}{p'} \right) \frac{\frac{\Delta \pi \varphi \Phi}{\delta f} \cdot L \left( \frac{p}{p'} \right) \cdot (g' - g) - h''(g' - g)}{6h'' \cdot \left( \frac{\Delta \pi \varphi \Phi}{\delta f} \cdot L \left( \frac{p}{p'} \right) - h'' \right)},$$

$$n_1 = \beta \cdot \frac{\Delta \pi \varphi \Phi}{\delta f} \cdot L \left( \frac{p}{p'} \right) \frac{\frac{\Delta \pi \varphi \Phi}{\delta f} \cdot L \left( \frac{p}{p'} \right) \cdot \left( \frac{t''}{p''} - \frac{t}{p} \right) - h'' \cdot \left( \frac{t''}{p''} - \frac{t}{p} \right)}{6h'' \cdot \left( \frac{\Delta \pi \varphi \Phi}{\delta f} \cdot L \left( \frac{p}{p'} \right) - h'' \right)}.$$

Tecknet  $L$  utmärker vanliga BRIGGSka Logarithmer, och  $\varphi = \text{Hyp. Log. } 10 = 2,30258 \&c.$  Hvad coefficienterne  $\alpha$  och  $\beta$  angår, som här i

sjelfva verket  $\bar{a} = 1$ , så utvisar deras närvarande obestämda utseende huru som de vidlöftigaste termerna i formeln allenast uppkomma genom observations anställande vid den förutnämnda mellanstation: dock synas dessa termer likväl i det hela ej derföre böra förkastas, då formeln genom deras inlagande onekeligen är accuratare.

Ett par små transformationer äro nödvändiga, att bereda formeln (6) för practiska tillämpningar.

Att neml. först något nogare determinera  $\frac{\Phi}{f}$ , antag understa observations-punktens latitud  $= \lambda$  och verticala höjd öfver hafsytan  $= h$ , jordens tyngdkraft under latituden  $\lambda$ , och vid höjden  $h$ , öfver hafsytan  $= \Phi$ , samt secundpendlarnes längder vid polen och æquator (vid hafsytan och i luftomt rum)  $= \Pi$  och  $E$ ; då vi således genast få:

$$\frac{\Phi}{f} = \frac{a^2}{(a+h, -h)^2} \cdot \frac{E + (\Pi - E) \cdot \sin \lambda^2}{E + (\Pi - E) \cdot \sin \lambda^2}$$

$$= \left(1 - \frac{2(h, -h)}{a} + \&c.\right) \cdot \left(1 - \frac{\Pi - E}{\Pi + E} \cdot \cos 2\lambda\right) \cdot \left(1 + \frac{\Pi - E}{\Pi + E} \cdot \cos 2\lambda + \&c.\right)$$

Den andra anmärkningen, som här ej mindre förtjenar anföras, beträffar de observerade Barometerhöjdernes reduction till de i formeln förekommande värden  $p$ ,  $p'$ ,  $p''$ : en reduction, som Barometerskalornes, och i synnerhet qvicksilfrets, förändringar af värmets göra nödvändig. Låt således  $\delta$ ,  $\delta'$ ,  $\delta''$  vara de directe observerade, och endast för capillaritetens verkan (då ej Siphon-Barometrar nyttjas) corrigerade, Barometerhöjderna vid de tre stationerne;  $t$ ,  $t'$ ,  $t''$  Barometrarne temperaturer respective;  $\theta$ ,  $\theta'$ ,  $\theta''$ , de temperaturer för hvar och en af Barometrarne, vid hvilka deras skalor sams emellan öfverensstämma;  $l$ ,  $l'$ ,  $l''$  skalornas lineära

utvidgningar för  $1^\circ$ , då deras längder vid vattnets fryspunkt antagas  $= 1$ ; samt ändteligen  $v$  quicksilfrets samma volume-utvidgning för  $1^\circ$ , då volumen vid  $0^\circ$  sätes  $= 1$ . Man erhåller då utan svårighet:

$$\begin{aligned} \theta &= \frac{b(1+ls)(1+v\vartheta)}{(1+l\theta)(1+vs)}, \\ \theta' &= \frac{b'(1+l's')(1+v\vartheta)}{(1+l'\theta')(1+vs')}, \\ \theta'' &= \frac{b''(1+l''s'')(1+v\vartheta)}{(1+l''\theta'')(1+vs'')}; \end{aligned}$$

och altså:

$$L\left(\frac{p}{p'}\right) = L\left(\frac{b}{b'}\right) - \frac{v}{\varrho}(s-s') + \frac{l}{\varrho}(s-\theta) - \frac{l'}{\varrho}(s'-\theta') + \&c. *).$$

Det återstår endast att i hufvudformeln (6) uttrycka alla constanta qvantiteter såsom  $\frac{\Delta \pi \varrho}{\delta}$ ,  $r$ ,  $m$ , &c., med deras motsvarande numervärden, enligt hitintills anställda tillförliteligaste experimenter; så att inga andra än de af observations-omständigheterna directe beroende  $b$ ,  $b'$ ,  $b''$ ,  $s$ ,  $s'$ ,  $s''$ ,  $g$ ,  $g'$ ,  $g''$ ,  $t$ ,  $t'$ ,  $t''$ ,  $h$  och  $\lambda$  måtte förblifva odeterminerade

\*) Då luftens tryckning, temperatur och vattenhalt äro oupp-  
hörliga variationer underkastade, borde rätteligen alla quanti-  
teterne  $b$ ,  $b'$ ,  $b''$ ,  $s$ ,  $s'$ ,  $s''$ ,  $g$ ,  $g'$ ,  $g''$ ,  $t$ ,  $t'$ ,  $t''$  i ett och  
samma tidsmoment determineras; hvilket likväl svårigen låter  
sig göra. Det här af uppkommande fel kan likväl täm-  
meligen afhjelpas, om vi ponera, att, vid understa station,  
uti tidsmomenterna  $T_1$  och  $T_2$ , observeras  $b_1$ ,  $s_1$ ,  $g_1$ ,  $t_1$   
och  $b_2$ ,  $s_2$ ,  $g_2$ ,  $t_2$ ; vid mellanstation, uti momenterna  $T_1''$   
och  $T_2''$ , observeras  $b_1''$ ,  $s_1''$ ,  $g_1''$ ,  $t_1''$  och  $b_2''$ ,  $s_2''$ ,  $g_2''$ ,  $t_2''$ ;  
och ändteligen, vid öfversta station, i momentet  $T'$ , ob-  
serveras  $b'$ ,  $s'$ ,  $g'$ ,  $t'$ ; samt sedan hvar och en utaf de sökta  
 $b$ ,  $s$ ,  $g$ ,  $t$ ,  $b''$ ,  $s''$ ,  $g''$ ,  $t''$  (som äga rum uti momentet  $T'$ )  
antages af formen  $A+BT'$ . Ty härigenom erhållas lätt

$$b = \frac{b_1 T_2 - b_2 T_1 + (b_2 - b_1) T'}{T_2 - T_1}, \quad s = \frac{s_1 T_2 - s_2 T_1 + (s_2 - s_1) T'}{T_2 - T_1},$$

&c., hvilka värden, jämte de directe observerade  $b'$ ,  $s'$ ,  $g'$ ,  
 $t'$ , i calculen böra nyttjas.

Hvad således, framföre alt, sjelfva formelns coëfficient  $\left(\frac{\Delta \pi \varrho}{\delta}\right)$  vidkommer, som hos Auctorerne på flere olika sätt blifvit bestämd, så synes den samma här ej vara någon slags tvetydighet underkastad. Enligt de noggrannaste försök öfver qvicksilfrets och torra atmospheriska luftens relativa tåthet, anställda ej mycket långesedan af de Franska physici BIOT och ARAGO, är det nemligen afgjort, att, då man antager:

$$\lambda_1 = 45^\circ, h_1 = 0, \vartheta = 0, \pi = 0^m, 76, \gamma = 0,$$

beginnes: 
$$\frac{\Delta}{\varrho} = 10466,8;$$

hvarigenom således erhålles 
$$\frac{\Delta \pi \varrho}{\delta} = 18316^m, 5.$$

I afseende på vattengasens tåthet följte vi GAY-LUSSACS nyaste försök, som tyckas vara de pålitligaste, och gifva  $q = \frac{1}{3}$ ; hvaraf alltså  $r = 1 - q = \frac{2}{3}$ .

Hvad åter luftens och qvicksilfrets utvidgningar af värmets beträffar, bör det framföre alt märkas, att vi i det följande alltid ha afseende på en *Centesimal-Thermometer*, hvars kokpunkt är bestämd för normal-tryckningen  $0^m, 76$  (då qvicksilfrets i Barometern temperatur föga skiljer sig ifrån medelvärdet  $+10^\circ$ , C.). Vi hafva då, enligt flere noggranna försök af GAY-LUSSAC,

$$m = 0,00375;$$

och, enligt LAVOISIER och LAPLACE,

$$v = \frac{1}{5412} :$$

hvilka värden numera nästan allmänt af physici äro antagne. Om kvantiteterna  $l, l', l''$  kan i allmänhet ingenting bestämmas, så vida Barometer-skalor af flere olika slags ämnen plåga förfärdigas;



hvarföre de här af beroende termer uti allmänna formeln äfven kunna uielemnas. Nyttjas likväl blott *en enda* Barometer med lång messingsskala, som ofta sker, så kan det märkas, att  $\theta = \theta' = \theta''$ , och  $l = l' = l'' = 0,00001878$ .

Quantiteten  $\frac{\Pi - e}{\Pi + e}$  erhålles bäst genom den bekanta æquation:

$$\frac{\Pi - e}{e} = 0,00865 - e.$$

der  $e$  utmärker jordmeridianens ellipticitet. Då flere skål tyckas föranleda antagande af  $e = \frac{1}{36}$ , något nära, följer här af genast:

$$\frac{\Pi - e}{\Pi + e} = \frac{\frac{\Pi - e}{e}}{\frac{\Pi - e}{e} + 2} = \frac{0,00865 - e}{0,00865 - e + 2} = 0,002678.$$

Sluteligen märkes, att storheten  $a$  utan fel kan antagas vara radien till en cirkel, hvars peripheri är  $40000000^m$ ; hvaraf fås:

$$a = 6366198^m.$$

Insätt nu de transformerade värden  $\frac{\Phi}{f}, p, p', p''$ , jämte alla nyss anförda numervärden, uti expression (6), så erhålles, med försummande af alla termer af andra ordningen, der  $\frac{\Pi - e}{\Pi + e}, \frac{t}{b}, \frac{t'}{b'}, \frac{t''}{b''}, \frac{\pi}{a}, v$ , &c., äro sinsemellan multiplicerade, detta sluteliga värde på  $h'$ , uttryckt i Franska metres (i hvilket mått höjden öfver hafsytan  $h$  äfven anses exprimerad):

$$h' = 18316,5. \left\{ L\left(\frac{b}{b'}\right) - 0,00008(r - r') \right\}.$$

$$(1 + 0,000000314h).(1 + 0,002678 \cos 2 \lambda).$$

$$\begin{aligned}
& \left( 1 + 0,001875 \cdot (g + g' + 100 \left( \frac{t}{b} + \frac{t'}{b'} \right) + K) \right. \\
& \quad \left. + 0,002499 \cdot (1 + 1,151 \cdot L \left( \frac{b}{b'} \right)) \right\} \\
& = 18362,3 \left\{ L \left( \frac{b}{b'} \right) - 0,00008 (s - s') \right\} \\
& (1 + 0,000000314h) \cdot (1 + 0,002678 \cdot \cos 2\lambda) \cdot \\
& (1 + 0,00187032 \cdot (g + g' + 100 \left( \frac{t}{b} + \frac{t'}{b'} \right) \\
& \quad + K + 1,5 \cdot L \left( \frac{b}{b'} \right)) \} \dots \dots \dots (7),
\end{aligned}$$

hvarst termen  $K$ , som uppkommer af värmens och fugtighetens aberrationer ifrån uniforma aftagningslagen, och hvilken, såsom vi sett, försvinner, då aftagandet verkligen sker i aritmetisk progression, till sitt värde determineras af æquationerne:

$$\begin{aligned}
& h'' = 18362,3 \cdot \left\{ L \left( \frac{b}{b''} \right) - 0,00008 (s - s'') \right\} \\
& (1 + 0,000000314h) \cdot (1 + 0,002678 \cdot \cos 2\lambda) \cdot \\
& (1 + 0,00187032 \cdot (g + g'' + \\
& \quad 100 \left( \frac{t}{b} + \frac{t''}{b''} \right) + 1,5 \cdot L \left( \frac{b}{b''} \right)) \} \cdot
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& K = \left\{ \frac{18316,5 L \left( \frac{b}{b'} \right)}{3h'' \left( 18316,5 L \left( \frac{b}{b'} \right) - h'' \right)} \right\} \times \\
& \left\{ \begin{aligned} & h'' \left( g - g' + 100 \left( \frac{t}{b} - \frac{t'}{b'} \right) \right) \\ & - 18316,5 L \left( \frac{b}{b'} \right) \left( g - g'' + 100 \left( \frac{t}{b} - \frac{t''}{b''} \right) \right) \end{aligned} \right\}
\end{aligned}$$

De uti formeln (7) förekommande storheterne  $t$ ,  $t'$ ,  $t''$ , eller vattengasens tensioner vid de tre observations-punkterne, böra rätteligen, genom hygrometriska rön, för hvarje särskildt fall determineras. Visserligen bör det medgifvas, att oss ännu felas ett på en gång bekvämt och noggrant förfarande, att härutinnan uppfylla theoriens fordringar, så vida de vanliga så kallade Hygrometrar, som bero af fugtighetens verkan på en organisk kropp, af afdunstnings-kölden, o. s. v., onekeligen äro högst osäkra instrumenter, och deremot DALTONS bekanta procedure, som stöder sig på säkrare grunder, utan tvifvel är för vidlöftig och besvärlig, att ofta på resor kunna företagas. Då man emedlertid ej bör misströsta, att någon gång på ett eller annat sätt kunna afhjelpa DALTONSka methodens svårigheter i utförandet (hvaritill redan en god början tyckes vara gjord af Herr BERZELIUS och SOLDNER, den förre uti *Afhandlingar i Fysik*, *Öf. 2 Delen p. 35*, den sednare i *Gilberts Annalen B. 32, p. 219*). hvilken method i det hela synes böra föredragas framföre alla öfriga, så kan man hoppas att så se de af fugtigheten beroende termer, som för öfrigt så enkelt ingå uti vår formel, framdeles ganska brukbara; hvarföre de samma i det afseendet ingalunda böra anses öfverflödiga. Men, vare äfven härmed huru det vill, så göra dessa termer äfven för närvarande, och utan afseende på möjligheten af hygrometriska förfaranden oss så mycket gagn, att deras theoretiska deduction aldeles icke bordt försummas: de tjena nemligen mycket väl till besvarande af de tvenne väsentliga frågorne, huru fugtighetens inslytelse bäst bör intagas i räkningen, när intet direct hygrometriskt förfarande vid högbestämningar blifvit nyttjadt, samt huruvida ett sådant förfarande vid dessa bestämningar verkligen bör anses af nödvändighet.

Hvad första frågan angår, hvars noggranna utredande är så mycket nödigare, som ganska många barometriskas höjdmätningar hådanefters liksom hittills, torde förrättas utan undersökning af luftens fugtighet i observations-momentet, så synes bruket af de oftanämnda hygrometriska termerna här ganska naturligt framställa sig, ehuru väl, enligt hvad jag vet, ännu ingen Författare i närvarande afseende lärer använt dem. Då det nemligen är afgjort, att en qvantitet, som på intet annat vis är bestämd, än att den nödvändigt måste finnas emellan o och ett gifvet maximum, till *probablaste värde* ej kan hafva annat än *hälften* af detta maximum; så tyckes äfven intet tjemligare värde kunna antagas för vattengasens tensioner  $t, t', t''$ , då dessa ej genom directa försök blifvit gifna, än hälften af de till de motsvarande temperaturerne  $g, g', g''$  hörande maxima, hvilka genom de bekanta DALTONSka försöken äro fullkomligen determinerade. Vi skole följakteligen i det följande anse vattengasens elasticiteter vid de tre stationerne, då de ej directe blifvit observerade, såsom exprimerade genom halfva värdet på följande formel, som tåmmeligen nära uttrycker de DALTONSka försöken:

$$\psi = 0,76.10^6 A \cdot (100 - \gamma) + B \cdot (100 - \gamma)^2 + C \cdot (100 - \gamma)^3 \quad . \quad . \quad (8),$$

hvaräst

$A = -0,01537279, B = -0,0000673199, C = +0,00000003374$ , och  $\psi$  nemligen utmärker vattengasens elasticitet in maximo för temperaturen  $\gamma$ , uttryckt med en Barometerhöjd i Franska metres (der qvicksilfrets temperatur och tyngdkraften, som här ej äro specificerade, icke heller så noga behöfva vara det, då inflytandet af deras variationer här faller inom felen af de försök, hvarpå formeln är



grundad \*). Säsom likväl denna formel vore mycket för vidlöftig, att i hvarje särskildt fall tillgå, är det tjenligt att deröfver hafva en liten tabell uträknad för de i luften vanliga temperaturer, hvar igenom vår method att corrigera fugtighetens inflytande blir ganska lätt applicerad. En sådan tabell förekommer i det följande. Det oaktadt kan det väl ej nekas, att närvarande sätt att intaga luftens medelfugtighet är mindre vigt i räkningen, än det, som användes i Laplaciska formeln, der luftens utvidgnings-index ifrån 0,00375 endast förändras till 0,004: men, då den nu anförda methoden, såsom stödjande sig på strånga theoretiska grunder, visserligen tyckes vara noggrannare, så lärer calculens något större längd härigenom kunna anses ersatt \*\*).

Låtom oss nu något närmare undersöka beskaffenheten af de tvenne termer i formeln (7), som här i synnerhet böra fåsta vår uppmärksamhet; jag menar den af fugtigheten beroende: 0,187032.

$\left(\frac{t}{b} + \frac{t'}{b'}\right)$ , samt den af värmens och fugtighetens ofvannämnda aberrationer uppkommande: 0,00187032.  
K. Hvad den förra vidkommer, hvars betraktande vid särskilda temperaturer bäst upplyser huruvida verkliga hygrometriska rön här äro nödvändiga,

\*) Se: *Traité de Physique Expérimentale et Mathématique*, par J. B. Biot, Paris 1816, T. 1, p. 277.

\*\*) Emot probabiliteten af den här förkommande bestämning af luftens medelfugtighet, bör ej invändas, att locala omständigheter, samt väderlekens förhållanden under särskilda tider på samma ställe, ibland ryckas göra denna bestämning sannolikt för stor, och ibland för liten. Just dessa olika omständigheter, som alla, äro lika möjliga, kunna vid en *fullkomligt allmän* determination af medelfugtigheten, ej annat än leda till den method vi föreslagit. Detta hindrar likväl icke, att man i några speciella fall, då tillförlitliga kännemärken gifva vid handen att medelfugtigheten i den allmänna meningen vore för stor eller för liten, något kunde modifiera dess värde.

så inses lätt, att dess inflytande på calculens resultat, uttryckt uti delar af höjden  $h'$ , temmeligen noga exprimeras genom formeln:

$$\frac{0,187032 \cdot \left( \frac{t}{b} + \frac{t'}{b'} \right)}{1 + 0,00187032 \cdot (g + g')}$$

Till denna expressions undersökande, antag den speciella händelsen, att  $\frac{t'}{b'} = \frac{t}{b}$ ,  $g = g'$ , som äger rum när  $h'$  är mycket liten, men kan anses tillräcklig till närvarande frågas utredande (ty, om åfven, för större värden af  $h'$ , quantiteten  $\frac{t}{b}$  skulle

något förminskas i jämförelse med  $\frac{t}{b}$ , så aftager åfven på samma gång  $g'$  i jämförelse med  $g$ ); och antag ännu vidare  $b$  så stor som möjligt, eller  $\approx 0^m,76$ , hvarigenom verkan af närvarande correction naturligtvis förminskas. Den anförda storheten förvandlas derigenom till:

$$\zeta = \frac{0,49219t}{1 + 0,00374064g},$$

$$= \frac{0,187032 \cdot 10 \cdot A(100-g) + B(100-g)^2 + (C100-g)^3}{1 + 0,000374064g},$$

då neml.  $t$  antages vara hälften af det emot  $g$  svarande maximum. Betrakte vi några speciella fall af denna formel, så erhållas följande värden:

$$g = 20, \quad 10, \quad 0, \quad 10, \quad 20, \quad 30, \quad 40,$$

$$\zeta = \frac{1}{2820}, \quad \frac{1}{1487}, \quad \frac{1}{803}, \quad \frac{1}{445}, \quad \frac{1}{252}, \quad \frac{1}{147}, \quad \frac{1}{88},$$

hvilka, såsom utvisande medelfugthetens inflytelse på

på höjdmättnings-resultaterne vid särskilda temperaturer, redan mycket väl räcka till besvarande af frågan om hygrometers nödvändighet vid dessa operationer. Då nemligen de anförda värden på utmärka de gränser, inom hvilka, oaktadt den accurataste räkning, höjden nödvändigt måste vara osäker, så snart fugtigheten i observations-momentet ej directe blifvit undersökt, så tyckes visserligen följa, att, vid noggranna operationer, hygrometriska försök alldeles icke blifva öfverflödiga när observations-temperaturerne äro något betydligare, t. ex. omkring  $20^{\circ}$ , C, eller derutöfver. Correctionen för latitudens verkan till exempel, som sällan öfversiger  $\frac{1}{350}$  af höjden, försummas vid accurata beräkningar aldrig.

I sammanhang med det nu anförda, torde ej vara ur vägen att något vidröra den reduction till medelfugtighet, som i den allmänt nytijade Laplasciska formeln förekommer. Då, såsom bekant är, uti denna formel, quantiteten  $0,001875 \cdot (g+g')$  förvandlas till  $0,002 \cdot (g+g')$ , i anseende till fugtighetens inflytande, så inses, att

$$\frac{0,000125(g+g')}{1+0,001875(g+g')}$$

här är verkan af denna correction uti delar af höjden. Ponera, såsom i det föregående,  $g=g'$ , så erhålles:

$$\eta = \frac{0,00025g}{1+0,00375g};$$

en expression, som ger de speciella resultaterne:

$$g = 20, \quad -10, \quad 0, \quad 10, \quad 20, \quad 30, \quad 40,$$

$$\eta = \frac{1}{185}, \quad -\frac{1}{385}, \quad 0, \quad \frac{1}{415}, \quad \frac{1}{215}, \quad \frac{1}{148}, \quad \frac{1}{115};$$

hvilka, jämförda med de på § nyligen uppgifna, utvisa, att, för temperaturer öfver  $0^\circ$ , är den Laplaciska correctionen i det hela tjenlig; men, för temperaturer under  $0$ , bör den med rätta ej användas.

Sedan fugtighetens verkan på föregående sätt nägorlunda blifvit bestämd, återstår att betrakta den omnämnda termen  $0,00187032K$ . Till kännedom af dess verkliga betydelse, observera vi, att  $18316,5 \cdot L\left(\frac{b}{b'}\right)$ , såsom aldrig skiljande sig mycket ifrån höjden  $h'$ , här utan synnerligt fel kan antagas  $= h'$ ; hvarigenom vi få:

$$K = \frac{N' \left( N'' (g - g' + 100 \left( \frac{t}{b} - \frac{t'}{b'} \right)) - N' (g - g'' + 100 \left( \frac{t}{b} - \frac{t''}{b''} \right)) \right)}{3N''(N' - N'')}$$

$$= \frac{N'}{3} \left( \frac{g'' - g'}{N' - N''} - \frac{g - g''}{N''} + 100 \left( \frac{t'' - t'}{N' - N''} - \frac{t}{N''} - \frac{t''}{N'} \right) \right).$$

Såsom det nu lätt synes, att  $\frac{N''}{g - g'}$ ,  $\frac{h' - h''}{g'' - g'}$  och  $\frac{h''}{\frac{t}{b} - \frac{t''}{b''}}$ ,  $\frac{h' - h''}{\frac{t''}{b''} - \frac{t'}{b'}}$  utmärka de höjder, uppå hvilka

$g$  och  $\frac{t}{b}$ , med medelföränderlighet, förminskas med jämt en enhet, emellan understa punkten och mellanstation, samt medlersta och öfversta observationspunkterna, så benämnom dessa fyra quantiteter med  $x_1$ ,  $x_2$  och  $\mu_1$ ,  $\mu_2$  respective; då vi alltså hafva:

$$K = \frac{N'}{3} \left( \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} + 100 \left( \frac{1}{\mu_2} - \frac{1}{\mu_1} \right) \right);$$



genom hvilken form rätta meningen af aberrations-  
 quantiteten  $K$  är fullkomligt gifven, så vida vi  
 se, huru enkelt den beror af  $\kappa_1$ ,  $\kappa_2$  och  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ . Ge-  
 nom hvars olikhet sins emellan denna storhet just  
 äger sin första existens. Det första resultatet vi  
 häraf drage, och som följer af tecknet för  $K$ , är,  
 att om värmen och fugtigheten, i observations-  
 momentet, aftaga *hastigare* omkring öfversta station  
 än omkring den understa, så ge de vanliga hyp-  
 sometriska formler, der aftagandet anses uniformt,  
 höjderne *mindre* än de äro; men, sker aftagandet tvert-  
 om *långsammare* uppe än nere, så gifva de vanliga  
 formlerne höjderne *större* än de böra vara. Hvad  
 för öfrigt sjelfva beskaffenheten af i fråga varande  
 correction beträffar, så synes, att dess inflytande,  
 i delar utaf höjden, uttryckes genom bråket.

$$\frac{0,00187032 \cdot \frac{h'}{3} \left( \frac{1}{\kappa_2} - \frac{1}{\kappa_1} + 100 \left( \frac{1}{\mu_2} - \frac{1}{\mu_1} \right) \right)}{1 + 0,00187032 \cdot (g + g')}$$

hvars värde i stark proportion ökas med höjden  $h'$ .

Vore t. ex.  $g + g' = 0$ ,  $\frac{1}{\mu_2} - \frac{1}{\mu_1} = 0$ ,  $h' = 4000^m$ ,  $\kappa_1 =$   
 $200^m$ ,  $\kappa_2 = 120^m$ , hvilka värden i något specielt  
 fall visserligen torde kunna åga rum; så förvand-  
 las det anförda uttrycket till

$$\frac{1}{120};$$

hvilket särskilda exempel sedan sätter oss i stånd  
 att dömma, det den oftanämnda termen  $K$ , då höj-  
 derne äro något större, och noggranhet fordras, icke  
 bör försummas, eller att man i det fallet, om möj-  
 ligt är, ej bör uraklåta samtida observationer uti  
 3:ne särskilda punkter af verticalen.

Till slut skole vi meddela följande små Tabeller, som icke litet lätta accurate uträkningen af hufvudformeln (7), och äro lika lätt applicerade, antingen hygrometer-observationer i sjelfva verket blifvit förrättade, eller icke.

Tab. I.		D.	Tab. II.		D.	Tab. III.		D.	Tab. IV.		D.
$\alpha_1$	$\beta_1$		$\alpha_2$	$\beta_2$		$\alpha_3$	$\beta_3$		$\alpha_4$	$\beta_4$	
-20	17	+0.6	-80	4.19554	+95.0	-25	4.24313	84.8	5	114	1.0
-10	13	1.2	-75	4.19829	94.0	-20	4.24737	84.0	10	119	1.8
0	25	2.0	-70	4.20299	92.8	-15	4.25157	83.2	15	100	2.2
5	35	2.4	-65	4.20763	92.0	-10	4.25573	82.4	20	89	2.8
10	47	3.4	-60	4.21223	91.0	5	4.25985	81.6	25	75	3.4
15	64	4.6	-55	4.21678	90.2	0	4.26393	80.8	30	58	3.6
20	87	5.6	-50	4.22129	89.2	5	4.26797	80.2	35	40	4.0
25	115	7.6	-45	4.22575	88.2	10	4.27198	79.2	40	20	4.6
30	153	9.8	-40	4.23016	87.4	15	4.27594	78.8	45	0	4.0
35	202	12.6	-35	4.23453	86.4	20	4.27988	77.8	50	-20	4.0
40	265	15.8	-30	4.23885	85.6	25	4.28377	77.4	55	-40	3.6
45	344					30	4.28764	76.6	60	-58	3.4
						35	4.29147	75.8	65	-75	2.8
						40	4.29526	75.2	70	-89	2.2
						45	4.29902	74.6	75	-100	1.8
						50	4.30275	74.0	80	-109	1.0
						55	4.30645	73.4	85	-114	0.4
						60	4.31012	72.6	90	-116	
						65	4.31375	72.2			
						70	4.31736	71.6			
						75	4.32094	70.8			
						80	4.32448	70.4			
						85	4.32800	69.8			
						90	4.33149	69.4			
						95	4.33496	68.6			
						100	4.33839				

Betydelsen af hvar och en utaf dem (uti hvilka, till interpolations lättande, differencerne för hvarje enhet af argumenterne äro införde) inses af æquationerne:

$$\alpha_1 = g = g'$$

$$\alpha_2 = g + g' + 100 \left( \frac{t}{b} + \frac{t'}{b'} \right) + K + 1.5 \cdot L \left( \frac{b}{b'} \right),$$

$$\alpha_3 = \lambda$$

$$\alpha_1 = h^*), \quad \beta_1 = 100000 = 100000 = 10000 \cdot \frac{1}{5} \Psi,$$

$$\beta_2 = L \cdot \left\{ 18362,3 \left( 1 + 0,00187032 (g + g' + 100 \left( \frac{b}{b'} + \frac{b'}{b} \right) + K + 1,5 \cdot L \left( \frac{b}{b'} \right) \right) \right\},$$

$$\beta_3 = 100000 \cdot L \cdot (1 + 0,002678 \cdot \cos 2\lambda),$$

$$\beta_4 = 100000 \cdot L \cdot (1 + 0,000000314h).$$

Deras bruk är utan vidare upplysning tydligt af följande arbitrairt valda exempel, der calculen i all sin vidd är utförd.

$$\begin{aligned} b &= 0^m, 74, & b' &= 0^m, 49, & b'' &= 0^m, 58, \\ s &= 21^\circ, & s' &= 0^\circ, 2, & s'' &= 11^\circ, 9, \\ g &= 19^\circ, & g' &= 1^\circ, 1, & g'' &= 11^\circ, \\ \lambda &= 35^\circ 7', & h &= 35^m. \end{aligned}$$

$$T.I. Arg. g = 82, \quad Arg. g'' = 50, \quad Arg. g' = 27$$

$$19 + \frac{3}{4} = 20,1 \quad 1,1 + \frac{3}{4} = 1,7$$

$$11 + \frac{3}{4} = 11,9 \quad 1,1 + \frac{3}{4} = 1,7$$

$$\gamma_1 = 32,0 \quad \delta_1 = 21,3$$

$$\gamma_2 = 8,2 \quad \delta_2 = 18,4$$

$$L.b - L.b' = 0,10530 \quad L.b - L.b'' = 0,17903$$

$$4(s - s') = 73 \quad 8(s - s'') = 166$$

$$\gamma_3 = 0,10507 \quad \delta_3 = 0,17737$$

$$L.\gamma_3 + T.II.A.\gamma_1 = 3,31065 \quad L.\delta_3 + T.II.A.(\delta_1 + \gamma_3) = 3,53420$$

$$T.II.A.\lambda + T.IV.A.h = -15 \quad L.h' = 3,31050 \quad L.h'' = 3,53405$$

$$L.\delta_3 + L.18316,5 = 3,51172 \quad h' = 342^m.$$

$$\gamma_4 = 1,59 = 0,20123$$

$$\gamma_6 = \frac{\gamma_4 \cdot (\delta_2 - \gamma_2 \gamma_4)}{3(\gamma_4 - 1)} = 4,9$$

$$1,5 L \left( \frac{b}{b'} \right) = 0,3$$

$$\gamma_6 = 5,2$$

\*) Understa stations höjd öfver hafsytan  $h$ , som är argument till Tab. IV, behöfver vanligt blott ungefärligen värderas.

Såsom af detta exempel synes, blir räkningen mer än hälften kortare, då värmeförändringens beskaffenhet genom observationer vid en medelstation ej blifvit utrönd. Af detta enkla slag äro, enligt det jag vet, alla hitintills anställda barometrisk höjdmätningar; hvilkas beräkning således med all möjlig theoretisk noggrannhet genom en högst enkel calcul kan förrättas. En omständlig undersökning öfver de resultater föregående Tabeller gifva för sådane höjder, som hitintills både barometrice och trigonometrice hunnit blifva afmätta, ligger utom vår närvarande plan, enligt hvilken vi endast efter förmåga sökt utreda, huru långt teorien möjligtvis kan leda oss, i den supposition, att observations-punkterne ligga i samma vertical, observationerne ske i samma tidsmoment, samt luften är i fullkomlig jämvigt. Af det föregående är ock tydligt, att dessa Tabellers resultater, för alla hitintills gjorda höjdbestämnningar aldrig kunna betydligt skilja sig ifrån dem Laplaciska formeln gifver; hvarföre vidlöfthet här så mycket mindre behöfves. På det likväl icke alla uppgifter i närvarande hänseende måtte saknas, skole vi betrakta en och annan af de observationer D'AUBUISSON i October månad 1809 anställte i *Monte Gregorio*, och hvilka både i barometriskt och trigonometriskt afseende tyckas förtjena förtroende (Se *Gilb. Annalen*, B. 39, p. 455, 456). Trigonometriska mätningen gaf höjden = 1708<sup>m</sup>.4; några resultater af den barometriskas innefattas i följande Tabell, der *b*, *b'* räknas i Franska tum.

Är densamma likväl något större, och alla andra data felaktiga kan den till erforderlig noggrannhet erhållas af formeln:

$$h = 18362.3 \cdot (\bar{T} \cdot 88150 - L \cdot b) \cdot (1 + 0.18(\bar{T} \cdot 88150 - L \cdot b)) \cdot (1 + 0.003748)$$

som förutsätter medelbarometerhöjden vid hafsytan = 761.2 (rätteligen vid 0°), samt att värmeförändringen i verticalen sker uniformt med 1° C. på 190<sup>m</sup>.



$b$	$s$	$g$	$b'$	$s'$	$g'$	Enligt föreg. Tabb.	Enligt Laplac. formel.
27,512	16,1	15,5	22,395	4,1	2,2	1712	1714
27,494	18,7	18,4	22,326	5,9	3,2	1713	1715
27,418	19,9	20,0	22,351	10,5	9,9	1712	1715
27,842	18,4	17,9	22,719	12,9	12,5	1711	1714
27,388	13,6	13,2	22,188	2,4	1,7	1713	1715
						1712,2	1714,6

Skillnaderne emellan barometrisk och trigonometrisk mätningarne äro, som vi se, här ej större, än att de af det stora antal omständigheter, som här äga inflytande, lätt kunna förklaras.

# OM NUMERTALENS BETECKNING

med Zifferor;

af

BERNH. BERNDTSON.

**D**e successiva variationer, som vissa olika föremål  $a, b, c$ . &c., genom enkla föreställningar af hvar föremål särskildt och derefter följande alla möjliga två- tre- fyra-lediga &c. combinationer af föremålen, kunna åstadkomma, uppfattas sålunda, att: 1:o föremålen ställas i en bestämd ordning, hvar och ett särskildt, hvarigenom alla enkla variationer erhållas; 2:o hvar och ett föremål, särskildt i den bestämda ordningen, ställes framför alla föremålen i samma ordning efter hvarandra tagna, hvarigenom alla tvålediga combinationer erhållas; 3:o hvar och ett föremål särskildt ställes framför alla tvålediga combinationer, hvarigenom alla trelediga combinationer erhållas, o. s. v.

Dessa variationer, som alltså planmässigt oöpphörigen fortgå, antagas att föreställa den oändliga följderna af de hela numertalen ifrån och med enheten i deras naturliga ordning; hvadan, under förutsättning att  $x$  är föremålens antal, de efter berörda grunder här nedan utsatta föremålens variationer blifva liknade vid numertalen, konstruerade (betecknade) på följande sätt:

$$a=1, aa=1x+1, aaa=1xx+1x+1, \&c, \&c. \&c.$$

$$b=2, ab=1x+2, aab=1xx+1x+2, \&c.$$

$$c=3, ac=1x+3, aac=1xx+1x+3,$$

$$\&c. \quad \&c. \quad \&c.$$

$$ba=2x+1, aba=1xx+2x+1,$$

$$bb=2x+2, abb=1xx+2x+2,$$

$$bc=2x+3, abc=1xx+2x+3,$$

$$\&c. \quad \&c.$$

$$ca=3x+1, aca=1xx+3x+1,$$

$$cb=3x+2, acb=1xx+3x+2,$$

$$cc=3x+3, acc=1xx+3x+3,$$

$$\&c. \quad \&c.$$

$$baa=2xx+1x+1,$$

$$bab=2xx+1x+2,$$

$$bac=2xx+1x+3,$$

$$\&c.$$

$$bba=2xx+2x+1,$$

$$bbb=2xx+2x+2,$$

$$bbc=2xx+2x+3,$$

$$\&c.$$

$$bca=2xx+3x+1,$$

$$bcb=2xx+3x+2,$$

$$bcc=2xx+3x+3,$$

$$\&c.$$

$$caa=3xx+1x+1,$$

$$cab=3xx+1x+2,$$

$$cac=3xx+1x+3,$$

$$\&c.$$

$$cba=3xx+2x+1,$$

$$cbb=3xx+2x+2,$$

$$cbc=3xx+2x+3,$$

$$\&c.$$

$$cca=3xx+3x+1,$$

$$ccb=3xx+3x+2,$$

$$ccc=3xx+3x+3,$$

$$\&c.$$

Föremålens enkla variationer  $a, b, c$  &c. äro liknade vid särskilda tecken (zifferor) 1, 2, 3 &c., som beteckna (construera) första numeralen ifrån och med enheten i ordning och kunna anses vara multiplicerade med  $\frac{x}{x}$  eller enheten, hvarefter de två, tre, fyra-lediga &c. combinationerne äro liknade vid algebraiska expressioner, på grund af villkoren för combinationernes fortsatta tillvarelse, formerade med tillhjälp af nämnda zifferor och successivt ökade dimensioner af  $x$ , hvilka expressioner alltså för hvarje combination determinera variationernas hela belopp ifrån början, samt i och med det samma beteckna (construera) det tal, som combinationen förespäller.

Vidare finnes, att termernas antal uti de construerade talen är lika med föremålens antal inom respective variationer, och att de Zifferor, hvarmed föremålen uti enkla variationerna blifvit utmärkta, sedermera uti expressionerne af numeral, som tillhöra föremålens två, tre, fyra-lediga &c. combinationer, förekomma i egenskap af coëfficienter till de termer, hvilka i ordning motsvara föremål af coëfficienternes Ziffer-värden inom combinationerna. Således till exempel är: uti  $ba = 2x + 1$ , termernes  $2x$  och  $1$  antal lika med föremålens  $b$  och  $a$ , hvarjemte  $2$  motsvarar  $b$  och  $1$  motsvarar  $a$ ; och uti  $cab = 3xx + 1x + 2$ , termernes  $3xx$ ,  $1x$  och  $2$  antal lika med föremålens  $c$ ,  $a$  och  $b$ , hvarjemte  $3$  motsvarar  $c$ ,  $1$  motsvarar  $a$  och  $2$  motsvarar  $b$ . Med anledning häraf, och som utaf beskaffenheten af numeralens construerade expressioner äfven inhemtas, att första termen från höger till venster utgöres af coëfficienten multiplicerad med enheten; andra termen från höger till venster, af coëfficienten multiplicerad med föremålens antal; tredje termen



från höger till venster, af coefficienten multiplicerad med quadraten af föremålens antal &c.; så, för att, i afseende på ytre formen, ännu mera närma numertalens expressioner genom construction till talens expressioner genom variation, tilläggas nu coefficienterne till termerna i de förstnämnda expressionerne förmåga att ensamme representera hela termerna, derigenom att coefficienten till första termen från höger till venster beräknas vara multiplicerad med enheten, coefficienten till andra termen med föremålens eller (hvilket är detsamma) ziffrornes hela antal, coefficienten till tredje termen med quadraten af ziffrornes antal, och så vidare.

Och alldenstund algebraiska tecknet  $+$ , hvilket utmärker tillgörande addition utaf termerna uti sådana construerade numertal, som motsvara två- tre- fyra-lediga &c. combinationer af föremålen, icke eller för expressionernes tydlighet, nu mera blifvet nödigt att utsätta; fördenskull, med utelämnande deraf, bestämmes sluteligen, att samtliga termerna, ställda invid hvarandra och endast bestående af Ziffror, som efter redan stadgade grundtermerna representera, skola tillsammans adderas, hvarigenom numertalens alla expressioner, construerade med Ziffror, erhålla fullkomligt lika form med nummer-talens expressioner föreställda medelst successiva enkla, två- tre- fyra-lediga &c. variationer af föremål, till antal lika med Ziffrornes.

Om ett föremål  $a$  nyttjas till variationernes uppställning, erhållas för de construerade numertalen alltså följande expressioner:

$I$  = enheten,  $II$  = två,  $III$  = tre,  $IIII$  = fyra &c. &c.

Om två föremål  $a$  och  $b$  begagnas för variationerne, erhållas för de construerade talen nedan utsatta expressioner:

1 = enheten, 11 = tre, 111 = sju,	1111 = femton, &c. &c.
2 = två, 12 = fyra, 112 = åtta,	1112 = sexton,
21 = fem, 121 = nio,	1121 = sjutton,
22 = sex, 122 = tio,	1122 = aderton,
211 = elfva,	1211 = nitton,
212 = tolf,	1212 = tjugu,
221 = tretton,	1221 = tjuguen,
222 = fjorton,	1222 = tjugatvå,
	2111 = tjugutre,
	2112 = tjugufyra,
	2121 = tjugufem,
	2122 = tjugusex,
	2211 = tjugusju,
	2212 = tjuguåtta,
	2221 = tjugunio,
	2222 = trettio,

och så vidare.

Vid verkställande af arithmetiska operationer med efter denna method construerade numertal iaktages, att något resultat, som uppkommer genom lika storheters dragande från hvarandra, och således, enär enheten kan föreställa allt slags storhet, äfven utgör en progressionen af hela numertalen i deras naturliga ordning tillhörande, enheten nästföregående term, hvarken kan eller bör med särskildt tecken eller ziffra utmärkas, emedan vid talens construerande något tecken för detta resultat icke kommit i fråga.

Om man åter vill konstruera numertalen tillika med den enheten nästföregående term af dessa tal, betraktade såsom en arithmetik progression, hvilken har enheten till termernes gemensamma skillnad, så komma progressionens expressioner genom construction att motsvara dess expressioner genom variation på följande sätt, nemligen:

$$a=1-1=0, aa=0x+0, aaa=0xx+0x+0, \&c. \&c.$$

$$b=2-1=1, ab=0x+1, aab=0xx+0x+1, \&c.$$

$$c=3-1=2, ac=0x+2, aac=0xx+0x+2, \&c.$$

$$\&c. \quad \&c. \quad \&c.$$

$$ba=1x+0, aba=0xx+1x+0,$$

$$bb=1x+1, abb=0xx+1x+1,$$

$$bc=1x+2, abc=0xx+1x+2,$$

$$\&c. \quad \&c.$$

$$ca=2x+0, caa=0xx+2x+0,$$

$$cb=2x+1, acb=0xx+2x+1,$$

$$cc=2x+2, att=0xx+2x+2,$$

$$\&c. \quad \&c.$$

$$baa=1xx+0x+0,$$

$$bab=1xx+0x+1,$$

$$bac=1xx+0x+2,$$

$$\&c.$$

$$bba=1xx+1x+0,$$

$$bbb=1xx+1x+1,$$

$$bbc=1xx+1x+2,$$

$$\&c.$$

$$bca=1xx+2x+0,$$

$$bcb=1xx+2x+1,$$

$$bcc=1xx+2x+2,$$

$$\&c.$$

$$caa=2xx+0x+0,$$

$$cab=2xx+0x+1,$$

$$cac=2xx+0x+2,$$

$$\&c.$$

$$cba=2xx+1x+0,$$

$$cbb=2xx+1x+1,$$

$$cbc=2xx+1x+2,$$

$$\&c.$$

$$cca=2xx+2x+0,$$

$$ccb=2xx+2x+1,$$

$$ccc=2xx+2x+2,$$

$$\&c.$$

Uppställningen visar, att den föremålet  $a$  motsvarande första construerade expressionen  $0$  (noll-ziffran) sedermera ingår såsom coefficient uti de med flera termer construerade expressioner af progressionen, hvilka motsvara två- tre- fyra-lediga &c. combinationer af  $a, b, c$  &c.; och emedan  $0$  är lika med  $1-1$ , ty bör dess egenskap af coefficient betraktas såsom blott anvisande rummen för termerna inom expressionerne genom construction, hvilka i behörig ordning motsvara föremålet  $a$  inom expressionerne genom variation, men hvarken i och för sig sjelf eller genom multiplication med hvad quantitet som helst ägande förmåga att öka eller minska beloppet af hvad construerade expressionernes öfriga termer utgöra; i följd hvaraf alla construerade expressioner, som med de föregående endast differera genom  $0$  multipliceradt med dimensioner af  $x$ , äro lika med hvarandra.

Och alldenstund, af flerlediga combinationer, de tvålediga, som börjas med  $a$ , till värdet således likna alla med en term förut construerade expressioner, innan progressionen ytterligare blifver fortsatt; de trelediga, som börjas med  $a$ , till värdet likna alla med en och två termer redan construerade expressioner, innan progressionen derefter ytterligare blifver fortsatt, o. s. v.; fördenskull utslutas de, med förestående af lika värden, utsatta senare expressioner genom så väl variation som construction, hvarmedelst för progressionens oafbrutna framställning nedanstående expressioner erhållas:



$$a=0, ba=1x+0, baa=1xx+0x+0, \&c. \&c.$$

$$b=1, bb=1x+1, bab=1xx+0x+1, \&c.$$

$$c=2, bc=1x+2, bac=1xx+0x+2, \&c.$$

$$\&c. \&c. \&c.$$

$$ea=2x+0, bba=1xx+1x+0,$$

$$eb=2x+1, bbb=1xx+1x+1,$$

$$ec=2x+2, bbc=1xx+1x+2,$$

$$\&c. \&c.$$

$$bca=1xx+2x+0,$$

$$bcb=1xx+2x+1,$$

$$bcc=1xx+2x+2,$$

$$\&c.$$

$$caa=2xx+0x+0,$$

$$cab=2xx+0x+1,$$

$$cat=2xx+0x+2,$$

$$\&c.$$

$$cba=2xx+1x+0,$$

$$cbb=2xx+1x+1,$$

$$cct=2xx+1x+2,$$

$$\&c.$$

$$cea=2xx+2x+0,$$

$$ceb=2xx+2x+1,$$

$$cet=2xx+2x+2,$$

$$\&c.$$

Genom enahanda observationer, som blifvise gjorda vid numertalens construction ifrån och med enheten, inhemtas nu, i afseende på constructionen af samma tal tillika med den dem, betraktade såsom en arithmetisk progression, näst föregående term 0, att expressionerne af progressionen genom construction, då de bringas till lika form med expressionerne deraf genom variation, blifva fullkomligt bestämda medelst invid hvarandra ställda nummer- och noll-ziffror, samt till sina värden utrönta derigenom att, uti hvarje expression, första ziffran från höger till vänster multipliceras med

enheten, andra ziffran från höger till venster med ziffrornes hela antal, tredje ziffran med quadra-  
ten af ziffrornes antal, fjärde ziffran med cuben  
deraf &c., och alla sålunda uppkomna producter,  
till utgörande af expressionens värde, tillsammans  
adderas.

Då ett föremål *a* antages för variationernes  
uppställning, erhålles blott en construerad expres-  
sion af progressionen, som är *o*.

Genom begagnande af två föremål *a* och *b*  
för variationerne, bekommas för progressionen föl-  
jande construerade expressioner:

$0 =$ noll,	$10 =$ två,	$100 =$ fyra,	$1000 =$ åtta, &c.
$1 =$ enheten,	$11 =$ tre,	$101 =$ fem,	$1001 =$ nio,
	$110 =$ sex,		$1010 =$ tio,
	$111 =$ sju,		$1011 =$ elfva,
			$1100 =$ tolf,
			$1101 =$ tretton,
			$1110 =$ fjorton,
			$1111 =$ femton,

Om tio föremål antagas för variationerne, så blifva  
de construerade expressionerne fullkomligt enliga  
med dem, Araberne för beteckningen af Nummer-  
talen anses hafva uppfunnit, och som för samma  
ändamål från medlet af tionde seculum i Europa  
 varit allmänt nyttjade; o. s. v.

För öfrigt, och såsom en följd af det före-  
gående anmärkes: att, då *m* är lika med *o* eller ett  
jäkadt nummertal, *n* lika med ett jäkadt num-  
mertal, *p* lika med *o* eller *n*, och *m, m+n, m+2n,*  
... *m+(x-1)n* samt *p, p+n, p+2n,*  
... *p+(x-1)n* äro tvänne arithmetiska  
progressioner, hvilkas särskilda termer, till antalet  
i hvardera progressionen lika med *x*, genom en  
ziffra betecknas, den förra af dessa progressioner  
kan

kan med samma en gång antagna zifferor oändli-  
gen fortsättas, enligt följande generela formel:

$m,$

$m+n$

$\frac{m+(x-1)n}{px+m},$

$px+m+n,$

$\frac{px+m+(x-1)n}{(p+n)x+m},$

$(p+n)x+m,$

$(p+n)x+m+n,$

$\frac{(p+n)x+m+(x-1)n}{(p+(x-1)n)x+m},$

$(p+(x-1)n)x+m,$

$(p+(x-1)n)x+m+n,$

$\frac{(p+(x-1)n)x+m+(x-1)n}{px^2+px+m},$

$px^2+px+m,$

$px^2+px+m+n,$

$\frac{px^2+px+m+(x-1)n}{px^2+(p+n)x+m},$

$px^2+(p+n)x+m,$

$px^2+(p+n)x+m+n,$

$\frac{px^2+(p+n)x+m+(x-1)n}{px^2+(p+(x-1)n)x+m},$

$px^2+(p+(x-1)n)x+m,$

$px^2+(p+(x-1)n)x+m+n,$

$$\frac{(px^2 + (p + (x-1)n)x + m + (x-1)n,}{$$

$$(p+n)x^2 + px + m,$$

$$(p+n)x^2 + px + m + n,$$

$$\frac{(p+n)x^2 + px + m + (x-1)n,}{$$

$$(p+n)x^2 + (p+n)x + m,$$

$$(p+n)x^2 + (p+n)x + m + n,$$

$$\frac{(p+n)x^2 + (p+n)x + m + (x-1)n,}{$$

$$\frac{(p+n)x^2 + (p + (x-1)n)x + m,}{$$

$$(p+n)x^2 + (p + (x-1)n)x + m + n,$$

$$\frac{(p+n)x^2 + (p + (x-1)n)x + m + (x-1)n,}{$$

$$(p + (x-1)n)x^2 + px + m,$$

$$(p + (x-1)n)x^2 + px + m + n,$$

$$\frac{(p + (x-1)n)x^2 + px + m + (x-1)n,}{$$

$$(p + (x-1)n)x^2 + (p+n)x + m,$$

$$(p + (x-1)n)x^2 + (p+n)x + m + n,$$

$$\frac{(p + (x-1)n)x^2 + (p+n)x + m + (x-1)n,}{$$

$$(p + (x-1)n)x^2 + (p + (x-1)n)x + m,$$

$$(p + (x-1)n)x^2 + (p + (x-1)n)x + m + n,$$

$$\frac{(p + (x-1)n)x^2 + (p + (x-1)n)x + m + (x-1)n,}{$$

&amp;c.

&amp;c.



jemte det denna formel meddelar de förut upptagne  
 genera methoderne att betekna numertalen, då  
 $m=1$ ,  $n=1$  och  $p=1$ , samt då  $m=0$ ,  $n=1$  och  
 $p=0$ , lemna densamma ytterligare tyenne genera-  
 la methoder för talens construction, då  $m=0$ ,  
 $n=1$  och  $p=1$ , samt då  $m=1$ ,  $n=1$  och  $p=0$ .

# SOL- och STJERN-FÖRMÖRKELSER, *iakttagne i Åbo;*

af

H. J. WALBECK,

Astron. Observ. vid Kejs. Åbo Univ.

*Solförmörkelsen den 5 Maji 1818.*

**D**etta phenomen observerades här förmänligare än det sednaste i November 1816, ehuru luften vid början ej var fullt klar. Under medlet och emot slutet voro omständigheterna så gynnande, att jag hittills sållan eller aldrig så skarpt sett solytans fläckar, facklor, corrugationer m. m. med den härvarande Dollondska  $3\frac{1}{2}$  fots Achromaten. Observationerne anställdes under Domkyrkans latitud, som jag af detta års sextant-observationer funnit  $= 60^{\circ}26'55''8$ , och i meridianen af det härstädes under byggnad varande Observatorium. Prof. och Ridd. HÅLLSTRÖM begagnade HERSCHELs 7 fots reflector, med 110 gång. förstoring. och Prof. AHLSTEDT en  $2\frac{1}{2}$  fots Tub af NEWMANN med 25 gång. förstoring.

*Medeltid:*

7'39'23'',7 såg Prof. HÅLLSTRÖM först månans inskärning i solen; verkliga immersionen hade således inträffat några sekunder förut.

7'39'33'',1 såg jag, med 73 g. förstoring, månen

redan hafva formerat en temligt stor chorda på solen: detta moment får således ingalunda antagas för sanna början. Vid slutet fann jag att samma chorda svarade mot  $13''{,}2$  i tid; hvilket således borde subtraheras ifrån det angifna momentet. Genom sedermera anställd räkning fann jag coëfficienten för  $\Delta g$  vid början och slutet 2,98 och 2,28, hvarigenom dessa  $13''{,}2$  förvandlas till  $17''{,}2$ , att således efter min observation och estime  $7^{\circ}39'15''{,}9$  sanna början inträffat.

Om det står fast, som LALANDE anför i sin *Astronomie* \*), att man ej kan se månen på solen förr än segmentets bredd är  $2''$ ; borde från Prof. HÅLLSTRÖMS uppgift subtraheras  $6''{,}0$ , att efter hans observation sanna början skulle ske  $7^{\circ}39'17''{,}7$ . Slutet.  $9^{\circ}50'52''{,}9$  Prof. HÅLLSTRÖM.

$50''{,}1$ , Prof. AHLSTEDT,

$51''{,}3$  H. J. W.

Prof. HÅLLSTRÖM nyttjade en Chronometer af MONCAS, och Prof. AHLSTEDT ett eget Ur, hvilka omedelbart före och efter hufvudmomenterne jemfördes med ARNOLDS Chronometer N:o 2019, med hvilken tidsbestämning på följande vis fanns:

*Sanna Middagen för Arnold den 4 Maji 1818:*

11 par corresp. ☉ höjdet med	
BIRDS 10' Quadrant . .	$11^{\circ}49'14''{,}83$
11 par . . TROUGHTONS 10' Sextant	$14''{,}95$
20 par . . . . .	$14,90$
15 par . . . . .	$15,99$
57 par,	Medium $11^{\circ}49'15''{,}17$

\*) LALANDE, ASTOR. T. II. 2486.

*Sanna Midnatten för Arnold den 4, 5 Maji.*

14 par med Quadranten	11'49'5",71
19 par med Sextanten	5"27
15 par	5"41
48 par	Medium 11'49'5",46

*Sanna Middagen för Arnold den 5 Maji.*

15 par med Quadranten	11'48'57",03
21 par med Sextanten	57",80
16 par	58",82
52 par	Medium 11'48'57",88

De af mig, på ARNOLDS Chronometer antecknade momenter, voro, vid början 7'32'1",4, och vid slutet 9'43'18",6. — Att ARNOLD till middagen den 5 Maji visade en irregularitet af en eller par sekunder, hörrör deraf, att den under observationerne nyttjades, och i flere timmars tid var utsatt för en kallare temperatur än den vanliga.

*Stjernbortskymningar:*

1817, April 23. 9'44'7"8 M. T. immerg. en stjerna, hvars position för 1800 år circa 115°52' och +24°51'. Observationen är af Prof. HÅLLSTRÖM.

— Sept. 26. 13'0'48"4. Emergerade  $\mu$  Piscium ur månens mörka kant. Då ett moln i samma ögonblick gick från månen, kan det möjligtvis hända, att rätta emersionen skett några få sekunder förut.

— Oct. 4. 15'17'26",2 Im.  $\lambda$  Cancri, par sekunder oviss.  
Luften dunstig.

16 25 32"5. Em. ganska noga.



- 1817 Dec. 29.  $15^{\circ}26'9''.36$  emerg. en stjärna 6.7 storl. (hvars position efter Lalande var  $174^{\circ}57'+6^{\circ}12'$ ) ur  $\epsilon$  mörka kant.
- 1818 Jan. 17.  $10^{\circ}36'59''.90$  Im. 1  $\gamma$  Tauri.  
 — —  $11^{\circ}4'31.05$  Im. 2  $\gamma$  Tauri.
- Maji 12.  $10^{\circ}39'3''.26$  Im. 9 (?) Leonis (Bode Uran.). Emersionen kunde ej observeras, men inträffade omkring  $11^{\circ}36'16'' \pm 5''$ .

Alla dessa observationer äro ganska goda, och tidsbestämningen så säker som man med afseende å omständigheterna kan fordra; hvilket också deras framtida beräkning bör visa. — Några andra occultationer,  $\gamma$   $\Omega$  den 1 Dec.;  $\iota$   $\kappa$   $\eta$  d. 4 Dec., och  $\mu$   $\kappa$  den 17 Dec. 1817, ehuru ganska vål och komplett observerade, kan jag ej anföra, emedan jag för dem ej kunnat erhålla någon god tidsbestämning.

---



# EN LOCUS GEOMETRICUS;

af  
ANDERS FRIGELIUS.

**I** bland de Kroklinier, med hvilkas undersökande, så väl äldre, som nyare Mathematici sysselsatt sig, är mig veterligen den icke vidrörd, som jag nu har den åran underställa Kongl. Vetenskaps Aca-  
demiens upplysta granskning. Skulle derföre den-  
na Afhandling förtjena någon uppmärksamhet, tor-  
de den blifva intagen i Handlingarne, hvarom jag  
ock ödmjukast anhåller.

Om tvänne cirklar  $ABCD$  och  $AEFG$  (Fig. 1) tangeras en och samma råta linie  $AO$  uti samma punkt  $A$  och äro på samma sida om henne, af hvilka den sednares diameter är dubbelt så stor som den förras; så är ock peripherien  $AEFGA$  dubbelt så stor som peripherien  $ABCD A$ . Kallar man då  $AC = a$ ; så är  $AF = 2a$ , peripherien  $ABCD A = ap$ , peripherien  $AEFGA = 2ap$ , och således  $AGF = AEF = ap$ , om  $1:p$  föreställer diameterns bekanta proportion till peripherien. Ifrån punkten  $A$  uti cirkelen  $AEFG$  lät en chorda  $AN$  ( $\overset{I}{AN}$ ) vara dragen efter behag, och ifrån punkten  $N$  ( $\overset{I}{N}$ ) drag råta linien  $NP$  ( $\overset{I}{NP}$ ) vinkelrätt emot  $AF$ ,







LIBRARY

sa

Cl

(A

(A

a

(2

(A

✓

da

✓

=

✓

n

n

r

s

l

l

l

samt  $NR$  ( $\overset{I}{N}\overset{I}{R}$ ) vinkelrätt emot  $AO$  och låt radien  $CN$  ( $\overset{I}{C}\overset{I}{N}$ ) vara dragen. Sätt nu cirkelbågen  $AGN$  ( $\overset{I}{A}\overset{I}{F}\overset{I}{N}$ ) =  $ax$ , så är  $NP$  ( $\overset{I}{N}\overset{I}{P}$ ) =  $a \sin. x$ ;  $AP$  ( $\overset{I}{A}\overset{I}{P}$ ) =  $a (1 + \cos. x)$ , samt  $AN$  ( $\overset{I}{A}\overset{I}{N}$ ) =  $a (2 + 2 \cos. x)$ . Vidare, om man gör  $AEFN$  ( $\overset{I}{A}\overset{I}{E}\overset{I}{F}\overset{I}{N}$ )  $(2ap - ax) : FN$  ( $\overset{I}{F}\overset{I}{N}$ )  $(ap - ax, ax - ap) :: AN$  ( $\overset{I}{A}\overset{I}{N}$ )  $(a \sqrt{(2 + 2 \cos. x)}) : NM$  ( $\overset{I}{N}\overset{I}{M}$ ) =  $\frac{ap - ax}{2p - x}$ .

$\sqrt{(2 + 2 \cos. x)}$ ,  $(\frac{ax - ap}{2p - x} \sqrt{(2 + 2 \cos. x)})$ , hvar-  
dan  $AM = NA - NM = a \sqrt{(2 + 2 \cos. x)} - \frac{ap - ax}{2p - x}$ .

$\sqrt{(2 + 2 \cos. x)} = \frac{ap \sqrt{(2 + 2 \cos. x)}}{2p - x}$ , eller  $AM$   
=  $\overset{I}{N}\overset{I}{A} + \overset{I}{N}\overset{I}{M} = a \sqrt{(2 + 2 \cos. x)} + \frac{ax - ap}{2p - x}$ .

$\sqrt{(2 + 2 \cos. x)} = \frac{ap \sqrt{(2 + 2 \cos. x)}}{2p - x}$ , som bestäm-

mer alla punkter uti kroklinien  $AMFMO$ .

Egenskapen af denna kroklinie, hvilken jag nu skall beskrifva och bevisa, är, att den afskär lika stora bågar på alla de cirklar, som tangera råta linien  $OA$  uti punkten  $A$ , och således hafva sina medelpunkter på råta linien  $AF$  och dess för-

långning, så att alla cirkelbågarne  $ALVM$ ,  $\overset{II}{A}\overset{II}{I}\overset{III}{M}$ ,  $\overset{III}{A}\overset{III}{I}\overset{IV}{M}$ ,  $\overset{IV}{A}\overset{IV}{I}\overset{V}{M}$ , &c. äro lika stora med peripherien  $ABCD A = ap$ . Ty drag råta linien  $MS$  ( $\overset{I}{M}\overset{I}{S}$ ) vinkelrätt emot  $AO$ , och  $MQ$  ( $\overset{I}{M}\overset{I}{Q}$ ) vin-

kelrätt emot  $AF$ , samt  $MT$  ( $\overset{I}{M}\overset{I}{T}$ ) parallel med  $NC$  ( $\overset{I}{N}\overset{I}{C}$ ), som blifver radie till cirkelen  $ALVM$  ( $\overset{I}{A}\overset{I}{L}\overset{I}{V}\overset{I}{M}$ ); så har man af triangelarnas  $ANP, AMQ$  ( $\overset{I}{A}\overset{I}{N}\overset{I}{P}, \overset{I}{A}\overset{I}{M}\overset{I}{Q}$ ) likformighet och de förut gifna benämningar,  $AN$  ( $\overset{I}{A}\overset{I}{N}$ ) ( $a\sqrt{(2+2\cos.x)} : AP$  ( $\overset{I}{A}\overset{I}{P}$ ) ( $a(1+\cos.x)$ ) ::  $AM$  ( $\overset{I}{A}\overset{I}{M}$ ) ( $\frac{ap\sqrt{(2+2\cos.x)}}{2p-x}$ )

$$: AQ$$
 ( $\overset{I}{A}\overset{I}{Q}$ ) =  $MS$  ( $\overset{I}{M}\overset{I}{S}$ ) =  $\frac{ap(1+\cos.x)}{2p-x}$ ; jämväl

af triangelarnas  $ANC, AMT$  ( $\overset{I}{A}\overset{I}{N}\overset{I}{C}, \overset{I}{A}\overset{I}{M}\overset{I}{T}$ ) likformighet  $AN$  ( $\overset{I}{A}\overset{I}{N}$ ) ( $a\sqrt{(2+2\cos.x)} : NC$  ( $\overset{I}{N}\overset{I}{C}$ ) ( $a$ ) ::  $AM$  ( $\overset{I}{A}\overset{I}{M}$ ) ( $\frac{ap\sqrt{(2+2\cos.x)}}{2p-x} : MT$  ( $\overset{I}{M}\overset{I}{T}$ ) =  $\frac{ap}{2p-x}$ .

Men nu är  $CN$  ( $\overset{I}{C}\overset{I}{N}$ ) ( $a$ ) :  $NF$  ( $\overset{I}{N}\overset{I}{F}$ ) ( $ap-ax, ax-ap$ ) ::  $MT$  ( $\overset{I}{M}\overset{I}{T}$ ) ( $\frac{ap}{2p-x}$ ) :  $MV$  ( $\overset{I}{M}\overset{I}{V}$ ) =  $\frac{ap(p-x)}{2p-x}$ , ( $\frac{ap(x-p)}{2p-x}$ ), såsom ock  $1:p :: MT, \overset{I}{M}\overset{I}{T}$  ( $\frac{ap}{2p-x}$ )

$$: ALV$$
 ( $\overset{I}{A}\overset{I}{L}\overset{I}{V}$ ) =  $\frac{ap^2}{2p-x}$ ;  $ALV + MV, (\overset{I}{A}\overset{I}{L}\overset{I}{V} - \overset{I}{M}\overset{I}{V})$   

$$= \frac{ap^2 + ap(p-x)}{2p-x} = \frac{ap^2 - ap(x-p)}{2p-x} = ap =$$

$$ALVM$$
 ( $\overset{I}{A}\overset{I}{L}\overset{I}{V}\overset{I}{M}$ ) =  $ABCD A. - H.S.B.$

Häraf är klart, att denna kroklinien har sin början uti punkten  $A$  och slutar sig uti punkten  $O$ , så att ock rätta linien  $AO = ap = ABCDA.$

Af denna krokliniens nu bevista egenskap synes lätteligen, huru man på hvar och en gifven

cirkels peripherie kan afskåra en båge, som är lika stor med någon gifven rät linie; ty till den gifna rätta linien, ansedd som peripherie, kan diametern finnas. Således, då man har diametern till den cirkel, som svarar emot cirkelen  $ABCD A$ , så kan man på förut beskrefna sätt upprita en kroklinie, som tjänar till det föresatta ändamålet.

Att draga en tangent till hvilken punkt man behagar af denna kroklinie, är ganska lätt: man sammanbinder allenast punkterna  $M, O(M, O)$  (Fig. 2), på  $AM(AM)$ , såsom diameter, uppritar man en cirkel  $AuMS(ASuMA)$ , som skär linien  $OM(OM)$  uti punkten  $u(u)$ . Då man sedan uti denna cirkel passar en rät linie  $My(My) := Mu(Mu)$ , så är den en tangent till punkten  $M(M)$ , när hon utdrages något till  $x(x)$ .

För att bevisa riktigheten af denna construction, vill jag först, efter den kända formeln  $\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = dz$ , calculera krokliniens fluxion, hvilken medelst de vinkelrätta coordinater-

na  $AS, SM(AS, SM)$  kan finnas. Emedan  $AS(AS) = \frac{ap \sin. x}{ap - x}$  och  $SM(SM) = \frac{ap(1 + \cos. x)}{2p - x}$ , så är

deras fluxioner respective  $\frac{ap(2p - x \cos. x + \sin. x)dx}{(2p - x)^2}$ ,

$\frac{ap(1 + \cos. x - 2p - x \sin. x)dx}{(2p - x)^2}$  och dessas quadrater

$\frac{a^2 p^2 ((2p - x)^2 \cos. x^2 + 2 \cdot 2p - x \cos. x \sin. x + \sin. x^2) dx^2}{(2p - x)^4}$



$$\frac{a^2 p^2 ((1 + \cos x)^2 - 2 \cdot 2p - x \cdot 1 + \cos x \cdot \sin x - (2p - x) \cdot \sin x) dx}{(2p - x)^4}$$

$$\text{hvadan } \frac{ap dx \sqrt{((2p - x)^2 - 2 \cdot 2p - x \cdot \sin x + 2 + 2 \cos x)}}{(2p - x)^2}$$

=  $dx$ . Om man sedan, såsom uti en Spiral linie, anser  $AM(AM)$  som ordinat, och enligt formelen  $\frac{y dy}{dz}$

calculerar; så får man fluxion af  $\frac{ap \sqrt{(2 + 2 \cos x)}}{2p - x}$

$$= y, \text{ som är } \frac{ap(2 + 2 \cos x - 2p - x \cdot \sin x) dx}{(2p - x)^2 \sqrt{(2 + 2 \cos x)}} = dy,$$

$$\text{och i följe deraf } \frac{a^2 p^2 (2 + 2 \cos x - 2p - x \cdot \sin x) dx}{(2p - x)^3} =$$

$$y dy \text{ samt } \frac{ap(2 + 2 \cos x - 2p - x \cdot \sin x)}{(2p - x) \sqrt{((2p - x)^2 - 2 \cdot 2p - x \cdot \sin x + 2 + 2 \cos x)}}.$$

$$= \frac{y dy}{dz}, \text{ som är expressionen på tangenten } M_y \dot{M}_y).$$

Men man kan ock i anledning af de likformiga trianglarna  $OMS, OAu$  ( $\dot{OMS}, \dot{OAu}$ ) finna expressio-

$$\text{nen } paMu(\dot{Mu}); \text{ ty, t. e. } \dot{OS} = ap - \frac{ap \cdot \sin x}{2p - x}$$

$$= \frac{ap(2p - x - \sin x)}{2p - x} \text{ och } \dot{SM} = \frac{ap(1 + \cos x)}{2p - x},$$

$$\text{hvarföre } \frac{a^2 p^2 ((2p - x)^2 - 2 \cdot 2p - x \cdot \sin x + \sin x^2)}{(2p - x)^2}$$

$$+ \frac{a^2 p^2 (1 + 2 \cos x + \cos x^2)}{(2p - x)^2} = \dot{OS}^2 + \dot{SM}^2 = \dot{OM}^2, \text{ och}$$

$$\dot{OM} = \frac{ap \sqrt{((2p - x)^2 - 2 \cdot 2p - x \cdot \sin x + 2 + 2 \cos x)}}{2p - x}. \text{ Nu}$$

$$\text{är } OM \left( \frac{ap \sqrt{(2p-x)^2 - 2 \cdot 2p-x \cdot \sin x + 2 + 2 \cos x}}{2p-x} \right):$$

$$OS \left( \frac{ap(2p-x-\sin x)}{2p-x} \right) :: OA(ap) : Ou$$

$$= \frac{ap(2p-x-\sin x)}{\sqrt{(2p-x)^2 - 2 \cdot (2p-x) \cdot \sin x + 2 + 2 \cos x}},$$

och emedan  $Mu = OM - Ou$ , d. å.

$$\frac{ap \sqrt{(2p-x)^2 - 2 \cdot 2p-x \cdot \sin x + 2 + 2 \cos x}}{2p-x} - \frac{ap(2p-x-\sin x)}{\sqrt{(2p-x)^2 - 2 \cdot 2p-x \cdot \sin x + 2 + 2 \cos x}} =$$

$$\frac{ap(2 + 2 \cos x - 2p - x \cdot \sin x)}{(2p-x) \sqrt{(2p-x)^2 - 2 \cdot 2p-x \cdot \sin x + 2 + 2 \cos x}}$$

$$(2p-x) \sqrt{(2p-x)^2 - 2 \cdot 2p-x \cdot \sin x + 2 + 2 \cos x}$$

alldeles lika med  $My$ , som ofvanföre är funnen, hvaraf är klart, att constructionen har sin riktighet.

Detta är hvad jag förmått utreda af denna kroklínies symptomer, öfvertygad likväl att en Geometer kan bringa denna undersökning vida längre, och, torde hånda, derigenom finna någon nyttig tillämpning.

## BESKRIFNING

*På ett Foster, af en märkvärdig missbildning;*

af

CARL NORDBLAD,

Med. Doct., Provincial-Medicus.

Sockenskråddarens P. B. hustru, i Skogs Socken och Helsingland, 28 år, gift sedan den 14 Oct. 1814, födde, i sin första barnsång den 19 Jan. 1816, först detta missfoster dött och straxt derpå ett vålskapadt flickebarn, som, af samma storlek med det förra, lefde trenne timmar.

Efter modrens beräkning skall denna förlossning hafva inträffat i 4:de månaden af hennes hafvande tillstånd, utan att hon kan erinra sig någon tillfällighet, som kunnat förorsaka den förtidiga börd. Hudens och naglarnes beskaffenhet samt härens började utveckling, synas dock visa, att detta foster är mycket äldre \*).


Missfostrets hela längd, är mellan 2 och 3 tum öfver 1 qvarter; det väger 9 lod. Födslodelarne likna mera dem af en gosse, än af en flicka.

*Hufvudet*, betäckt af fina fjun, äfven framåt ansigtet. *Titre öronen* (aures externæ); i stället för

\*) Missfostret, som, jemte ritning och beskrifningen inlemnades till Svenska Läkare-Sällskapet, förvaras uti Medico Chirurgiska Institutets anatomiska Museum.



Tab.VII. (pag 234)




K.W.A. Handl. 1818.

Rudman sc.



1707 H. 1000



Hand A. 1707

dem, en liten örlapp, (lobulus) *aa*, på hvarje sida, och under den en liten blind grop, (foramen cæcum), der yttre örgången (meatus aud. ext.) skulle vara. *Främre och bakre Fontanellerna*, åfvensom *Pil-* och *Nacksömmarne* (sutura sagittalis och lambdoidea) saknas alldeles, och hela hvålsfningen af hufvudskålen, som vanligen utgöres af nackbenet (os occipitis) och båda sidobenen (ossa bregmatis) tyckes här formeras af ett enda ben; dock synas tinningbenen (ossa temporum) vara skiljda derifrån och blott förenade genom hinnor, som, ehuru mindre tydligt, bilda sido-fontanellerna. *Kronlömmen* (sutura coronalis), finnes, samt framför och under den ett litet platt ben, — med en superficies anterior convexa, posterior concava, en margo superior och inferior, en extremitas dextra och sinistra, — som skall föreställa pars coronalis af pannbenet, ty partes orbitales deraf, åfvensom alla ansigtets ben, saknas aldeles, utom nedra käkbenet.

*Inuti hufvudskålens* (cavitas cranii) öfra, nedra, bakre samt sidodelar, finnes en massa, som liknar hjerna, omgifven af hinnor, men framåt är denna håla aldeles tom.

Till *näsa* (*b*), ett *öga* (*d*), *mun*, finnas inga eller högst otydliga spår. *Nedra käkbenet* (os maxillæ inferioris), beläget under upphöjningarne *c. c.*, det enda af ansigtets ben som finnes, är, tillika med nedra läppen och den betäckande huden, klufven i 2 delar, af hvilka den högra är betydligt mindre än den venstra.

Till *halsen* finnes knappt tecken; de yttre betäckningarne synas stiga rakt nedåt bröstet, utan att efter vanligheten sänka sig inåt för att formera den smalare del, som får detta namn.

Uti *bröstet* saknas minsta spår till några inålfyer; ehuru dess håla har en efter fostrets storlek

afpassad vidd och rymlighet. Äfven saknas matstrupen och den stora pulsådern (Aorta). Den muskeln, som skiljer bröstet från underlifvet (Diaphragma), finnes.

*Underlifvet.* Då nafvelstrången afskars, synes 2 större och ett mindre blodkårl i densamma; det ena af de större var alldeles öppet, i de andra syntes öppningen mindre tydligt. Nafvel-ådern, (vena umbilicalis) går blott en half tum inom bukhålan, då den slutar sig emot tarmkanalen, i stället för lefren, hvilken ej finnes. Af underlifvets inålfvor finnas 2:ne vål stora *njurar*, en nästan öfverallt jemntjock tarmkanal med sitt tarmkåxe (mesenterium) samt den nämnda nafvelådern. Ändertarmen (rectum), är den enda delen af tarmkanalen, som är något tjockare än den öfriga, och synes gå i riktig direktion ned åt bäckenet; men öppningen till stolgången saknas alldeles (anus imperforatus); och då denna öppnades, fanns tarmen innehålla en lös, grå massa. Alla andra inålfvor i bukhålan saknas.

*Af de öfre extremiteterna,* är den högra betydligt längre än den venstra. Den förra har skulderblad (scapula), hvilket den sednare saknar. På den högra är handen i handleden rakt bakåt vänd, vinkelrätt emot underarmen; på den venstra är hela underarmen i armbogleden på lika sätt bakåt vänd. Högra handen har 4, den venstra 2 fingrar.

*De nedre extremiteterna.* Fötterna äro båda fullkomliga klumptötter, och hafva således en margo superior och inferior, och en superficies externa och interna. Den högra har 3, den venstra 4 tår.

*Naglar* på fingrar och tår synas vål och tydligt; de hafva sin riktiga skapnad och form, men äro lika mjuka som huden.

## TYPHUS NERVOSUS

*Ibland späda Barn, observerad på  
Stora Barnhuset i Febr. månad 1816  
och i November månad 1817;*

af

**J. E. NYBLÆUS,**

Med. Doct., Chir. Mag.

**H**astigt, utan något synbart föregående illamående, angrepos flera Dibarn utaf feber med ökad hetta, hastigare puls, orolighet och törst, som syntes af benägenheten att di med håfughet, ehuru de ej länge fortforo dermed; utan släppte snart utaf bröstet, och åter med synbar oro fattade uti detsamma.

Ett allmänt lidande yttrades; stundom igenom skrik och gråt, stundom igenom ett qvidande och slångande med armar och ben; men intet localt lidande kunde observeras på de första dygnen.

Utan att man hade anledning förmoda någon congestion af blod, eller något seröst ämne åt hufvudet, tycktes barnen få en svaghet för att hålla detsamma rätt upp. Det lotade vanligen åt endera sidan, och barnet hade mest lindring, då det låg stilla i vaggan.

Hos somliga dibarn börjades sjukdomen med kräkning och diaré, hvaraf den sednare ofta fort-

*K. V. A. Handl. 1818. St. II.*

16.



for hela sjukdomen igenom, då excrementerna voro mycket tunna och illaluktande. Urinen var i början het, röd, sedan mera ljus till färgen.

Sömnen infann sig ej, eller också blott slummer med sprittningar och halföppna ögon.

Ögonen till utseendet dunkla, stela, knappast rörande sig till någon sida, när barnet togs utur lindan. Barnen lågo såsom i en dvala, dessimellan voro de oroliga, qvidande, någon gång skrikande håftigt och afsomnade likasom af slag.

På de flesta barnen sjönko ögonen hastigt och djupt in, och tycktes åter en annan gång något skjuta fram igen, allt efter som feber acceérnas styrka ökade plågorna, eller desse aftogo efter acceérnas minskning. Det öfriga af kroppens volume syntes ej genom fettets absorption undergå en lika hastig förändring som ögonen, och torde jag få anföra detta såsom ett signum pathognomicum uti denna feberart, hvars decursus vanligen är så hastig, att en hastig absorption af fettet ej är möjlig. Ingen remission förmärktes, utan febern fortfor beständigt med ökade plågor mot afsnarna och hela naturen igenom.

Hos några få var *Decursus febris* mera långsam och öfvergick då till acut afmagring öfver hela kroppen. Vanligast var den ganska hastig och dogo barnen efter 3 å 5 dygns sjukdom. Stundom, och endast hos mycket feta barn skedde congestioner åt hufvudet med påföljande inflammation och hydrops ventriculorum cerebri af acut beskaffenhet. Sjukdomen antog hos dem en form af apparent Synocha, såsom man ofta finner uti putrida febrar om våren, att de begynna med symptom, som bebåda en sthenisk feberform, men som öfvergå förr eller sednare uti en asthenisk sjukdom.

Man kan nästan antaga, att Hydrops ventric. Cerebr. hos feta Dibarn är en följd utaf en verkelig Synocha, eller en Typhus-artad feber, som i början liknar en sthenisk feber med apparent styrka, och man vet af erfarenhet huru lätt congestioner i hjernan uppstå hos nyfödda barn af organismens svaghet och nervsystemets retlighet, då svaga irritationer åstadkomma oordentliga och håftiga actioner.

*Sectiones Cadaverum.* De flesta visade samma förhållande, som hos fullväxte, hvilka dö af feber. Inga desorganisationer efter något localt lidande. På några var blodvatten exsuderadt imellan meninges och Gyri Cerebri; och hos flera feta barn, som dödt af Hydrops Ventric. Cerebri, är mera och mindre vatten utgjutit i hjernans caviteter.

*Orsaken* till denna feber var, ostridigt ett smittande ämne, hvilket vidhållat ett spädt barn och dess kläder, som kom ifrån stora Barnsångshuset, der barnets moder jemte flera andra Barnaföderskor om vintern 1816 dogo uti puerperalfeber.

Barnet var vid ankomsten till Barnhuset sjukt och inlindadt uti lindor och kläder, som flera dygn haft tillfälle insupa de osunda exhaltioner, som finnas uti rum, der flera febricitanter dö utaf en smittsam sjukdom.

Jag skulle ej anföra denna tanka, om jag ej trodde mig vara säker på detta factum derigenom, att, oakad all använd sjukvård, så af äldre Herrar Läkare, som af mig, intet uträttades igenom medicamenter eller ändrad diet hos Ammorna till sjukdomens hämmande, förrän mineralsura rökningar användes, då sjukdomen om några dagar upphörde, sedan den förut härjat som en pestartad sjukdom, och nästan alla som angrepos af febern, dödde deraf.

Vid curen användes evacuerande medel, såsom kråkvin och digestiver, emulsioner, bad; derefter lindriga stimulantia och kina-infusioner. Der congestioner åt hufvudet och hydrops Ventric. Cerebr. befarades applicerades iglar, hålst i nacken, och vesicatorier på hufvudet; calomel och starkare afledande medel nyttjades invertes.

Då sjukdomen visade sig i November månad 1817, der förhållandet utaf symptomerna hos barnen var lika med det förr beskrifne, var äfven en smitta dertill orsaken. En Amma började klaga öfver illamående, nedslagenhet, matthet med ökad hetta och törst mot afnarna. Så snart den sjuka blef sångliggande, utflyttades hon i de vanliga sjukrummen, der sjukdomen snart befanns vara en maligne Typhus Nervosus.

Snart sjuknade ett af de 3 barn, som denna amma tillika med en annan hade att sköta: detta barn var svagt och magert då det intogs på Barnhuset. Något synnerligt lidande observerades ej mer, än att det kändes mera varmt eller hett för amman, som vårdade detsamma. Men på en gång sjönko ögonen djupt in, och fingo ett stelt utseende, likasom de stodo orörlige, hvarjemte en starkare feber åtföljde.

Ett lidande åt hjernan misstänktes, hvarföre ordinerades 1 gr. Calomel morgon och afton, och iglar applicerades i nacken. Deremellan gafs emulsioner och digestiver. Sedan barnet dött efter några dagars sjukdom, öppnades detsamma och då befanns: Cranii ben under Galea Aponeurotica mörke af blod, och mer än vanligt elastica; högst obetydligt blodvatten helt tunt utgjutit öfver hela hjernan. Intet vatten i dess caviteter. Bröstets viscera oskadade. När hjertat genomskars, utflöt en fragglik blod, likasom uppblandad med blod.

dror, som innehöllo luft. Buken var uppdrifven, och när skinnet, som var ganska segt, genomskars, så utfor en stinkande luft, de utspände tarmarne voro fulla af våder. Lefvern gulaktig, och af tarmarna högt uppträngd emot diaphragma; mesenterii små ädror mycket högröda.

De andra begge barnen, som sköites af samma Ammor dogo uti samma feber straxt derefter. Nu befarades en smitta och mineralsura rökningar anställes. Samma verkan deraf observerades, som vid förra farsoten — den afstannade genast.

Således befunnos de observationer, som gjordes vid epidemien år 1816, bekräftade genom den sednare af år 1817, och man kan i anledning deraf uppgifva dem, såsom af erfarenheten bestyrkta.



# TETRAPTERYX CAPENSIS,

*ett nytt Fogelslägte;*

beskrifvit af

C. P. THUNBERG.

Ibland de flere märkvärdiga Foglar, som det södra Afrikas hörn, Goda Hopps Udden åger, räknas med skäl åtskillige dess stolte och högbenta Tran-arter, som bebo dess skoglösa och vidsträckta ödemarker. Strutsen, som bebor de Afrikanske af solen förbrände öknar, är både till sin kropps vidd, sine fötters längd och sin långa hals, icke allenast den störste ibland Foglarne, utan äfven af ett anseende, som ingen annan åger, samt intager en lika hedrande plats ibland Foglarne, som Kameloparden ibland Däggande Djuren. Närmast honom komma de Tran-arter, som stundom gå till en mans höjd, och på afstånd gifva åskådaren en den skönaste anblick.

*Ardea* eller Håger-slågtet är uti alla varmare länder ganska talrikt och mycket väl kånbart med sitt långa, raka, hopkrammade, tunna och spitsiga näbb.

Aldranärmast till *Ardea* slägte kommer en art Trana, som stundom visar sig på de Afrikanska hedarne; men skiljer sig uti flere betydande om-


et  
k-  
ta  
ta  
af  
d,  
ast  
n-  
en  
o-  
om  
en  
en

are  
ed  
ga

art  
ska  
m-

Tab. VIII. (*pag. 262.*)






TETRAPTERYX CAPENSIS.



K.W.A. Handl 1318.

*Handl 1318*





st  
sl  
de  
gr  
hv  
ha  
E  
ifr  
jag  
oc  
da  
ge  
tje  
m  
re  
bl  
H  
D  
D  
U  
P  
A  
e

ståndigheter ifrån *Ardea*; och måste utgöra ett eget släkte, skildt ifrån dem så utmärkt, att det med dem icke kan förenas.

Under mina resor hade jag tillfälle, att några gånger för bössan fälla denna vackra Fogel, hvilken jag, för dess besynnerliga vingars skull, har kallat *Tetrapteryx*, med tillnamn *Capensis*. Efter min hemkomst till Fäderneslandet har jag ifrån Cap anskaffat tvänne individuer, af hvilka jag förärat en till Upsala Academi's Natural-Samling, och den andra till Herr Hof Marskalken och Rid-daren PAYKULL.

Denne praktfulle Fogel har jag ansett för-jena att beskrivas och afritas, samt således kom-ma till Fogel-älskares kunskap, emedan mig ve-terligen, den ännu icke är af någon hvarken pu-blicerad, eller finnes uti något utländskt Museum.

Hela Fogeln är minst af 2:ne alnars höjd.

Den gråblå färgen är den allmännaste öfver krop-pen, i synnerhet halsen, bröstskägget, (pennæ laxæ, longiores, dependentes) ryggen, vingarne vid basis och buken.

Den svarta färgen finnes på vingarnes främre skrif-pennor, de öfrigas (secundariorum) spisar, stjer-ten och fötterne.

Utan att vara aldeles svarta, utmärka sig med en mörkare färg (fuscus) hufvudets tofs, (crista) och den öfre delen af halsen.

Pannan är hvit och

Näbbet är helt och hållet rött. Detta är ock det (rostrum), som hufvudsakligen skiljer detta nya släkte ifrån *Ardea*, emedan det icke är hvarken ihopkrammadt med sidorne (compressum), eller spitsigt (acutum); utan i dess ställe trindadt (cy-lindricum), något tjockare nära vid hufvudet, och mycket trubbigt (obtusum). Utom dess är

nåbbets undra kåk (mandibula inferior) tydeligen kortare, än den öfre och kanterne af bägge kåkarne, der de möta hvarandra något utstående, så att nåbbet kännes för fingrarne vara något kantigt (angulatum), men under mera platt. *Näsborarna* (nares) sitta tämmeligen långt fram på nåbbet, ungefär vid en tredjedel af dess längd, och äro aflånga.

*Stjerten* är någorlunda rundad, eller föga spitsig. *Vingarne* äro en ganska besynnerlig skapnad, så att man lätt, utan nogare granskning, skulle anse den ena hälften deraf för en lång och spitsig stjärt. De komma något nära till den skapnad, som man finner åtskillige sjö-foglar äro, i synnerhet Fiskmåsar, Tårtor och dylika. Framvingen (Remiges primores) räcka till spitsen af stjerten; men inre delen (secundariæ) är dubbelt längre, utgående i lösa, hängande spissar, som, emedan de äro längre än fötterne, släpa på marken efter fogeln, då han på Africas torra slätter synes högmådas med sin stolta gång. *Kammen* på hufvudet täcker hela dess öfre del och är föga lång, endast af 5 tumers längd, eller så lång, som sjelfva hufvudet.

*Character generis* blifver således följande:

*Rostrum* rectum, subangulato-teres, sensim attenuatum, obtusum; mandibula inferiore brevior.

*Nares* oblongæ, in sulco baseos rostri sitæ,

*Pedes* tetradactyli.

Ibland *Ardeæ* äro endast tvänne arter prydd med tofs på hufvudet, nämligen *Pavonina* och *Virgo*. Om *Tetrapteryx* kunde förenas till genus med *Ardeæ*, så borde den höra till denna afdelning deraf; men med sine tofsar (cristæ) äro ändock desse treppne arter vida skilde ifrån hvarandra. Det torde likväl nogare böra undersökas, om icke

de tvänne nämnde arter, *Pavonina* och *Virgo*, snarare skulle kunna förenas till genus med *Tetra-  
pteryx*, än med *Ardea*.

De afmätningar jag gjort på fogelns särskilda delar, äro följande:

*Rostrum* är goda 4 tum.

*Collum* 9 tum emot hufvudet, uppåt småningom smalare.

*a. basi colli ad apicem caudæ*, 1 aln.

*Pedes* med 3 tår framåt och 1 bakåt, 18 t.

*Femora* 8 t. *Deras basis plumosa*  $3\frac{1}{2}$  t.

*Tibiae* 9 t. eller något derutöfver.

*Digit. laterales* 3 tum; *intermedius* nästan 4 tum, och *posticus brevissimus*.

*Pennæ* barba vid pass 8 t.

*Cauda*, 8 t.

*Remiges* *antici*, 18 t.; *postici* 36 t.

Som jag allid fann denna sköna Fogel på Afrikas torra, öppna fält, hvarest intet vatten finnes; så är sannolikt, att hans måsta föda består utaf ormar, ödloy och insecters, i synnerhet gräshoppors larver, som i sådane fält finnas till stort öfverflöd.

På Tabellen föreställes *Tetrapteryx capensis*, jemte särskild teckning af näbbet; den sednare i naturlig storlek.



# MYDAS GIGANTEA,

beskrifven af


C. P. THUNBERG.

**U**ti vissa klasser äro Djuren så beskaffade, att de fläste finnas af en betydande storlek, då andre deremot bestå nästan helt och hållet utaf smärre. Till de sednare räknas med skäl Insekterne, som i allmänhet förefalla små. Ehuru den största Hummer och några få andre kråstor äro af en utmärkt storlek, i jämförelse med de öfrige utaf Insekternes mångfaldiga arter, så är den likväl aldeles obetydlig, i anseende till de större daggande Djuren. Och ibland Insekterna kan man med skäl räkna hela det två-vingade Flugsläktet till dess mindre arter, så väl till längden som till tjockleken. De fläste af dem hinna sällan till en half tum.

Det var derföre icke utan synnerlig förundran, som jag för någon tid sedan erhöll en flugart, som var ovanligt stor och bred, samt kunde anses för en jätte ibland sine samsläktingar. Dess teckning och beskrifning utbeder jag mig få framlägga för Kongl. Vetenskaps - Academiens ögon och underställa dess benägna granskning.

Vid första påseende tyckes den likna en stor svart Geting (Hymenopteron) med sin breda bål; men den äger endast 2:ne vingar med de vanliga balancer-stängerne (halteres), utan någon gadd (acu-

Tab. IX. (pag. 246.)




MYDAS GIGANTEA.

*W. B. Balaban del.*

K. W. A. Handl. 1810.

*Cluckner sc.*

1867



MINIATURE

leus) uti stjerten, och måste således föras till flugornas stora familj.

Denna största flugas hemvist är Brasilien.

Med *Mydas* slägte kommer den närmast öfverens, och torde derför kunna föras till samma slägte (genus), hvaraf endast några få species förut äro bekante.

Dess förnämsta *kännemärke* är, att hon äger ett munn-snyte, som är likt en klubba, och mycket långa trådlika spröt (antennæ), som vid hufvudet, emellan ögonen, sitta tätt tillsammans, och hvars yttersta led är aflångt äggformig med en kort spits.

*Hufvudet* är föga smalt, än bröstet, med stora bruna ögon. *Snabeln* är kort, nederst trådlik, med ett ägglikt hufvud. *Läppen* är kullrig, något spitsig framåt och härig. *Antennerne* äro fästade mellan bägge ögonen och sitta nederst tätt tillsammans, utan att vara hopväxte: blifva sedan trådlika, nästan af en nagels längd, och få ytterst en led, som är aflång, spitsig, åt sidan utstående samt hälften så lång, som det öfriga af spröten.

En kort *hals* skiljer hufvudet tydeligen ifrån bröstet.

*Bröstet* är något längre, än dess bredd, ofvantill kullrigt, med trenne mörkare, föga märkliga linier efter längden,

*Bälgen* (abdomen) är något bredare, än bröstet, och består af åtta leder, som äro kullrige, alla glatta, utom den första, som är sammetslik, och den ytterste eller *anus*, som är försedd med några gläsa hår.

*Fötterne* äro, såsom vanligt, sex, hvaraf det sista paret är större och längre, med tjockare lår och tibiae, finhåriga samt försedde med fem leder (tarsi) och tvänne klor.



*Vingarne* äro vid den tjockare yttre kanten aldeles svarta och ogenomskinliga; vid den tunnare kanten endast sotfärgade och genomskinliga med tydeliga ådror. Vid basin äga vingarne tvänne *lober*, en större och en mindre, likasom vero de derstädes sönderslitne.

*Ballancer-stängerne* (halteres) äro trädlika med ett rundt afstympadt hufvud.

Hela flugans färg är i allmänhet svart, men bälgen faller i skinande blått.

Antennernes hela längd är  $\frac{3}{4}$  tum.

Hela flugans längd ifrån hufvudet till stjerten  $2\frac{1}{4}$  t.

Bälgens längd  $1\frac{1}{2}$  t. och dess bredd  $\frac{5}{8}$  t.

Hvarje vinge är  $1\frac{7}{8}$  t., på midten  $\frac{3}{4}$  t. bred, samt utsträckningen ifrån den ena spitsen till den andra nära fyra tum. De ligga horisontelt långa efter kroppen och betäcka den.

Denna stora och besynnerliga flugas hushållning, förrättningar, föda, förvandling och öfriga egenskaper äro ännu aldeles obekante.

Ifrån de trenne species af *Mydas*, som FABRICIUS i dess Systeme upptagit, skiljes denna *Mydas gigantea* med sin ovanliga storlek, dess enfärgade blåagtiga bälge utan genomskinliga fläckar, samt med sina svarta enfärgade fötter.

Om med tiden flera species af denna flugas arter skulle upptäckas, är det sannolikt att de kunna gifva tillräcklige kännemärken, för att deraf kunna bestämma ett eget genus. Då denna *Gigantea* är hittills den enda, som kommit till min kunskap och undersökning, har jag ansett den kunna föras under *Mydas*, med hvilket släkte den närmast kommer öfverens och skiljer sig mera betydligt ifrån både *Bibio* och *Stratiomys*.

*Figuren* är gifven uti naturlig storlek.

---

# NÅ GRA NYA SVENSKA INSECT-ARTER,

fundne och beskrifne

af

JOH. VILH. ZETTERSTEDT,

Bot. Demonstr. och Hist. Natur. Adj.  
vid K. Acad. i Lund,

**D**å så många berömda Entomologer, dels uti större Verk, dels uti Kongl. Vetenskaps-Academiens Handlingar och i Universitets-Dissertationer, i senare tider ansenligen riktat svenska Pandora, upptäcker man väl icke nu mera, med lika lätthet som förr, i Sverige nya Insect-arter, minst sådana, som höra till de efter LINNÉ tid omarbetade och noggrant beskrifna Ordningarne *Coloptera*, *Hemiptera* och *Diptera*.

Men oaktadt de fleste Rikets Provinser af nittiske Samlare blifvit besökte, torde likväl äfven dessa ställen ännu kunna erbjuda forskaren okända trakter, ja till och med på de närmare undersökte kunna finnas osedda arter, emedan individernas mängd hvarje år på ett och samma ställe ofta är högst olika, allt efter som äggläggningen, utkläckningen m. m. blifvit gynnade eller hindrade af våderlek och flera orsaker. Här af kommer der, att man det ena året finner i myckenhet vissa arter, af hvilka ett annat icke synes ett enda individ. Detta år i synnerhet händelsen med flera Diptrer,

om hvilkas bibehållande naturen synes anförtrödt  
 åt tillfälligheter omsorgen mera, än om andras.

Under en sommaren 1817 från Lund till  
 Öland för Vetenskapens skuld anställd resa, hade  
 jag tillfälle, att både på stället, samt på dit- och  
 återresan genom Småland och Skåne upptäcka fle-  
 ra, dels sådeles nya, dels i Svenska Fauna hittills  
 saknade Insect-arter, för hvilkas beskrifningar jag  
 nu vågar utbedja mig ett rum i K. Vetenskaps-  
 Academiens Handlingar.

Att bland Insecter, så väl som bland de öfriga  
 djuren, der hermaphroditismen icke åger rum, en  
 art icke kan sägas vara fullkomligt bestämd, och  
 icke blifva såkert beskrifven förrän dess begge  
 kön blifvit jemförde, är bekant. Denna regel tål  
 så mycket mindre undantag, som, utom könsorga-  
 nernes olikhet, äfven de yttre skiljaktigheterna i  
 färg, storlek, beklådnad, beväpning och särskildta  
 delars (såsom mandiblers, ögons, antenner, vin-  
 gars m. m.) skapnad hos olika kön, ofta äro be-  
 tydliga. LINNÉ, FABRICIUS och till och med se-  
 nare Författare hafva, förledde af dessa skiljaktig-  
 heter, på flera ställen i sina systematiska uppställ-  
 ningar infört individer såsom särskildta arter, hvilka  
 enligt senare säkra observationer blott äro olika  
 kön. Såsom bevis härpå kunna nämnas *Hyphy-*  
*drus* (*Hydrachna* Fabr.) *ovalis*, som är ♂, och *Hy-*  
*phydrus gibbus* ♀ till samma art; *Platycerus Cara-*  
*boides* Gyll. är oftast ♂, *Platyc. rufipes* alltid ♀;  
*Tenthredo germanica* Fabr. är endast ♀, som har  
 sin ♂ i *Tenthr. nigra* Fabr. (*opaca* Fall.) o. s. v.,  
 hvilka jag ofta tagit i parning. Af sådan anled-  
 ning, och till så mycket större visshet för art-rät-  
 tigheten, har jag här åter upptagit en och annan  
 insect, hvaraf endast det ena könet tillförene fin-  
 nes beskrifvit.

För upplysningen om Insecternas hushållning är äfven kännedommen om deras tid att *florera* visserligen af lika mycken vikt, som kännedommen om deras vistelseorter, hvarföre uppgift derom, så vidt man det uttrönt, icke bör saknas i insectbeskrifningar. De flesta insecters lefnadsperiod räcker, såsom de annuella vexternes, vanligen en eller två månader: hannen dör merendels straxt efter fulländad parning och honan kort efter äggläggningen. Många lefva likväl ända från våren till sena hösten, i synnerhet de skalbaggar, som förtära cadaver och orenlighet, samt dymedelst äro så nyttiga och nödvändiga i naturens hushållning. Några synas endast om våren, andra blott om hösten; förgäfves söker man t. ex. någon *Platypexa* eller *Callomyza* utom i Aug. och Sept. månader, då deremot *Rambylius major* och några arter af *Existalis* sällan finnas efter Maji månads slut. Af somliga *Syrphi* florerar den första generation om våren, och den andra om hösten, t. ex. *S. arbustorum*. Af *Tipula plumosa* Linné, som redan är framme i Mars, finner man den andra generation i Maji, och ibland dem som lägga flera generationer om året, torde äfven några slugarter, hörande till släktet *Musca* Fall. böra räknas. Minsta delen af insecterna äro fleråriga. Emellertid är ännu mycket obekant i denna visserligen intressanta delen af Insectläran.

De öfriga fundne okända arterne, som kunna föras till de senare och ännu icke fullkomligt utredde afdelningarne af *Coleoptera*, *Lepidoptera*, *Hymenoptera* och *Diptera*, lemnar jag gärna till de förljensfulla Författare, som arbeta i dessa ordningarne, på det de måga blifva beskrifna i sammanhang, under det jag är sysselsatt med ett försök till uppställning och beskrifning öfver Svenska *Orthoptera* och *Neuroptera*.



1. *H. globularis* orbiculato subglobosus niger, punctatissimus; elytris striis nullis; antennarum clava fusca; tibiis edentulis linearibus, anticis medio lamina dilatata.

Schönh. Synom. 1. 97. 57. Payk. Monogr. Hlm. 85. 69. T. 7. f. 8.

Har nära förvändskap med *Hier. minutus* Gyll, men är väl fyra gånger större, svart och har mera rundad kroppsform. I slutet af Julii månad förledes år fann jag ett enda exemplar vid Säteriet Berga i Calmare Län.

### *Buprestis.*

2. *B. Moesta* fusca obscura, subtus cupres, thoracis rugis longitudinalibus elytrorumque nitidis, nigris; elytris subattenuatis, truncatis.

Fabr. Syst. Eleut. 2. 205, 85. Ent. Syst. 2, 206, 85. Schön. Synom. 3. 252, 202.

3. Liknar *B. acuminata*, men lätt skild från denna genom öfra sidans mörkare färg, och för nämligast genom elytra, som äro mindre långspetsade. Det exemplar jag beskrifvit, och som är tagit vid Berga i Julii månad, synes vara en hona, emedan abdomens analsegment är rundadt och helt, då hannarne hos de flesta till *Buprestis* hörande arter hafva samma segment mer eller mindre klufvit (emarginat).

### *Scolytus.*

3. *S. limbatus* ovatus ferrugineus, capite, antennis pedibusque flavis, supra-testaceus, vertice, thoracis macula ante scutellum, elytrorum sutura, striga, utrinque humerali fasciisque duabus undulatis viridi aeneis.

Fabr.

Febr. Syst. Eleut. 1. 247. 2. Schönh. Syn. 1.  
249. 2. *Omophron limbatum* Latr. Gen. Ins. 1.  
225. 1.

Denna vackra insect, som i Juli och Aug. månader finnes sparsamt under stenar vid stränderna af Silfakrasjön, en mil från Lund, är till storleken nästan som *Hydrophil. fuscipes*, men ofvan aldeles platt (depress). Kroppen rostfärgad. Hufvud, antenner och fötter blekgula. Mandiblernas spets svart. Vertex är vanligen grön. Thorax djupt puncterad, lersfärgad, med en stor grön fläck framför scutellen. Elytra strietade, lersfärgade med grön sutur samt tvänne fläckar vid basen och tvänne gröna vågiga fascier. Hos de så individer jag funnit har jag icke kunnat upptäcka någon yttre könskillnad.

Var. *vertice caeruleo*. Liknar aldeles v. d. utom den blå vertex.

### *Pogonophorus.*

4. *P. rufo-marginatus oblongus*, supra niger, subtus piceus, ore, antennis, thoracis cordati lateribus, elytrorum limbo anguste, pedibusque pallidis; elytris punctato-striatis. *Carabus rufo-marginatus* Duftsch. Fn. Austr. 2. 54: 50. *Leitius rufo-marginatus* Sturm. Fn. Germ. 3. 155. 2. T. 71. f. a. A.

3 2. Är dubbelt så stor som *P. spinilabris*. Ofvan är den svart, glänsande, under beckfärgad. Mun, antenner, fötter, thoracis sidor och yttersta kanten af elytra rödgula. Elytrorum strier puncterade. Begge könen hafva stora tydliga vingar (alæ), men hannens tärsar på främsta fotparet äro, såsom hos de flesta af *Carabici*, något bredare och under mera ludna, än honans. I början af Augusti har jag tagit denna art, ehuru sparsamt, un-

K. V. A. Handl. 1813, St. II,

der stenar och ekestrådsbark i skogen vid Esperöd i Skåne.

*Harpalus.*

5. *H. serripes* brevis ovatus niger, palpis, antennarum basi apiceque rufo-testaceis; thorace subquadrato lævi, postice fovea utrinque simplici; elytris tenue striatis, puncto pone medium disci impresso; tibiis spinosis.

*Carabus serripes* Schönh. Syn. 1. 199. 184. T. 3. f. 4.

§ 2. Till storlek och vid första påseender har den mycken likhet med *H. tardus* och *binotatus* och utgör ett medium dem emellan, men är från dem begge våsendligt skild. Öfverallt svart, endast palperne, antennernas bas och spets, samt de fleradiga taggarne på tibierna äro röda. De icke fyllest så djupa strierne på elytra och den intryckta puncten nedom discen skiljer den lätt från *H. binotatus*, och de midtpå svarta antennerne samt taggige tibierna från *H. tardus*. Kanske är den ock något större. Finnes under stenar och mossor i Julii på Öland förnåmligast i Ottenbylund. För flera år sedan har jag äfven tagit den i Skåne.

*Lixus.*

6. *L. Bardana* niger pubescens, flavo-pollinosus, antennis ferrugineis, clava obscuriori; elytris apice obtusis.

Fabr. Syst. Eleut. 2. 502. 22. Ent. Syst. 2. 418. 107.

§ 2. Är utan tvifvel FABRICII *L. Bardana*, ehuru beskrifningen icke fullkomligt inträffar på denne. Varierar till storlek, men är vanligen hälften mindre än *L. paraplecticus*, i synnerhet hannen, som äfven är smalare och har något kortare rostrum än honan. Är öfverallt betäckt med ett gult mjöl,



som likväl lät afstryken, då kroppen synes svartgrå. Elytra i ändan trubbiga. Tegen i parning på *Rus. Patientia* och *Rheum Rhubarbar.* i Berga trägård i Junii.

*Ann.* En annan, som är tegen i parning på *Scandix Cerefol.* ifven vid Berga, och som till färgen aldeles liknar den nu beskrifna, men har spetsiga elytra och är af lika längd, men mycket bredare än *L. paraplecticus*, är ganska säkert en distinct art från denna. Är knappt *L. puberulentus* Fabr. som skall vara mindre än *L. paraplecticus*.

### *Rhynchonius.*

7. *R. Rosa* oblongo-ovatus niger, pubescens, suturæ basi alba, summo apice rostri, antennæ tarsisque rufis; oculis coadunatis; femoribus posticis incrassatis, serrato-ciliatis.

*Curtulio Rosa* Herbst Col. 6, 428; 444. T. 93, f. 10. Illig. Mag. 6, 312.

Liknar till storlek och utseende *R. Jota*, hvar för sig och PAYKULL i sin Fn. Svecica citerar den som synonym, men är från densamma tydligt skild genom röda antenner, en hvit fläck på suturen nedom scutellen, och synnerligen genom femora postica incrassata, som under äro styfhaniga. Är funnen vid Lärketorp i Östergötland.

### *Corionus.*

8. *C. ferrugineus* niger, nitidus, glaber, antennæ; elytris pedibusque ferrugineis, clava antennarum pallida; rostro longiori, apice dilatato; thorace subquadrato, non impresso.

Clairville, sec. Illig. Mag. VI. 312.

9. Tegen i parning. Är dubbelt så stor som *C. linearis*, med hvilken den för öfrigt har mycken likhet, utom färgen, och den puncterade, men



icke intryckt thorax. Kroppen svart; antenner, elytra och fötter rostfärgade; antennclavar mycket ljusare. Är öfverallt glänsande och glatt (gläbör), utom något gulskimrande ludd, som synes på abdomens undre sida hos mål conserverade specimina. Hann och hona till yttre strukturen aldeles lika. På en rotten aspstubbe, uti hvilken de sannolikt undergått sin förvandling, fann jag den 27 Junii 1813 vid Lärketorp omkring en tjog specimina; sedermera icke sedd.

Varierar med hela kroppen rödbrun, eller, då den är nyss utkläckt, aldeles gul.

### *Chrysomela.*

9. *C. bicolor* ovata, aeneo-violacea; thoracis disco subtilissime punctulato; elytrorum striis parvis approximatis, punctis striarum paucioribus, remotis.

Fabr. Syst. Eleut. 1, 429, 39. Ent. Syst. 1, 309, 10. Schönh. Syn. 2, 243, 42. Gyll. nota sub *Chrys. geminata* Ins. Sv. 3, 478. (*Chrys. fucata* Fabr. Syst. Eleut. 1, 444, 132. Ent. Syst. 1, 329, 108 vix eadem, ut vult D. Schönh. l. c., dum *C. fucata* elytra "viridi-aenea, vage punctata" dicuntur, qualem nunquam vidi).

§ 2. Är något mindre än *Chr. geminata*. Färgen ofvan blåaktig, stötande i violett. Thorax i discen knappt märkligt puncterad, och sidorne föga upphöjda, men vid hyarderas bas är en djup intryckning. På hvarje elytron synas 9 tydeliga strier, de 8 yttre parvis tätt förenade, men puncterne i hvarje stria äro långt åtskilde, utgörande 12 å 14, då deremot strierne hos *C. geminata* formeras af väl dubbelt så många puncter. Metatarsus på främre fotparet, hos hannen är mycket bredare än hos honan, annars begge könen lika. Är

sparsamt tagen tillsammans med *C. marginata* på torra sålt vid Esperöd den 16—20 Juli 1816.

### *Clythra*.

10. *C. aurita* caeruleo-atra, antennarum basi, thoracis lateribus late, femorum apice tibiisque rufo-testaceis, elytris atro-caeruleis, confertim punctatis. Fabr. Syst. Eleut. 2, 36, 36. Schönh. Syn. 2, 349, 41. *Chryptocent. auritus* Fabr. Ent. Syst. 2, 57, 20. *Chrysom. aurita* Linn. Syst. Nat. 2, 596, 75.

♂ 2. Tagen i parning. Hannen är så stor som *Cryptoc. dispar* och har abdomens analsegment helt, honan mest dubbelt större, och har midt på analsegmentet en djup, rund intryckning. Begge könen äro eljest lika. Kroppen blåsvart, något hårig och opac; ofvan glatt, glänsande. Antennernes bas, thoracis sidor ganska bredt, och fötterne, utom vid basen, rödgula. Elytra äro svartblå, tät puncterade. I medlet af Junii finnes den jämneligen ymnigt på buskars blad och blommor i Foglesång nära Lund.

### *Clytus*.

11. *C. Antilope* niger, pubescens, antennis, femorum basi tibiisque ferrugineis; thoracis globosi annulo antico posticoque ininterruptis, elytrorum apice fasciisque tribus tenuibus flavo tomentosiss, secunda antirorsum arcuata.

Schönh. Syn. 3, 465, 14. *Clytus Aristis* Fabr. Syst. Eleut. 2, 347, 9. (exclus. Synonymis).

*Cl. tenuis* Schneid. secund. Gyll. in litt.

Är till form och storlek som *Leptura Aristis* Linn., men thorax något bredare. Thorax är svart med tvänne gula sidostreck, som formera en afbruten ring inom främre kanten, och en gul punct på

Ömse sidor vid basen. Elytra äro becksvarta med gul spets och tre gula fascier; den första formerad af tvänne tvärstreck nedom punctum humerale; den andra båglik, uppgående nästan till scutellen, men hvarken så bred eller vid suturen så hopstötande som hos *L. Aristis*; den tredje nedom discen, rät, vid suturen hoppgående och der bredast. Abdomens ventralsegmenter äro i kanten gula. På ömse sidor om sternum är en stor gul fläck. Antenner och fötter brandgula med en bred mörk ring vid ändan af femora. Det beskrifna exemplaret fann jag vid Lund i Junii månad.

*Ann.* *Fabricii* (l. c.) synonymer till *Clyt. Aristis* höra icke dit, utan till hans *Cl. Gazella*, som är allmän i södra delen af Sverige, och hvaraf jag både i Skåne och på Öland i Julii funnit en varietet med hvita fascier och signaturer.

*Saperda.*

12. *S. linearis* elytris profunde punctato-reticulatis, apice præmorsis, nigra, palpis, pedibus, elytrorum margine exteriori baseos in mare, flavis.

Fabr. Syst. Eleut. 2, 320, 15. ♀. Payk. Fn. Sv. 3, 72, 3. ♂. Schönh. Syn. 3, 426, 52, var. α. 424 v. β ♂. *Cerambyx linearis* Linn. Fn. Sv. 663, 2.

♂ ♀. Är något större, i synnerhet längre än *S. cylindrica*. Hannens elytra äro åt spetsen smalare än honans; könen för öfrigt lätt skilda genom den gula fläcken, som synes på elytrorum yttre kant vid basen hos hannen. Fötterna hos båda könen gula. Funnen på hasselbuskar vid Abusa i Skåne i slutet af Junii, och på Öland vid Glömminge i början af Julii.

13. *S. Salicis* elytris rugosis, apice rotundatis, nigra, subtomentosa, thoracis lineis duabus elytrorumque singuli punctis quatuor niveis.



♂ ♀. Liknar mycket *S. populnea*, men utom det att thoracis lineer och elytrorum puncter hos *S. Salicis* äro hvita och distinctare, synes äfven apex elytrorum vara mera rundad, och hela kroppen mindre ludden. Hufvudet svart, puncterat, med hvitt ludd i pannan. Antennerne knappt långa som kroppen, svarta med grå ringar vid ledernas bas. Thorax cylindrisk, puncterad, svart med tvänne hvita lineer. Elytra äro dubbelt bredare och väl fyra gånger längre än thorax, parallela, djupt puncterade, skrynkliga, nästan utan hår, svarta med 8 tydliga hvita puncter i samma ordning som hos *S. populnea*; apex rund. Thorax, pectus och abdomen med glest ludd. Fötterne svarta med smått ludd, och hår och der några längre hår. Hannen något smalare än honan. På Korgpihl i ett kårr vid Abusa, fann jag ett par i medlet af Augusti förledit år.

*Pselaphus.*

*Sect. 1:ma: Palpis anticiis longissimis, articulo ultimo clavato.*

14. *P. Heisei* rufo-ferrugineus, nitidissimus, subglaber, lævis, thorace sub-cylindrico, minime impresso; articulo antennarum primo elongato, cylindrico, tribusque ultimis sensim incrassatis reliquis majoribus.

Reichenb. Monogr. Pselaph. 28, 2. T. I. f. 2.  
Herbst. Käf. 4, 109. I. T. 39. f. 9. 2.

Är vid pass en linea lång. Rödgul, varierar äfven mörkare, glänsande och hela kroppen betäckt med glesa, upprätta hår, som blott synas med förstoringsglas då insectet hålles emot dagsljuset. Hufvudet ovalt med färad frons och kulrig vertex. Främre palperna nästan längre än hufvud och thorax tillsammansantagne, med knå midipå och aflång clava i ändan. Antennerne långa som



halfva kroppen med första leden lång, cylindrisk, något tjockare än de sju följande; nionde och tiende, som med den yttersta ägglika mörkare formerna en clava, äro småningom tjockare; alla tydligt håriga. Ögonen små, gryniga, utstående, svarta. Thorax knappt bredare än hufvudet, aflång, nästan cylindrisk, framtill och vid basen något smalare, aldeles slät, glänsande. Elytra något längre än thorax, nästan trekantiga, glänsande, opuncterade, släta utom suturalfäran och en fin, på discen böjd, stria, hvars ända slutar inom elytri inre angel. En dylik inre stria synes ock på de nedvikna sidorna af elytra. Abdomen med upphöjd sidokant, slät. Femora postica äro af abdomens längd. Ärtagen sällsynt under mossar vid Abusa i Septemb.

*Anm.* *Ps. Heisii* Payk. Fn. Sv. 3, 364, 2, som är mörkare till färgen, har något smalare antenner, i synnerhet den yttersta leden mindre, och en intryckning bakpå thorax, synes vara en annan art, eller troligare andra könet (♀?). Den tyckes komma öfverens med *Ps. Dresdensis* Herbst l. c. p. 110, 2, T. 39, 11. B. Vid *Ps. Dresdensis* Payk. l. c. p. 365, 3 (hvilken Reichenbach kallar *Ps. sulcicollis*, och finnes icke så sällsynt under mossar vid Abusa), uteslutes alltså Herbsts Synonym. Tillsamman med flera *Pselaphi* arter har jag funnit ett individ, som fullkomligt passar med Paykulls beskrifning på dess *Ps. niger*, utom att femte antennleden icke är tjockare än någon af de sex andra medlersta. Enligt Reichenbach skall denna vara honan till *Ps. niger*.

*Sect. 2da. Palpis anticis mediocribus, articulo ultimo oblongo.*

15. *P. bulbifer niger nitidus, pubescens, palpis tarsisque testaceis, antennis pedibusque rufo-piceis; elytris punctatis, thorace subgloboso, postice coarctato; antennarum articulo primo maximo, cyathiformi, piceo; secundo minori, globoso, ultimisque tribus sensim incrassatis reliquis majoribus.*

Reichenb. Monogr. Pselaphor. 37, 6. T. I. f. 6.  
(antennarum pedumque colore alio).

Är mindre än föregående. I afseende på hå-  
righeten och puncturen på thorax och elytra synes  
den ej så glänsande som förra. Är till det mesta  
svart. De bleka palperne dubbelt längre än huf-  
vudet med yttersta leden ganska stor. Antennerne  
lika långa med hufvud och thorax, hafva första  
leden ganska stor, båglik, becksfärgad, den an-  
dra mindre, nästan klotrund, de öfriga hafva sam-  
ma structur som hos följande art, men den yttersta  
till färgen något mörkare. Thorax elytra och ab-  
domen af samma form som följande, men af svart  
färg och thorax opuncterad. Fötterne merendels  
becksfärgade, tibier och tarser ljusare.

*Ann.* Varierar med första antennleden mindre,  
den andra alldeles klotrund; manne honan?

16, *P. clavicornis* rufo-ferrugineus nitidus, pubescens,  
punctatus, thorace subgloboso, postice coarctato;  
antennarum articulo primo subcyathiformi, secundo  
globoso tribusque ultimis sensim incrassatis reli-  
quis majoribus.

Reichenb. Monogr. Pselaphor. 40, 7, T. I. f. 7.  
Panz. Faun. Germ. H. 99, 3.?

Knappt hälften så stor som *Ps. Heisei*, hvil-  
ken den till färgen liknar, ehuru den äfven någon  
gång finnes mörkare. Färgen och den puncterade  
thorax skiljer den ock lätt från föregående. Palperne,  
som vanligen ligga hopböjda, äro, då de utsträc-  
kas, inemot så långa som hufvudet och halfva  
thorax. Ögonen ganska små, svarta. Antennerne  
korta, knappt längre än hufvud och thorax, med  
första leden nästan båglik, andra klotrund, begge  
tjockare än de sju följande; den nionde och tionde  
småningom tjockare, den yttersta ganska stor, till

färgen ljusare, och i sjelfva verket klottrund, ehuru de hvita håren i åndan gifva den ett spetsigt utseende. Thorax spherisk, vid basen hoptryckt, puncterad. Elytra långa mest som hufvud och thorax, nästan fyrkantiga, tydligt puncterade, vid basen fällade. Abdomens sidokant mindre upphöjd. Fötter som hos föregående, med hvilken den är tagen tillsammans vid Abusa i September.

17. *P. brevicornis* rufo-testaceus nitidus, glaberrimus, palpis, antennis pedibusque flavis, thorace ovato, postice impresso, antennarum articulo ultimo maximo, reliquis omnibus subæqualibus.

Reichenb. Monogr. Pselaphor. 47, 10. T. I. f. 10.

Bland de minsta arter i släktet, knappt hälften så stor som föregående, i synnerhet mycket smalare. Kroppen vanligen rostfärgad, thorax och elytra något ljusare, antenner, palper och fötter gula. Antennerne knappt en half gång till så långa som hufvudet, med alla lederne nästan lika stora, utom den yttersta, som är ganska stor och utgör mest hela clavan; articulus penultimus föga större än de öfriga. Thorax kort-ägglik, glatt, slät med en tåmmelig djup tvärfåra vid basen. Elytra, som hoplagda formerna nästan en fyrkant, äro glänsande, glatta, släta med tydlig sutural-stria, och fällor vid basen. Abdomens sidokant upphöjd. Femora antica äro korta och tjocka, postica längre och smalare. Vankas med föregående icke sällsynt.

(Fortsättning i en följande Häfte.)



## GRANSKNING

*Af de till Thymelæarum Växtordning  
hörande Slågten och Arter;*

af

JOH. EM. WIKSTRÖM,

Med. Doct.

**E**tt Systeme är den stödjepunct, som fäster våra kunskaper, gifver åt dem ordning, styrka och samband, samt bevisar derigenom sjelft sin nödvändighet; derjemte vittnar det orvifvelagtigt på ett verkeligen tillfredsställande sätt om detta systems förträfflighet, då det förmår uthärda pröfningen af ett helt Århundrade, uti hvars caractere scepticismus intagit ett icke obetydligt rum.

Snart skall örtvetenskapen hugna sig åt denna ovanliga hedor. Under en tid af redan öfver 80 år har den till sitt Systeme och sin uppställningsmethod icke undergått någon väsentelig förändring, då deremot de öfriga erfarenhets-vetenskaper och flera af de intellectuella under samma tid icke sållan vexlat systemer, af hvilka hvarje för sin period oftast varit bedömdt såsom det enda, hvaraf Vetenskapen någonsin kunde vänta sig trefnad.

Örtvetenskapen erhöll detta berömda Sexual-Systeme af Sveriges von Linné, som, ledd af sitt systematiska snille och sin vidsträckta kännedom



af naturalstren, vågade till samtids förvåning och efterverlds beundran att med djerf, men säker och kraftfull hand teckna ett Systema Naturæ. Redan är en längd af år sedan hans bortgång försvunnen, men det ljus han gifvit åt Vetenskapen, den tillgifvenhet och fart, som han åt den beredt, hafva sträckt sin verkan till alla odlade Folkslag och burit ymnig frukt.

Örtvetenskapen har sedan Linnés tid betydligt förkofrat sig genom de mest ifriga och ihärdiga bemödanden af dess idkare. Flera Våxtordningar, som af Linné varit ofullständigt kända t. ex. Palmerna, Orchiderna, Gräsen, Cryptogamerna m. m. fl., hafva blifvit utredda, Mossornas fructification bekant, och en talrik mängd af enskildta slågten och arter närmare bestämda. Våxternas anatomie, physiologie och chemie, förut så föga kända, hafva blifvit mera utarbetade, än man någonsin kunnat hoppas. Låran om Våxternas naturliga frändskaper, denna sköna, men alltid ofulländade målning af Naturen, har blifvit bearbetad utur mera upplysande och för Vetenskapen förmånliga synpuncter. Våxt-geographien, som så mycket upplyser oss om Länders climat, fruktbarhet och förmåga af odling har ur sin linda blifvit utarbetad af tvenne bland vår tids berömdaste och mest förtjente Naturforskare, Humboldt och Wahlenberg. Ändteligen måste man icke förgåta, att då uti Linnés tid endast 10,042 Våxtarter voro kända, utgöra de nu bekanta, enligt Humboldts sednaste beräkningar, ett antal af 44,000, hvilket nog samt vittnar om det nit, som lifvat Vetenskapens Idkare. At nihil ab omni parte beatum.

Genom det stora antal af växter, som i sednare tider blifvit uppträckt, uppkom en ganska märkbar svårighet att riktigt utreda och bestämma de

samma; liksom af sig sjelft uppstod derföre ett critiskt behandlingssätt; men detta tyckes i sanning hafva urartat ända till en viss ytterlighet, som för Vetenskapens redighet, enkelhet och skönhet, må hända äfven för dess gagnelighet, synes blifva skadlig, samt göra den för begynnaren mera otillgänglig. Man började nemligen att utan betänkande såsom att vilja bestämma allt, som visade den obetydligaste förändring i form, beklådning, ja äfven färg; man förglömde Linné's påminnelser om det inflytande, som olika climat, jordmån, årstid, väderlek m. m. utöfva på växterna; man förglömde, hvad man aldrig bort förglömma, medan man så ofta sett det, att en mängd af former icke sällan öfvergå till hvarannan, och hos samma individer finnas olika hvarandra; man förglömde ändteligen, att detta behandlingssätt var stridande mot all physiologisk, sann och redbar kännedom af Natur-alsiren. Osåkra artbeskrifningar tillflödade beständigt, synonymien blef ett chaos, som aldeles förskräcker, och af den skyndsamhet, hvarmed Botanisterna liksom med hvarannan täflade att kungöra sina fynd, föranledes man att tro, att flera af dem mera syftat åt åran af botanisk ryktbarhet, än att de till sitt föremål verkligen haft Vetenskapens sannskyldiga vinning.

Den hedern tillhör Herr Doct. Wahlenberg, att hafva visat hela orimligheten af ett dylikt växternas bestämningssätt, och genom sina skrifter lärt oss, att en habituell behandlingsmethod af växterna, som tillika bedömer deras mångfaldiga föränderligheter utur en physiologisk synpunkt, och icke förgäter en förnuftig kritik, såkrast leder till den yttre kännedom af dem, hvilken, icke stridande mot den inre, är nödvändig för att efter ett Systeme kunna igenfinna dem.

De Botanister finnas, hvilka säga sig tro, att Vetenskapen, i anseende till oredan med arbestämningarne, gått tillbaka sedan Linné's tid. Men denna förmodan kan man, utan fara för miss-tag, rent ut förklara för orimlig, då man besinnar, hvilken betydande förkofran växternas så väl yttre som inre kannedom vunnit sedan nämde tid.

Nu mera kan man dock troligen icke framställa ett så redigt och skönt Species plantarum, som det, hvilket v. Linné förmådde att gifva oss, emedan växt-arternas antal så otroligen ökat sig, och Synonymien blifvit så vidlöftig och intrasslad; af samma orsaker kan väl icke eller någon enskildt Man mera utarbета detta Verk så, som Linné kunde; det borde nu mera blott företagas af ett Samfund Botanister, hvilka, endast betraktande Vetenskapens redbara vinning och ägande tillgång till de förnämsta Örtsamlingar och Bibliotheker, hvar för sig utarbetade vissa Genera, Ordningar eller Classer. På detta sätt skulle man kunna erhålla ett Species Plantarum, icke så enkelt, som Fader Linné's, men dock både godt och brukbart.

Vi hafva redan erhållit betydliga bidrag till ett dylikt arbete, och då jag ågt tillfälle att granska många arter af *Thymelæarum* Växtordning, har jag sökt att närmare bestämma dem, och önskar åt min afhandling derom ett rum uti Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar.

Vördnadsfullt betygar jag min förbindelse för den välvilja, som vid denna Afhandlings utarbetande mig blifvit visad af Herr Profess. och Com-mend. Thunberg, Herr Commerce-Rådet och Ridd. Casström, Herr Kammar-Rätts-Rådet och Ridd. Billberg, Herr Prof. och Ridd. Acharius, Herr Profess. Ad. Afzelius, Herr Prof. Agardh

och Herr Demonstr. Doct. Wahlenberg, hvilka Herrar tackts lemna mig ett fritt tillträde till sina Bibliotheker och Samlingar, utom hvilken förmån jag i sanning icke kunnat utarbeta denna Afhandling. För en mängd af upplysande och viktiga underrättelser från Vahls Örtsamlingar har jag att tacka Herr Prof. och Ridd. Horneman, som med stor bevägenhet och en utmärkt liberalité gynnat mitt företag. Kongl. Inspect. Herr Fr. Otto har ock vänskapsfullt meddelt mig många upplysningar rörande dessa Växter, hvarföre jag betygar min skyldiga tacksägelse.

### Om *Thymelæarum* Växtordning i allmänhet.

Von Linné, som aldrig hann att fullständigt utarbeta sin uppställning af Växternas naturliga Ordningar, kallade uti sin *Philosophia Botanica* dessa Växter *Vepreulæ*, men hopförde ganska olikartade Genera, hvaraf synes, att han då för tiden ännu icke ägde några bestämda kännetecken för denna växtordning. Uti sina *Prælect. in Ordin. Nat. Plantar.* uppställde han likväl Genera mera naturenligt, men uppgaf icke några kännetecken för dessa växter. Omsider fick läran om växternas naturliga frändskaper en större förkofran, då Jussieu år 1789 utgaf sina *Genera Plantarum*. Han kallade dessa Växter *Thymelææ* och från deras närmaste grannar, *Proteacææ* och *Elæagnoidææ*, distinkuerade han dem: Ovario libero, perispermio nullo, radícula superiori. Gärtner d. å. förklarade uti sitt förträffliga Verk *de fructib. et seminib. Plantar.*, att hos de flesta *Thymelæarum* Genera fanns perispermium (s. albumen), hvilket väl var stridande mot Jussieu's definition, men icke destomindre grun-



dadt enligt sednare Författares vitsord. Uti Annales du Museum Tom. V. p. 223 har Jussieu vidare gifvit anmärkningar till Gärtner's beskrifning om Thymelæarum frukter och frön. Hr Rob. Brown har uti sin Prodr. Fl. Nov. Holland. bekräftat Gärtner's anmärkning angående albumen och säger, att den antingen är nullum aut tenue carnosum \*). — Då Hr Brown så förträffligt bestämt denna Växtordnings kännetecken, att förmodeligen dervid intet kan tilläggas, anser jag aldeles onödigt att här upprepa de samma; jag vill blott erinra, att flera Författare dessutom afhandlat denna Växtordnings kännetecken uti sina arbeten om Ordin. Nat. Plantar., såsom Ventenat uti sin Tabl. du Regne Veget., hvarest han kallar dessa växter *Daphnaceæ*; Batsch uti sin Tabula Affinitatum Regni Vegetab. och Jaume de Saint Hilaire uti sin Exposit. des Fam. Nat. des Plantes. Sluteligen kan nämnas, att Prof. L. C. Treviranus uti sin skrift von der Entwicklung des Embryo und seiner Umhüllungen im Pflanzeney ganska vidlöfvt afhandlat Anatomien af *Daphnes Mezerei* frukt.

*Om de släkten, af hvilka Thymelæarum växtordning består.*

Von Linné uppräknar uti sina Prælect. in Ord. Nat. plantar. följande genera såsom hörande till Veprecularum ordning: *Struthiola*, *Dirca*, *Daphne*, *Gnidia*, *Stellera*, *Passerina*, *Lathnæa*, *Quisqualis*, *Doris* och *Thesium*. Bergius skilde från *Gnidia* några

\*) Jemför Gärtner fil. Suppl. Carpolog. 3. 3. p. 199, hvarest säges: "quod quidem in his stirpibus albumen adest semper, at in laminam carnosam integumenti nonnumquam attenuatum."

några arter, af hvilka han formerade *Nerandrea* slägte, hvilket likväl alla sednare Författare åter förenat. Banks och Solander bestämde *Pimela* slägte, hvars arter förut varit förda till *Passerina*. Jussieu uteslöt *Therium*, tillade *Lagetta* och *Cansiera*, samt förmodade, att äfven *Scopolia* hörde hit. Ventenat \*) uteslöt *Cansiera* och *Quisqualis*. Lamarck tillade *Drapetes*, som kanske blott är en *Passerinae*. art. Prof. Thunberg förenade *Lachnaea* med *Passerina*. Smith har förklaradt, att *Copura* Linn. Suppl. är en art af *Daphne*, och att *Scopolia* äfven tillhör nämnde slägte. Pal. de Beauvois beviste uti sin *Flore d'Oware et de Benin*, att *Quisqualis* hörde till *Onagrarie* ordning. Jaume de St Hilaire upptog bland *Thymelaerne* äfven *Ariona* Cavan., men då detta slägte är ganska ofullständigt känt, kan jag ej här anföra det. Jussieu har ytterligare uti *Annales du Mus. T. VII* p. 479 yttrat, att *Conospermum* och *Drapetes* höra till *Thymelaerne*, men att *Quisqualis* enligt Pal. de Beauvois's undersökning bör uteslutas; Hr Brown beviste likväl sedermera uti Linn. *Transact. X.* p. 153, att Smith rätteligen fört *Conospermum* till *Proteaceae*. Sluteligen har jag af tvänne *Pimela* arter bestämt ett nytt slägte, *Thecanthes*, och förenat *Stellera* med *Passerina*.

Släkternas characterer har jag sökt att närmare bestämma och uppställer dem här sålunda:

#### *Diandria.*

1. *Thecanthes*: Cal. monoph. infundibuliformis, quadrifidus: Corollis plurimis intra calycem

\*) Då jag ej äger Ventenats bok, kan jag ej säga, af hvad skäl han utesluter *Cansiera*.

sparse sedentibus, monopetalis, infundibuliformibus, quadrifidis, marcescentibus. *Nux* monosperma.

2. *Pimela*: Cal. o. Cor. monopet. infund. 4-fida, marcescens. *Nux* monosperma.

#### *Tetrandria.*

- ✠ 3. *Drapetes*: Cal. o. Cor. monopet. infund. 4-fida marcescens. *Nux* monosperma.  
 4. *Cansiera*: Cal. o. Cor. monopet. urceolata, 4-fida. Nectar. 4 germen cingentia. *Drupa* fida monosperma.  
 5. *Struthiola*: Cal. diphyll. Cor. monopet. infund. 4-fid. marcesc. *Squamulæ* faucis 4 - 12. *Nux* monosperma.

#### *Octandria.*

- ✠ 6. *Lagetta*: Cal. o. Cor. monopet. infund. 4-fida, gland. l. faucis 4. *Drupa* monosperma.  
 7. *Daphne*: Cal. o. Cor. monopet. infund. 4-fida decidua. *Drupa* monosperma.  
 8. *Dirca*: Cal. o. Cor. monopet. infund. elimbis s. margine obsolete crenata. *Drupa* monosperma.  
 9. *Gnidia*: Cal. o. Cor. monopet. infund. 4-fida, marcesc. *Squamulæ* faucis. 4 - 8. *Nux* monosperma.  
 10. *Passerina*: Cal. o. Cor. monopet. infund. 4-fid. marcescens. *Nux* monosperma.

#### *Decandria.*

11. *Dais*: Invol. 4 - 5 phyll. Cal. o. Cor. monopet. infund. 4 - 5 fid. marcescens. *Bacca* (*Nux*?) monosperma.

---

*Obs.* Plantas in hac dissertatione cruce (✠) notatas haud vidi.

*Diandria.*

## I. THECANTHES, mihi.

Nomen hujus generis derivavi a Θήκη, vagina s. pharetra, & ἄνθος, flos, quoniam flores plurimi intra calycem adsunt, quasi tela in pharetra. Flores intra calycem sparse sedentes, pedicellati, pedicellis dilatatis, membranaceis. *Corolla* infundibuliformis, quadrifida. *Nux* monosperma, omnino ut in *Pimelea*.

Cel. Viri Vahl & Brown perianthium harum stirpium involucrum appellarunt, at verum involucrum non est, respectu insertionis florum in ipso; itaque perianthium hocce simpliciter calycem nominavi.

Mirum omnino, quod Cel. Brown, hasce species a *Pimelea* haud separaverit, dum tamen diversitas earum respectu calycis, qui in *Pimelea* deest, primo jam intuitu omnibus patet, & ad earum separationem urget.

1. *T. Cornucopiæ*: laciniis calycis semi-lanceolatis acutis.

*Pimelea Cornucopiæ* Banks & Solander Msc. Vahl. En pl. 1. p. 305. Dryand. Chlor. Nov. Holl. in Kon. & Sims Ann. of. Bot. II. N:o VI. p. 505. Brown Pr. Fl. Nov. Holl. 1. p. 359. Roem & Schult. Syst. Veg. 1. p. 271.

Hab. ad Bustard Bay, Cape Grafton & Endeavour River Novæ Hollandiæ: Banks & Solander, sec. *Dryand.* l. c. Ad oras australes intra Tropicos Novæ Hollandiæ: Brown.

*Herba* certe annua, radice parva, fusiformi, fibrosa. *Caulis* glaber, paucos ramulos emittens. *Folia* opposita, rarius sparsa, lanceolata, acuminata, infima ad basin caulis sæpe cuneiformia & obtusa, brevissime petiolata, integerrima, punctata, glabra,



læte viridia. 6 - 15 lineas longa, medio duas l. res lata. *Petioles* vix lineam longi, glabri. *Pedunculi* ramulos terminantes, solitarii, longissimi, glabri, incrassati, in calyceem continuati s. dilatati, extus nullam separationem harum partium exhibentes. *Calyx* magnus, monophyllus, infundibuliformis, quadrifidus, glaber, 7 lineas circiter longus & ad basin laciniarum, ubi latissimus, 4 circiter latus, rubicunde flavus: *laciniæ calycis* semilanceolatæ, acutæ, unam cum dimidia lineam longæ. *Flores* intra calycem ubique sparsi, plerimi, pedicellati, superiores calycem paullo excedentes, glabri, flavi. *Pedicelli* dilatati, complanati, membranacei, rubicunde flavi, glabri, unam l. duas lineas longi. *Corolla* reticulata, 3 - 4 lineas longa, persistens: *Laciniæ corollæ* minutæ, lanceolatæ, obtusæ, longitudine circiter tertiæ lineæ partis. *Stamina* duo, ad basin laciniarum inserta: *Filamenta* exserta, longitudine laciniarum; *Antheræ* suborbiculatæ, biloculares, luteæ. *Germen* oblongum, glabrum; *Stylus* lateralis, exsertus, longitudine staminum; *Stigma* capitatum. *Nux* ovata: *membrana externa* tenuis, viridis; *testa* nigra, nitida; *semen* lanceolatum, flavum.

2. *T. punicea*: laciniis calycis semiorbiculatis obtusis.

*Pimelæa punicea* Brown pr. Fl. Nov. Holl.

I. p. 359.

Hab. in Carpentaria & Terra Arnhem intra Tropicos Novæ Hollandiæ: Brown.

*Herba* certe etiam annua, priori quoad caulem & folia valde similis, differt vero: *foliis* sæpius brevioribus, 6 - 10 circiter lineas longis, inevidentius punctatio; *calyce* minori, 4 circiter lineas longo, puniceo: *laciniis calycis* semiorbiculatis, obtusis, brevioribus; *corolla* paullo brevior; *stylo* brevior.

re; *stigmatē* obtuso; dum in *T. cornucopiæ* folia sæpius longiora, 6-15 lineas longa, evidenter punctata; *calyx* major, 7 circiter lineas longus, rubicundiflavus: *lacinia calycis* semilanceolata, acuta, longiores; *corolla* paulo longior; *stylus* longior; *stigma* capitatum. In cæteris conveniunt.

## 2. PIMELEA, Banks & Soland.

Genus hocce nomine *Banksia* primum descripserunt utrique Forster, dein ad *Passerinam* illud revocavit von Linné fil. Cel. Gmelin vero *Cookiam* nominavit. Interea Illustriss. Viri Banks & Solander longe jam ante Cel. Gmelin hocce genus in Msc:is suis *Pimeleam* vocabant a *πιμελής*, pinguis \*), quoniam fructus pinguis videntur, Cel. Gærtner nomen a Banksio datum primum publicavit. A *Passerina* tantum differt staminibus duobus, itaque huic Generi rectius adnumerandum, & animus valde inclinatur, duas sectiones *Passerinæ* formare, quarum una stamin. duo, altera stamin. haberet octo l. plures; at hoc facere aliis relinquo. Cum species *Passerinæ* jam satis numerosæ sint, ut earum definitiones magnas habeant difficultates, commode forsitan erit, eas separatas retinere, quamquam inconsequenter actum videatur. Sectiones in hoc Genere a Cel. Brown formatæ, haud constantes sunt; dum vero meliores haud substituere potui, eas retinui. In definitionibus meis ab illis a Cel. Brown datis respectu terminorum botanicorum discessi, ex quo in hac dissertatione dissimilitudo oritur, quam haud corrigere valeo, dum tantum 20 species vidi *Pimelearum*.

\*) "It is derived from *πιμελή*, fat, but is rather a pleasantly sounding, than a very apt denomination, unless there may be any thing oily in the recent fruit." Smith bot. of new Holl. 1. p. 32.

1. *Folia opposita. Capitulum terminale. Involucrum foliis rameis dissimile. Br.*

- † 1. *P. collina* Br. involucris tetraphyllis: foliolis ovatis utrinque glabris capitulum subæquantibus, perianthii tubo sericeo, foliis decussatis lineari-oblongis trinerviis subsessilibus. Brown pr. Fl. Nov. Holl. 1. p. 359. Roem. & Schult. Syst. Veg. 1. p. 272.

Hab. intra Tropicos Nov. Hollandiæ: Brown. — b.

2. *P. linifolia* Smith: involucris tetraphyllis: foliolis ovatis acutis glabris capitulo dimidio brevioribus, corollis sericeis: laciniis corollæ lanceolatis obtusiusculis, foliis lanceolatis cuneiformibusve brevissime petiolatis acutis mucronatisve.

*P. linifolia* Smith Spic. Nov. Holl. 1. p. 31. t. II. Willd. Sp. Pl. 1. p. 51. Vahl l. c. p. 305. Pers. Syn. 1. p. 16. Brown l. c. *P. filamentosa* Rudge in Linn. Transact. X. p. 287. t. 14. f. 2. *P. involucrata* Banks & Soland. Msc. *Passer. involucrata* Thunb. Mus. Nat. Acad. Ups. P. XIII p. 106. & *P. inv.* β Ejusd. Mus. Nat. Append. P. XXII. p. 32.

Hab in Nova Cambria: Banks & Solander sec. Herb. Thunb. In Norfolk Island; Smith sec. Herb. cit. Ad Port Jackson & in insula van Diemen Nov. Hollandiæ: Brown. — b.

Obs. *P. filamentosa* Rudge certe eadem, quamquam folia sessilia descripsit.

- † 3. *P. cernea* Br. involucris tetraphyllis: foliolis ovatis utrinque glabris capitulum subæquantibus, perianthio supra articulationem pilosiusculo, foliis spathulato-linearibus. Brown l. c. Roem. l. c.

*P. spathulata* Labillard. Nov. Holl. pl. Spec. 1. p. 9. t. 4? sec. Brown l. c.

Hab. in insula van Diemen Nov. Hollandiæ: Labillardière & Brown. — b.

- † 4. *P. brevifolia* Br. involucris tetraphyllis: foliolis ovatis capitulo  $\frac{1}{2}$  brevioribus: interioribus intus villosiusculis, perianthiis supra articulationem pilosiusculis, foliis linearibus internodio vix longioribus. Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. ad oras meridionales Nov. Holl. Brown. — b.

- † 5. *P. paludosa* Br. involucris tetraphyllis: foliolis ovatis intus subsericeis capitulo dimidio brevioribus, perianthii tubo sericeo, foliis linearibus internodio longioribus. Brown l. c. p. 360. Roem. l. c.

Hab. ad Port Jackson Nov. Holl. Brown. — b.

- † 6. *P. angustifolia* Br. involucris tetraphyllis: foliolis orbiculato ovatis intus subsericeis capitulo vix dimidio brevioribus, perianthiis sericeis: basi persistenti hirsutissima, foliis linearibus internodio longioribus. Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. ad oras merid. Nov. Holl. Brown. — b.

7. *P. glauca* Br. involucris tetraphyllis: foliolis ovatis acutis pari interiore intus pubescentibus ciliatisque, corollis supra articulationem sericeis, basi nudiusculis: laciniis corollæ lanceolatis obtusiusculis, foliis lanceolatis acutiusculis glaucis.

*P. glauca* Brown l. c. Roem l. c. Rudge in Linn. Trans. X, p. 286. t. 13. f. 2.

Hab. ad oras merid., Port Jackson & in insula van Diemen Nov. Holl. Brown. — b.

8. *P. ligustrina* Labill. involucris tetraphyllis: foliolis ovatis acutis venosis intus pubescentibus, corollis sericeis: laciniis corollæ oblon-



gis obtusis, foliis ovalibus lanceolato-oblongisve obtusis venosis.

*P. ligustrina* Labillard. l. c. p. 9. t. 3.  
Brown l. c. Roem l. c.

Hab. in Insula van Diemen: Labillardière; &  
ad Port Jackson Nov. Holl. Brown. — ♀.

† 9. *P. decussata* Br. involucris tetraphyllis: foliolis late ovatis semicoloratis utrinque glabris, perianthii tubo hispido, foliis decussatis ovalibus coriaceis. Brown l. c. Roem l. c.

*P. ferruginea* Labillard. l. c. p. 10. t. 5.  
sec. Brown.

Hab. in terra van Leuwin: Labillardière. Ad  
oras meridionales Nov. Holl.: Brown. Ad west  
Coast Nov. Holl.: Menzies sec. Dryand. in  
Ann. of bot. l. c. — ♀.

† 10. *P. rosea* Br. involucris tetraphyllis: foliolis lanceolato-ovatis acutis utrinque glabris, perianthii tubo inarticulato: dimidio inferiore hispido, foliis lanceolato-linearibus. Brown  
l. c. Roem. l. c. Sims bot. Mag. t. 1458.  
Loddig. bot. Cab. IX. N:o 88.

Hab. ad oras merid. Nov. Hollandiæ: Brown. — ♀.

† 11. *P. hispida* Br. involucris tetraphyllis: foliolis ovatis margine simplici intus subsericeis capituli dimidio brevioribus, perianthii tubo dimidio inferiore hispido, foliis lanceolatis linearibusve Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. ad oras Merid. Novæ Hollandiæ: Brown. — ♀.

† 12. *P. lanata* Br. involucris tetraphyllis: foliolis ovatis margine membranaceo intus sericeis capitulum subæquantibus, perianthiis longitudinaliter hispidis, foliis lanceolatis. Brown  
l. c. Roem. l. c.

Hab. ad oras merid. Nov. Hollandiæ: Brown. — ♀.

## II. Folia opposita. . Capitulum terminale.

*Folia floralia rameis subsimilia. .Br.*

- † 13. *P. pauciflora* Br. foliis utrinque glabris linearilanceolatis: floralibus binis latioribus capitulum pauciflorum superantibus, perianthiis glabris, receptaculis nudis. Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. in Insula van Diemen Nov. Hollandiæ: Brown. — b.

- † 14. *P. serpyllifolia* Br. foliis utrinque glabris obovatis ovalibusque: floralibus quaternis capitulo paucifloro longioribus, perianthiis glabris, receptaculis villosis. Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. ad oras merid. Nov. Hollandiæ: Brown. — b.

15. *P. prostrata* Banks et Soland. foliis ovalibus oblongisve minutis obtusis glabris, floralibus quaternis, floribus terminalibus aggregatis villosiusculis: laciniis corollæ oblongis obtusis.

*P. prostrata* Banks et Soland. Msc. Willd. Sp. Pl. l. p. 51. Lam. Ill. Gen. I. p. 31. t. 9. f. 1. *P. lævigata* Gærtn. de Fruct. I. p. 186. t. 39. f. 1. *Banksia prostrata* Forst. Char. Gen. p. 8. Forst. jun. in Act. Ups. III. p. 175. *Passerina prostrata* Linn. Suppl. p. 227. *Cookia prostrata* Gmel. Syst. Nat. — p. 241.

β: ramulis villosioribus, foliis magis elongatis acutioribus, floribus villosis.

Hab. in montibus aridis Novæ Zelandiæ: Forster jun. — b.

16. *P. sylvestris* Br. ramulis glabris, foliis lanceolatis acutis glabris, floralibus ovatis lanceolato ovatisve 4—senisve acuminatis, co-

rollis glabris eximie articulatis: laciniis corollæ lanceolatis acuminatis obtusiusculis.

*P. sylvestris* Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. ad oras merid. Nov. Hollandiæ: Brown. — b.

17. *P. humilis* Br. ramulis pubescentibus, foliis lanceolatis oblongisve obtusis glabris, floralibus ovatis intus pubescentibus, corollis sericeis: laciniis corollæ lanceolatis obtusiusculis.

*P. humilis* Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. in Insula van Diemen Novæ Hollandiæ: Brown. — b.

18. *P. flava* Br. foliis obovatis orbiculatisve glabris, floralibus quaternis capitulo longioribus, corollis pubescentibus: laciniis corollæ minutis oblongis obtusis.

*P. flava* Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. ad oras merid. et in Insula van Diemen Novæ Hollandiæ: Brown. — b.

Obs. Flores certe vel monoici l. dioici.

- † 19. *P. microcephala* Br. foliis utrinque glabris lineari lanceolatis acutis: floralibus lanceolatis capitulo paucifloro longioribus, perianthiis pubescentibus Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. ad oras merid. Nov. Hollandiæ: Brown. — b.

20. *P. Gnidia* Banks et Soland. foliis oblongis lanceolatisve acutis coriaceis glabris, floralibus ovatis oblongisque, corollis villosis: laciniis corollæ oblongis obtusis.

*P. Gnidia* B. & S. Msc. Willd. Sp. Pl. I. p. 50. Vahl, Pers. Roem. l. c. — *Banksia*

*Gnidia* Forst. l. c. p. 8. t. 4. f. a — i.

Forst. jun. l. c. *Passerina Gnidia*, Linn.

Suppl. p. 226. *Cookia Gnidia* Gmel. l. c.

Hab. ad Dusky bay Novæ Zelandiæ ad fissuras rupium in litore maris, reperitur quoque in

boreali parte hujus insulæ in summis montium cacuminibus: *Forster* jun. — b.

21. *P. clavata* Labill. foliis lanceolatis acuminatis subtus pubescentibus, capitulo longe pedunculato, corollis villosis: laciniis corollæ minutis oblongis obtusis.

*P. clavata* Labillard. l. c. p. 11. Br. l. c. Roem. l. c.

Hab. in Insula van Diemen: *Labillardière*; ad oras merid. Novæ Hollandiæ: Brown. — b.

Obs. omnes, quas dissecavi, flores hermaphroditi fuerunt; dixit tamen Cel. Brown, flores dioicos esse. Nulla folia floralia in hac specie vidi.

- † 22. *P. imbricata* Br. foliis lineari oblongis imbricatis subtus pubescentibus: adultis glabris; floralibus numerosis utrinque sericeis, perianthiis hirsutissimis. Brown. l. c.

Hab. ad oras merid. Nov. Hollandiæ: Brown. — b.

Obs. sec. diagnosi *P. virgatæ* Vahl. & *pilosæ* B. & S. affinis videtur.

23. *P. longiflora* Br. foliis linearibus obtusis extus pilosiusculis oppositis sparsisve, adultis glabris, involucralibus lanceolatis, corollis sericeis: laciniis corollæ lanceolatis acuminatis.

*P. longiflora* Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. ad oras merid. novæ Hollandiæ: Brown. — b.

24. *P. octophylla* Br. foliis oblongo linearibus obtusis villosiusculis oppositis sparsisve, involucralibus similibus, corollis hirsutis: tubo limbum quadruplo superante, laciniis corollæ minutis oblongis obtusis.

*P. octophylla* Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. ad oras merid. Novæ Hollandiæ: Brown. — b.

Obs. folia adulta supra glabrescunt.

25. *P. pilosa* Banks et Soland. foliis lanceolatis



oblongisve obtusis subtus pilosiusculis supra glabris, floralibus capitulo paucifloro duplo longioribus, corollis hirsutis: laciniiis corollæ oblongis obtusis.

*P. pilosa* B. et S. Msc. Willd. Vahl. Pers. Roem. l. c. Lamarck III. I. p. 31 t. 9. f. 2. *Bankia tomentosa* Forst. Char. Gen. p. 8. t. 4. f. k—n. *B. pilosa* Forst. jun. in Act. Ups. III. p. 174. *Passerina pilosa* Linn. suppl. p. 226. *Cookia pilosa* Gmel. l. c. p. 241.

Hab. in fruticetis Novæ Zeelandiæ: Forster jun. — b.

26. *P. virgata* Vahl. ramulis villosis, foliis lanceolatis acuminatis supra glabris subtus pilosiusculis, involucribus capitulo terminali axillarique longioribus, corollis hirsutis: laciniiis corollæ oblongis obtusis.

*P. virgata* Vahl. En. pl. I. p. 306. Roem. l. c. *P. axillaris* Banks et Soland. Msc. *Passerina axillaris* Thunb. Mus. Nat. Acad. Ups. P. XIII. p. 100.

Hab. in Nova Zeelandia: Forster sec. Vahl et Herb. Thunb. et Montin. — b.

Obs. a *P. pilosa* B. & S. differt tantum ramis numerosioribus; foliis longioribus & acuminatis nec non floribus pluribus; dum *P. pilosa* ramos habet pauciores; folia magis oblonga, breviora et obtusa, floresque pauciores. Affinis etiam, ut videtur, *P. imbricata* Br. — Ad latera capituli excrescunt ramuli, unde flores, primum re vera terminales, laterales axillaresque tandem evadunt.

27. *P. longifolia* Banks et Soland. caulibus glabris, foliis longissime lanceolatis acuminatisque petiolatis utrinque glabris venosis,

involucralibus capitulo multifloro longioribus; corollis pubescentibus: laciniis corollæ oblongis obusis.

*P. longifolia* Banks et Solander Msc. *Passerina longifolia* Thunb. Mus. Nat. Acad. Ups. App. XXII. p. 32.

Hab. in Nova Zeelandia: Forster sec. Herb. Thunb. et Mont. — *P.*

*Frutex* omnium Pimelearum speciosissimus foliis suis longissimis floribusque magnis. Caules ramique glabri. *Folia* opposita, sæpe decussata, longissime lanceolata et acuminata, brevissime petiolata, integerrima, utrinque glabra, viridia, subtus dilutiora, venosa, superiora breviora, inferiora longiora, pollicaria, bipollicaria et ultra, medio tres quatuorve lineas lata; *floralia* similia, breviora; capitulo duplo longiora. *Petioles* supra canaliculati, subtus convexi, utrinque glabri, dimidiam unamve lineam longi. *Receptaculum* conicum, villosum. *Flores* terminales, aggregati, capitulum formantes, plurimi, sessiles, extus pubescentes. *Corolla* unguicularis, rosea uti videtur: *tubus* 5 fere lineas longus; *laciniæ corollæ* oblongæ, obtusæ, lineam paullo longiores. *Stamina* 2, ad basin laciniarum inserta: *Filamenta* exserta, longitudine laciniarum, rubra; *Anthera* oblongæ, biloculares, luteæ. *Germen* oblongum l. ovatum, glabrum, apice villosum; *Stylus* lateralis, filiformis, exsertus, longitudine laciniarum, ruber; *stigma* capitatum, tenuissime pubescens. *Nux* ovata, glabra, apice villosa: *membrana externa* tenuis; *testa* nigricans; *semen* ovatum l. lanceolatum, flavum.

Species distinctissima & pulcherrima, cujus tamen affinitatem eruere haud potui.

28. *P. sericea* Br. foliis ovalibus ovatisve ob-

tusis imbricatis supra glaberrimis subtus sericeis, floralibus capitulo brevioribus, corollis villosis: laciniis corollae oblongis obtusis.

*P. sericea* Brown l. c. Roem. l. c.

$\beta$ . foliis minoribus ovatis supra glaberrimis subtus villosis, floribus minoribus villosioribus.

*P. villosa* Banks et Soland. Msc. *Passerina villosa* Thunb. Mus. Nat. Acad. Ups. P. XIII. p. 106.

Hab.  $\alpha$  in summo monte tabulari Insulae van Diemen Novae Hollandiae: Brown. —  $\beta$ .

$\beta$  in Nova Zeelandia: Forster sec. Herb. Thunb. et Mont. —  $\beta$ .

Obr. Praeter notas indicatas  $\beta$  haud differt ab  $\alpha$ .

29. *P. cinerea* Br. foliis oblongis lanceolatisve obtusis supra glabris subtus hirsutis incanis, floralibus capitulo paucifloro longioribus, corollis hirsutis: tubo ovato ventricoso, laciniis corollae minutis ovatis obtusis.

*P. cinerea* Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. in Insula van Diemen Novae Hollandiae: Brown. —  $\beta$ .

30. *P. drupacea* Labillard. foliis oblongis lanceolatisve obtusis supra glabris subtus pubescentibus dilutis, floralibus capitulo longioribus, corollis villosis: tubo lineari, laciniis corollae oblongis obtusis, fructu drupaceo.

*P. drupacea* Labillard. l. c. p. 10. t. 7. Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. in Insula van Diemen Novae Hollandiae: Brown. —  $\beta$ .

Obr. Fructus hujus speciei vera est drupa ut in *Daphne*, a quo Genere tantum staminibus differt duobus.

† 31. *P. incana* Br. foliis ovatis distinctis margine

recurvis subtus incano tomentosis supra glabris, ramulis cinereis. Brown l. c. Roem l. c.  
 Hab. in Insula van Diemen Novæ Hollandiæ: Brown. — b.

32. *P. nivea* Labillard. foliis orbiculatis imbricatis margine recurvis supra glabris subtus tomentosis, floralibus similibus capitulo brevioribus, corollis villosis: laciniis corollæ oblongis obtusis.

*P. nivea* Labillard. l. c. p. 10. t. 6. Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. in Insula van Diemen: *Labillardiere* et ad oras merid. Novæ Hollandiæ: Brown. — b.

### III. *Folia opposita. Flores spicati.* Br.

† 33. *P. spicata* Br. foliis ovalibus perianthiisque glabris, spicis nudis, floribus polygamis. Brown l. c. p. 262. Roem. l. c. Rudge in Linn. Transact. X. p. 288 t. 14. f. 2.

Hab. ad Port Jackson Novæ Hollandiæ: Brown. — b.

Obs. Secundum figuram l. c. flores hæc spicati, sed aggregati, uti species sectionis prioris.

### IV. *Folia opposita. Flores axillares.* Br.

† 34. *P. argentea* Br. foliis lanceolatis utrinque argenteis, floribus 2—4 axillaribus. Brown. l. c. Roem. l. c.

Hab. ad oras merid. Novæ Hollandiæ: Brown. — b.

### V. *Folia alterna.* Br.

35. *P. curviflora* Br. foliis lineari-oblongis lanceolatisve obtusis supra glabris subtus ramisque pilis raris adpersis, capitulis terminalibus lateralibusve paucifloris, corollis sericeis: tubo curvato, laciniis corollæ lanceolatis acuminatis.



*P. curviflora* Brown l. c. Roem l. c.  
Rudge in Linn. Transact. p. 285 t. 13. f. 1.  
Hab. ad Port Jackson Novæ Hollandiæ: Brown.  
In Nova Cambria: Rudge. — b.

Obs. Folia et opposita et sparsa, floralia longitudine capituli.

† 36. *P. gracilis* Br. foliis oblongo-linearibus basi attenuatis subtus pilosiusculis: rameis passim oppositis, capitulis lateralibus terminalibusque paucifloris, perianthiis sericeis: tubo rectiusculo; limbo æquali. Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. in Insula van Diemen Novæ Hollandiæ: Brown. — b.

37. *P. latifolia* Br. foliis oblongis basi acuta pubescentibus subtus subsericeis, capitulo multifloro spicato terminali sessili oppositifoliisve pedunculatis, perianthiis villosis. Brown l. c. Roem. l. c.

Hab. ad littora Novæ Hollandiæ intra Tropicos: Brown. — b.

Obs. Quid *Pimelia grandiflora* Donn Hort. Cantabr. edit. 6. p. 5. ?

### † 3. DRAPETES, Lamarck.

Hocce Genus valde dubium est, atque. uti videtur, *Passerina* nimis affine; a quo tantum staminibus quatuor differre videtur. Judicent de hac re autoptæ; ego nec stirpem, nec librum citatum vidi. Originem nominis etiam nescio.

1. *D. muscoides* Lamarck in Journ. d'Histoire Natur. N:o 5. p. 189. t. 10.

Hab. in Magellania: Commerçon sec. Lamarck l. c. — b.  
"Habitu similis *Passerinæ* l. *Gnidæ*." Lam. l. c.

## 4. CANSIERA, Juss. et Lam.

Nomen genericum, ab incolis Indiæ orientalis usitatum, receptum fuit a Cel. viris Jussieu et Lamarck. Quis Eorum fuit, qui Genus primum determinaverit, nescio, dum alter alterum citat. Fructum maturum haud vidi.

1. *C. scandens* Roxb. caule tenuissime tomentoso; foliis ovatis acuminatis petiolatis glabris, racemis axillaribus solitariis binis ternisve, corollis ovatis; laciniis corollæ ovatis obtusis.

*C. scandens* Roxb. Corom. pl. 2. p. 1. t. 103. Trattin. Arch. t. 41. *C. malabarica* Lam. Enc. 3. p. 418. t. 289. *C. Rheedii* Gmel. Syst. Nat. I. p. 280. *Daphne polystachya* Willd. Sp. Pl. II. 1. p. 420. Rheed. Hort. Malab. 7. p. 3. t. 2. et *C. malabarica*  $\beta$  Lam. l. c. *Daphne monostachya* Willd. l. c. Rheed. l. c. t. 4.

Hab. In Malabaria: *Rheede et Sonnerat*. In Coromandelia: *Roxburgh*. In Ceilona: *Prof. Thunberg*. —  $\beta$ .

Caules, petioli, racemi, bractæ et flores eo modo tenuissime tomentosi, ut quasi pulverulento-tomentosi videantur. — *C. malabarica*.  $\beta$ . Lam. certe una eademque species ac ipsa  $\alpha$ .

## 5. STRUTHIOLA, Linn.

Nomen hujus Generis diminutivum est *Struthiæ* a *στροθιον*, passer l. struthio, quoniam Auctores forsan caules longos apice floribus cum penicillis squamarum s. glandularum faucis ornatos rectoribus struthionum comparabant, quæ similitudo nimis est longe petita. Ad glandulas s. nectaria s. squamulas faucis quod attinet, difficile est dictu, quid re vera sint, s. quæ functio sit earum. For-

san. nectaria sicut. Cellulosa impletæ videntur. Species difficillime determinantur, quia valde variant præcipue quoad folia, et mutue fere in se trans-eunt.

\* *Corollis pubescentibus.*

1. *S. virgata* L. foliis lanceolatis acuminatis canaliculatis subamplectentibus striatis, floribus sericeis: laciniis corollæ lanceolatis acuminatis.

*S. virgata* Linn. Mant. pr. p. 41. Lam. Ill. I. p. 315. Hoult. Pl. Syst. 5. t. 41. f. 2. *S. virgata* γ & ζ Thunb. Mus. Nat. Acad. Ups. App. XI. p. 4. Burm. Afr. p. 127. t. 48. f. 1. mala. *S. longiflora* Lam. Ill. p. 215. f. 78? — *S. ciliata* Andr. Rep. t. 139 & 149 sec. Ait. Hort. Kew. ed. 2. T. 1. p. 271. Lam. l. c. (excl. *Synon. Passerina ciliata*). Burm. Afr. p. 129. t. 47. f. 2.

*S. pubescens* Retz. Obs. bot. 3. p. 26. — Bot. Magaz. t. 1212. sec. Ait. Hort. Kew. l. c. *S. virgata* Smith exot. bot. p. 89 t. 46.

*Caules* nunc simplices, nunc ramosi. *Folia* mirifice variant; nunc majora s. latiora, nunc minora s. angustiora, superiora convexa, imbricata, subamplectentia et ciliata, inferiora plana, distantia & omnino glabra. Verbo, vix duo specimina similia reperies.

*S. virgata* L. et *S. pubescens* Retz. una eademque est planta, et quod de proportionem bractearum (s. foliolorum calycis) ad germen in Horto Kew. est locutum, nullo modo constans est, itaque omnia synonyma huc retuli.

Sec. Cel. Dryander (Linn. Transact. II. p. 234) pertinet descriptio *Passerina* 2 Hort. Cliff. p. 146 ad *Struthiolam virgatam*, et non ad *Passerinam ciliatam*, ut dixit ipse von Linné.

*S. ciliata* Lam. et Andr. major tantum stirps foliis majoribus, superioribus pulchre ciliatis.

In omnibus speciebus hujus sectionis rami superne sunt pubescentes, inferne glabri.

β: foliis latioribus l. ovato lanceolatis arcte imbricatis.

*S. virgata* ε Thunb. Mus. Nat. Acad. Ups. App. XI. p. 4.

Rami eximie cicatrisati, et ramuli interdum illos Ipecacuanhæ fuscae mirum in modum referunt.

γ: foliis omnibus linearibus obtusis planiusculis extus subtrinervatis, haud amplectentibus.

*S. virgata* β. Thunb. Mus. Nat. Acad.

Ups. P. XIII. p. 106. — *S. tuberculosa* Herb. Vahl, non vero Lamarckii.

Occurrit in Herb. Vahl. specimen hujus stirpis a Lamarck datum, sub nomine *S. tuberculosa*, at vera *S. tuberculosa* haud est, quia jam Lamarck et ulterius Roemer flores uti glabros descripserunt.

δ: foliis omnibus linearibus obtusis planiusculis glaucis superioribus extus pubescentibus.

*S. erecta* β Thunb. Mus. Nat. Acad.

Ups. P. XIII. p. 106. *S. villosa* Herb. Vahl.

ε: ramulis incano-villosis, laciniis corollæ suboblongis obtusis.

*S. incana* Loddig. bot. Cab. II. N:o 11.

*S. virgata* δ Thunb. Mus. Nat. Acad.

Ups. App. XI. p. 4.

Hab. "in campis sabulosis, in lateribus montium prope Hex Rivier, in Lange Kloof, prope Wolwekraal et alibi ad Promontor. bonæ spei": Prof. Thunberg. — β.

2. *S. lucens* Poir. foliis lucidis glaberrimis lanceolato-acuminatis, ramis erectis, corollis folium æquantibus, Poiret Enc. bot. VII. p.



477. *S. ciliata*  $\beta$  Lam. Illustr. I p. 315.  
sec. Roem. et Schultes syst. Veg. 3. p. 332.

Hab. ad Promont. bonæ spei. —  $\beta$ .

"Affinis *S. cilinta*. — *Tubus pubescens*" Roem.  
et Schult. l. c. Dubia species et a *S. virgata* L. ve-  
rosimillime haud diversa.

3. *S. villosa*: ramulis villosis, foliis ellipticis  
acutis extus trinervatis convexis albo-hirsu-  
tis, floribus pubescentibus: laciniis corollæ  
lanceolatis acuminatis.

*S. tomentosa* Andr. Rep. t. 334?

*S. chrysantha* Lichtenstein in Roem. & Schult.  
Syst. Veg. 3. p. 333?

Hab. ad Promont. Bonæ spei.  $\beta$ . (Herb. Vahl.  
& Cassin.)

*Frutex* ramulis superne villosis inferne glabris.  
*Folia* elliptica s. lato-lanceolata, 3—4 lineas longa  
quasque lata. *Flores* villosi s. pubescentes. *Calycis*  
*foliola* lineari-lanceolata, obtusa, extus villosiuscula.  
*Squamula* faucis 12.

4. *S. striata* Lam: ramulis pubescentibus, foliis  
ovatis, junioribus lanceolatis, acutis imbri-  
catis extus eximie nervosis, floribus sericeis:  
laciniis corollæ lanceolatis acuminatis.

*S. striata* Lam. Illustr. I. p. 215 sec.  
specim. in Herb. Vahl. — *S. imbricata*  
Andr. Rep. t. 113. — *S. lateriflora* Hor-  
nem. Hort. Hafn. II. p. 855 sec. spe-  
cim. — *S. sulcata* Schmidt in Neue und  
selten. Pflanz.? vid Uster. Annal der  
Bot. 6 stück. p. 120.

Hab. ad Promont. Bonæ spei.  $\beta$ .

*Frutex* ramis superne pubescentibus, inferne  
glabris. *Folia* adulta ovata, l. sæpe lanceolata et  
margine ciliata, eximie nervosa ut sulcata fere.

*Calycis foliola lanceolata, acuminata, margine ciliata.*  
*Squamulae faucis quatuor.*

*S. lateriflora* Hornem. eadem omnino est ac  
*S. striata* Lam. foliis inferioribus lanceolatis, acu-  
 minatis, superioribus ovatis.

**\*\* Corollis glabris.**

5. *S. erecta* L. caule glabro, foliis lanceolatis  
 acutis acuminatisve glabris, floribus glabris:  
 laciniis corollae lanceolatis acuminatis.

*S. erecta* Linn. Mant. pr. p. 41. Wendl.

Obs. bot. p. 9. t. 2. f. 10. Loddig. bot.

Cab. VIII. N:o 74. — *S. erecta* α et γ

Thunb. Mus. Nat. Acad. Ups. P. XIII. p.

106. *S. pendula* Salish. Hort. Allert. p. 282.

*S. tetragona* Retz. obs. bot. 3. p. 25. *S.*

*subulata* Lam. l. c. ? *Nectandra tetrandra*

Berg. Pl. Cap. p. 133. *Passerina tetragona*

Linn. Sp. Pl. l. p. 513.

*S. juniperina* Retz. obs. bot. l. c. Curt. Mag.

t. 222. Loddig. bot. Cab. l. c. N:o 75.

Ait Hort. Kew. ed. 2. Tom. I. p. 271.

Hab. "in campis extra Cap et alibi ad Promont.  
 bonae spei": Prof. Thunberg. — b.

*Caules* superne quadranguli, inferne teretes, gla-  
 bri. *Folia* lanceolata l. linearia, acuta l. acumi-  
 nata, inferiora planiuscula, superiora convexiuscula.  
*Squamulae* faucis octo.

*S. juniperina* Retz. tantum junior certe stirps  
 est *S. erectae*. *Foliola calycis* paullo longiora quam  
 in *S. erecta*, quod tamen inconstans est & nullius mo-  
 menti, dum de caetero non differunt. *Antherae* etiam  
 in utraque inclusae. — Dicunt quidem Horticulto-  
 res, ramos in *S. juniperina* laxos et nutantes esse,  
 at in *S. erecta* firmiores et erectos; ego vero nullam

vidi *S. juniperinam*, quam a *S. erecta* diversam habere potui.

Credibile est, *S. subulatam* Lam. huc pertinere.

Occurrit in Herb. Vahlîi *Struthiola* sub nomine *S. angustifolia*, a Lamarck data, quæ eadem omnino est ac *S. erecta* Linn.; dum vero ipse Lamarck in *Illustr. I. p. 315* *S. angustifolium* inter species corollis extus hirsutis enumerat, certe a *S. erecta* L. est diversa. Dixit etiam Cel. Roemer, quod tubus corollæ pubescens sit; nec umquam variationem quoad glabritiem vel pubescentiam corollæ *Struthio- larum* observavi, quamquam de cætero magnopere variant stirpes memorati.

6. *S. ovata* Thunb. caule glabro, foliis ellipticis lanceolatis ovatisve acutis glabris, foliolis calycis floribusque glabris: laciniis corollæ lanceolatis acuminatis.

*S. ovata* Thunb. pr. Fl. Cap. I. p. 76.

Ait. Hort. Kew. ed. 2. T. I. p. 271.

Andr. Rep. t. 119. *S. lanceolata* Reiz.

l. c. — *S. myrsinites* Lam. l. c. sec. specim. in Herb. Vahl.

Hab. ad Promont. bonæ spei: Prof. Thunberg. — b.

*Frutex* ab omni parte glaber. *Folia* 4—6 lineas longa, duasque lata. *Flores* folio duplo fere longiores, itaque longissimi. *Folia* calycis rarius margine pubescentia. *Squamulæ* faucis octo.

7. *S. hirsuta*: caule hirsuto, foliis ellipticis ovatisve acutis extus hirsutis, foliolis calycis pubescentibus, floribus glabris: laciniis corollæ lanceolatis acutis.

*S. ovata* β Thunb. Mus. Nat. Acad. Ups. P. XIII. p. 106.

Hab. ad Promontor bonæ spei: Prof. Thunberg. — b.

Differt de cætero a *S. ovata* Thunb.: foliis minoribus magisque approximatis sæpe sparsis, quod in præcedentē vix vidi; floribus omnibus fere brevioribus minoribusque: laciniis corollæ brevioribus.

8. *S. Vahlī*: caule glabro, foliis oppositis ovato-lanceolatis acuminatis amplexantibus, floribus glabris: laciniis corollæ lanceolatis acuminatis.

*S. subulata* Vahl. Herb., minime (verb. Lamarckii.

Hab. ad Promont. bonæ spei. b. (Herb. Vahl. & Swartz.).

Frutex *S. ovata* Thunb. valde affinis, differt: foliis ovato-lanceolatis, amplexantibus, longioribus subulatoque acuminatis; floribus brevioribus; dum *S. ovata* folia elliptica l. lanceolata, breviora, acuta, haud amplexantia; flores longiores.

Invitus re vera hanc speciem a *S. ovata* distinguo, at habitus stirpis diversus & forma foliorum aliena nec non insertio me ad earum separationem coëgit.

*Dubiæ:*

- † 9. *S. tuberculosa* Lam. glabra, foliis oppositis ovato-acutis canaliculatis dorso substriatis, corollis folio vix longioribus. Lam. Illustr. 1. p. 214. Poir. Enc. meth. VII. p. 479. sec Roem & Schult. Syst. Veg. 3. p. 333.

Hab. ad Promont. bonæ spei: Lamarck l. c. — b. "Tubus corollæ glaberrimus." Roem & Schult l. c.

- † 10. *S. angustifolia* Lam. foliis oppositis erectis linearibus dorso-trisulcatis, ramis compositis villosis. Lam. illustr. 1. p. 315. Poir. Enc. bot. VII. p. 477. sec. Roem & Schult. Syst. Veg. 3. p. 331.



Hab. ad Promont. bonæ spei: Sonnerat: — b.

"Tubus corollæ pubescens." Roem. & Schult. l. c.

- † 11. *S. longiflora* Lam. subpubescens, foliis oppositis breviusculis canaliculatis, corollis longissimis incano-tomentosis. Lam. illustr. p. 315 Poir. Enc. VII. p. 466 sec. Roem. & Schult. l. c.

Hab. ad. Promont. bonæ spei: Sonnerat — b.

"Hanc iconem Burmanni (Afr. p. 127. t. 147. f. 1.) ad suam *longifloram*, nec ad *virgatam*, ut Willdenow, ducit Lamarck & Poirer l. c., a qua differt: tubo corollæ gracili multo longiore, pollicari & ultra; corolla alba laciniis ovato-obtusis; foliis latoribus minus oblongis." Roem. & Schult. l. c.

Credibile tamen est, quod hancce plantam merito ad *S. virgatam* citaverit Willdenow; Figura stirpis in opere Lamarckii nullos characteres eximios a *S. virgata* exhibet.

- † 12. *S. tomentosa* Andr. foliis ovatis tomentosis, calycis glandulis duodecim. Ait. Hort. Kew. ed. 2. T. I. p. 271. Andr. Repos. t. 334.

Hab. ad. Promontorium bonæ spei. — b.

Forsan *S. villosa* mihi eadem ac *S. tomentosa* Andr. — Haud dicitur l. c. an corolla glabra sit l. pubescens.

- † 13. *S. sulcata* Schmidt: foliis ovatis imbricatis sulcatis, floribus axillaribus. Schmidt Diss. grad. Neue und selt. Pflanz. vid. Uster. Anal. der Bot. 6 Stück. p. 120.

Hab. — b.

"Tubus villosus ad limbum ventricosus." Schmidt l. c. — Forsan eadem ac. *S. striata* Lam.

- † 14. *S. chrysantha* Lichtenst. foliis ovato oblongis obtusiusculis quinquenerviis cauleque hirsutis, floribus axillaribus sessilibus, glan-

dulis nectarium penicillatis. Lichstenst. Spicileg. Fl. Cap. Mss. sec. Roem. & Schult. Syst. Veg. 3, p. 333.

Hab. ad montem Wittemberg prope Tulbagh ad Promontor. bonæ spei: Lichtenstein. — b.

Forsan eadem ac *S. villosa* mihi. — Cel. viri haud dicunt, an flores glabri sint l. pubescentes; nec numerum squamularum faucis memoraverunt.

Quid *S. stricta* Donn Hort. Cantabr. edit. 6. p. 40?

Quid *S. superba* & *S. oppositifolia* Catal. Hort. Liverpool. p. 176?

Quid *S. glauca* Loddig. Catal. pl. 1807 p. 33? & Donn Hort. Cantabr. edit. 6. p. 40? anne *S. incana* Loddig. bot. Cab. 11. N:o 11?

*S. nana* Linn. fil. species est *Gnidia*, quia calyx deest.

Obs. Species a Lamarck memoratæ ulterius inquirendæ; forsan plurimæ tantum varietates inconspicuæ sint *S. virgatæ* & *erectæ*. — Adnotandum denique nec opus Cel. Andrewsii, nec Encyclopediam Poiretii me vidisse.

### Octandria.

#### 6. † LAGETTA, Juss. & Lam.

Arbor hæc, ab Hispanis Indiæ occidentalis Lagetto vocata, diu cognita fuit, attamen non botanice antequam Dr Wright Anno 1777 specimen misit Illustrissimis Viris Banks & Solander, qui arborem ut speciem *Daphnes* determinaverunt; Illustriss. Swartz vero primus fuit, qui stirpem sub nomine *Daphnes* publicavit. Dein vero ab Illustriss. Jussieu & Lamarck ut proprium genus definita nomine *Lagetta*, & a *Daphne* corollâ persistente & glandulis faucis quatuor differre di-

citur; an vero basi l. fauce corollæ glandulæ sint adnatæ Auctores plurimi non determinant. Fructus ab Auctoribus etiam diversis describitur nominibus: a b. m. Swartz drupa vocatur, Illustrissimo Jussieu vero nux, Ventenat bacca audit. — Stirpem numquam vidimus, itaque dubia allata haud dissolvere possumus.

*L. lutearia* Juss. & Lam. — Juss. Gen. pl. p. 81. Lam. Enc. 3. p. 376 & 440. Illustr. t. 389. Vent. Tabl. II. p. 239. *Daphne Lagetto* Swartz Fl. Ind. Occ. 2. p. 680. Wright in in Lond. Med. Journ. Vol. VIII. P. 111. p. — vid. Ust. & Roem. Magaz. IV. Stück p. 139. — Sloane Hist. 3. p. 22 t. 168. f. 1, 2, 3, 4 t. 169 f. 1.

Hab. in montibus excelsis Jamaicæ & Hispaniolæ: Swartz. b.

Credit Cel. Lamarck, & *Cansieram malabaricam* sibi & *Kada Kandel* Horr. Malab. 6 t. 37. species hujus Generis esse; — dum Lagettam haud vidimus, hanc rem haud dijudicare possumus.

Obs. Me docuit Cel. Afzelius, quod ex interiori Africa ad Sierram Leonam adducatur cortex interior s. liber reticulato linteiformis arboris ignotæ, ab Anglis *Lagetta* interdum nominatæ. Est hæcce Arbor, quam sub nomine *Daphnes* memorat Cel. Arndt in Reise durch Schweden 2. p. —

## 7. DAPHNE, Linn.

Nomen huic Generi imposuit von Linné a *δαφνη*, quod synonymon est *Lauri*. Poëtice etiam est originis; fabulantur enim Poëtæ, *Daphnem* puellam, Latonis & Penæi filiam, ab *Apolline* adamatam, cum vim ejus effugere non posset, De-

orum miseratione in *Laurum* fuisse mutatam, de quo canit Ovidius in Met. L. 1. v. 452.

Adhuc nullam certam stabilitamque *Daphnem* inter & *Passerinam* definitionem habuerunt Auctores. Ut denique certa fiat distinctio eas inter, illas tantum species voco *Daphnes*, quæ corollam habent deciduam & drupam, h. e. quæ circa nucleum involutum gerunt carnosiusculum, dum species *Passerina* corollam habent marcescentem nucleumque nudam.

Anno proxime præterlapso Upsaliæ sub præsidio Illustr. Prof. & Commend. Reg. Ord. de Wasa Thunberg dissertationem edidi gradualem de Daphne \*), in qua fusius omnes ejus species descripsi, sed postquam tandem varia & completiora specimina hujus Generis vidi, nunc plures species, in opusculo citato descriptæ, ad *Passerinam* refero.

\* *Floribus lateralibus.*

- I. *D. Mezereum* L. floribus sessilibus ternis caulinis glabris: laciniis corollæ ovatis acutis, foliis lanceolatis basi longe attenuatis utrinque glabris acutis. Dissert. Nostr. de Daphne p. 3.

*D. mezereum* Linn. Sp. pl. ed. 1. T. 1. p. 356. Sv. Bot. 1. 1. 7. *Thymelæa Mezereum* Scop. Fl. Carn. 1. p. 279.

Hab. in sylvaticis humidis, montanis subalpinis l. alpinis Norvegiæ, Sveciæ, Angliæ, Galliæ, Italiæ, Helvetiæ, ubi sec. Cel. Wahlenberg usque ad 5700 ped. par. supra mare in alpes ascendit, Germaniæ, Hungariæ, Poloniæ, Rossia, Sibiriaque, ubi sec. Cel. Gmelin usque ad

---

\*) Dissertatio illa, quæ, respectu promotionis instantis celerrime fuit impressa, variis laborat vitiis, quæ in nova editione corrigere studebo.



Jeniseam flumen pergit, & hinc orientem versus deficit. — b.

Obs. *D. Liottardii*: foliis spathulato lanceolatis, floribus quaternis axillaribus, inter gemmas pentaphyllas occultatis. Villars Fl. Delph. 3. p. 516.

*D. Mez.* γ Deslongch. Fl. Gall. 1. p. 226 certe ne varietas quidem sed ipsa genuina *D. Mezerium*.

2. *D. Laureola* L. racemis axillaribus terminalibus subquinquefloris bracteatis nutantibus, floribus glabris: laciniis corollæ lanceolatis ovatisve obtusis, foliis lanceolatis basi longe attenuatis utrinque glabris. Diss. nostr. de Daphne p. 15.

*D. Laureola* Linn. Sp. Pl. ed. I. T. 1. p. 356. Engl. bot. t. 119. *D. major* Lam. Fl. Fr. III. p. 22. *Thymelæa Laureola* Scop. Fl. Carn. 1. c.

Hab. in sylvis montosis & dumetis Angliæ, Galliæ, Italiæ, Lusitaniæ, Hispaniæ, Helvetiæ, Germaniæ Australis & Bohemiæ. — b.

3. *D. pontica* L. floribus lateralibus axillaribus glabris: laciniis corollæ lineari-lanceolatis longe acuminatis, foliis lato-lanceolatis obovatisve. Diss. nostr. de Daphne p. 17.

*D. pontica* Linn. Sp. Pl. ed. I. T. 1. p. 357. Andr. Rep. t. 73. Pall. Fl. Ross. 1. p. 54.

Hab. in Ponto: Tournefort. In fagetis umbrosissimis montanis inter juga alpina in Districtu Radscha ad Seglevi & ad jugum promontoriale in districtu Sadschavacho Imiretiæ: Gùldenstedt sec. Pall. Fl. Ross. — b.

4. *D. pendula* Smith: capitulis lateralibus longissime pedunculatis involucreis nutantibus,

involucro diphylo; floribus sericeo-villosis: laciniis corollæ ovatis acutis; foliis lanceolato-ellipticis sparsis glabris.

*D. pendula* Smith Ic. ined. l. p. 34. t.

34. *D. javanica* Thunb. Mus. Nat. Acad.

Ups. App. XI. p. 4. *Scopolia composita*

Linn. Suppl. p. 478.

Hab. in Java; Prof. Thunberg. — *?*

Obs. A. cæteris *Daphnes* speciebus differt involucro diphylo, dum vero fructus adhuc ignotus est, illam huc refero, quamquam in Diss. de *Daphne* eam haud enumeravi.

**\*\* Floribus terminalibus.**

5. *D. tinifolia* Sw. floribus terminalibus dichotome-paniculatis aggregatis sericeo-pubescentibus: laciniis corollæ ovatis obtusis, foliis elliptico-lanceolatis obtusiusculis glabris. Diss. nostr. de *Daphne* p. 18.

*D. tinifolia* Swartz Prodr. p. 63 & Fl. Ind. Occ. II. p. 683.

Hab. in montibus excelsis Jamaicae australis: Swartz — *?*

6. *D. Gnidium* L. paniculis terminalibus, floribus villosopubescentibus: laciniis corollæ lanceolatis obtusis, foliis lineari-lanceolatis acuminato-cuspidatis. Diss. nostr. de *Daphne* p. 20.

*D. Gnidium* Linn. Sp. Pl. ed I. T. I. p. 357. Regn. bot. t. 328. Desf. Fl. Atl. I. p. 319. Hayne Arz. Gew. 3. t. 45. Humb. de distrib. geogr. pl. p. 248.

Hab. in locis siccis aridis & sylvaticis Galliae austr., Hispaniae, Lusitaniae & Italiae. Id monte Zowan Barbariae: Desfontaines. In regione culta Teneriffae a 1200 ad 2580 ped. par. supra mare ad-

scendit: Leop. v. Buch & Chr. Smith sec. Humb. l. c. — *h.*

Dixit Cel. Decandolle in Fl. Franc. T. — p. 359: "Son fruit me paroît peu ou point charnu, ce qui doit peut être engager à la placer parmi les Passerines." — Judicent de hac re Auroptæ.

7. *D. rotundifolia* Forst. floribus terminalibus congestis sessilibus sericeo-pubescentibus: laciniis corollæ ovatis obtusis, foliis oppositis petiolatis orbiculato-ellipticis glabris, ramulis pubescentibus.

*D. rotundifolia* Forst. pr. p. 23. Linn. Suppl. p. 223. Brown Pr. Fl. Nov. Holl. l. p. 363. Diss. nostr. de Daphne p. 21.

Hab. in insula Namoka: Forster. — *h.*

8. *D. indica* L. floribus terminalibus congestis sessilibus sericeo-pubescentibus: laciniis corollæ lanceolatis acuminatis, foliis oppositis petiolatis ellipticis acutis ramisque glabris.

*D. indica* Linn. Sp. Pl. ed. l. p. 357. Osbeck. It. p. 246. Brown l. c. p. 362. — *D. foetida* Forst. prodr. p. 23 & Linn. Suppl. p. 223 sec. Brown. Dissert. nostr. de Daphne p. 22. — *Capura purpurata* Linn. Mant. alt. p. 224 sec. Smith Introd. to bot. ed. 2. p. 419.

Hab. in apricis aridis Chinæ: Osbeck sec. Herb. Berg. — In insula Namoka: Forster. In littoribus intra Tropicos Novæ Hollandiæ & ad Port Jackson ejusdem Insulæ: Brown. — *h.*

Cel. Brown l. c., *D. indicam* L. unam eandemque esse ac *D. foetida* F. fide speciminum Tahitiensium in Herb. Banks.; vide tamen dubia mea circa hanc rem in dissertatione citata. Dixit quoque Cel. Smith l. c., *Capuram purpuratam* L. etiam

*D. indica* synonymon esse, differentem tantum staminibus sex; sec. descriptionem Linnæi tamēn re vera genericē differre videtur; corollæ limbo sexpartito; dum vero *Capuram* in Herb. Linn. vidit Cel. Smith, certe melius hac de re dijudicavit. Conf. Dissert. nostram sæpius citatam p. 23, 24 et 25.

† 9. *D. cannabina* Lour. umbellis terminalibus, foliis lanceolatis oppositis. Lour. Fl. Coch. I. p. 236. Diss. nostr. de Daphne p. 25.

Hab. in sylvis Cochinchinæ: Loureiro l. c. — p.

Sec. descriptionem Rev. Loureiro certum videtur, plantam huic Generi admunerandam esse.

10. *D. odora* Thunb. floribus terminalibus aggregatis sessilibus glabris; laciniis corollæ cordato-ovatis obtusis, foliis sessilibus sparsis ellipticis glabris nitentibus. Diss. nostr. de Daphne p. 26.

*D. odora* Thunb. Fl. Jap. p. 159. Banks

l. c. Kæmph. t. 16. *D. odora*  $\alpha$  et  $\beta$  Thunb.

Mus. Nat. Acad. Ups. P. XIII. p. 106.

*D. Japonica* Ejusd. Mus. Nat. l. c.

Hab. in Nagasaki alibique Japoniæ: Prof. Thunb. — p.

Obs. Hæc vera *D. odora* Thunb. in Europa adhuc nondum culta fuit. Conf. Diss. nostr. citatam.

11. *D. sinensis* Lam. floribus terminalibus aggregatis breve pedicellatis tenuissime pubescentibus, pedicellis sericeo pubescentibus, laciniis corollæ lanceolatis acuminatis, foliis sessilibus sparsis ellipticis glabris nitentibus, Diss. nostr. de Daphne p. 27.

*D. sinensis* Lam. Enc. 3. p. 438 (exclus.

Syn. Thunb.) *D. odora* Ait. Hort Kew.

ed. I. T. 2. p. 26. Smith Exot. bot. t.

47. Lour. Fl. Coch. I. p. 237. (ex-



clus, omnibus his locis Syn. Thunb.) —  
omniumque Catalogor. Hortor. — *D. Ja-*  
*ponica* γ. Thunb. Mus. Nat. Acad. Ups.  
App. XVIII. p. 4.

Hab. in China. b.

In dissertatione citata fusius differentias harum stirpium exposui \*).

12. *D. occidentalis* Sw. floribus terminalibus capitatis sessilibus sericeo-pubescentibus dioicis, capitulis pedunculatis axillaribus: laciniis corollæ lanceolatis acutis, foliis sparsis ellipticis supra glabris subtus cinereis pubescentibus; ramulis dichotomis.

*D. occidentalis* Sw. pr. p. 63 & Fl. Ind. Occ. 2. p. 685. Diss. nostr. de Daphne p. 30.

Hab. in montibus altis Jamaicæ australis: Swartz.  
— b.

13. *D. alpina* L. floribus terminalibus aggregatis sessilibus pubescentibus: laciniis corollæ lanceolatis acuminatis, foliis lanceolatis obovatisve supra glabris subtus piloso-pubescentibus. Diss. nostr. de Daphne p. 31.

*D. alpina* Linn. Sp. P. I. ed. I. T. I. p. 356. Schmidt. Öest. Baumz. t. 19. *Thym. alpina* All. Fl. ped. I. p. 152. *Th. candida* Scop. Fl. Carn. I. p. 276.

Hab. in locis rupestribus apricis Alpium Galliæ, Italiæ, Helvetiæ austr., Carniolæ, Forojulii et Croatiae. — b.

14. *D.*

---

\*) Exclude tantum. p. 28. l. 27 et 28 pro *D. odora* sequentia utpote haud omnino recta: "pedicelli brevissimi glabri, nigri." In stirpe floreante flores re vera sessiles, dum verò exfloruit, in receptaculo excrescunt pedicelli brevissimi, ut in plerisque cæteris Thymeleis.

14. *D. altaica* Pall. floribus terminalibus sessilibus glabris: laciniis corollæ ovaris obtusis, foliis oblongo-lanceolatis obtusis utrinque glabris. Diss. nostr. de Daphne p. 54.

*D. altaica* Pall. Fl. Ross. p. 53. t. 35.

Hab. in Alpibus Altaicis Sibiriae, ubi primo invenit Patrin sec. Pall. Fl. Ross. — p.

15. *D. Cneorum* L. floribus terminalibus fasciculatis sessilibus extus incano-pubescentibus: laciniis corollæ oblongis obtusis, foliis cuneiformibus lanceolatis mucronatis nitidis.

Diss. nostr. de Daphne p. 37.

*D. Cneorum* Linn. Sp. Pl. ed. I. T. I. p. 357. Jacq. Fl. austr. 5. p. 12 t. 126.

Wahlenb. Fl. Carp. p. 111. Trattin. Arch. I. p. 122. t. 134. *D. odorata* Lam. Fl.

Fr. Th. *Cneorum* Scop. Fl. Carn. I. p. 257.

Hab. in sylvaticis apricis, montanis & montibus humilioribus Galliae, Italiae, Helvetiae, Germaniae, Hungariae & Poloniae. — p.

Fructus magis siccus quam in cæteris. — In Gallia excurrit *D. Cneorum* a locis planis fere usque ad limitem nivalem sec. Decand. Geogr. des Pl. de la France. Vide Humb. de distribut. Geogr. Plant. p. 130.

16. *D. striata* Trattin. floribus terminalibus fasciculatis sessilibus glabris: laciniis corollæ lato-lanceolatis acutis, foliis cuneiformibus lanceolatisve mucronatis nitidis. Diss. nostr. de Daphne p. 40.

*D. striata* Trattinnick Arch. der Gew. Kunde I. p. 120. t. 133. *D. Cneorum* Wahlenb. de Veget. & Clim. Helv. Sept. p. 72. sec. Ejusd. Fl. Carp. p. 111.

Hab. in Alpibus Helvetiæ, ubi "in regione alpina inferiore Montis Lunæ supra terminum abietum usque ad 6900 pedum elevationem copiose" legit Cel. Wahlenberg. In monte Baldo: Alströmer sec. Herb. Berg. "In monte Rittersberg prope Botzen Tyroli primo observavit Geovanelli. In Carinthia; Trauenfeller. Per omnem Italiam, Neapolim & Apuliam nullam aliam sub D. Cneori nomine speciem, nisi præsentem vidit Sieber" sec. Trattinnick l. c. — *Þ.* — Conf. Diss. nostr. sæpe citatam.

17. *D. glomerata* Lam. floribus terminalibus fasciculatis conglomeratis glabris: laciniis corollæ lanceolatis acuminatis, foliis obovatis utrinque glabris nitidis. Diss. nostr. de Daphne p. 42.

*D. glomerata* Lam. Enc. III. p. 438.

Steven in Act. Mosc. III. p. 246 & 260.

*D. comosa* Adams in Web. & Mohrs Beitr. I. p. 53.

Hab. in Caucaci Iberici Alpēstribus: Bieberstein. In jugis subalpinis Caucasi; Adams. In alpe Tyfendagh Caucasi: Steven. In Oriente: Herb. Tournef. sec. Lamarck. l. c. — *Þ.*

18. *D. collina* Sm. floribus terminalibus aggregatis extus sericeo-villosis: laciniis corollæ ovatis obtusis, germine villosa, foliis obovatis supra nitidis glabris subtus piloso-villosis.

*D. collina* Smith Spicil. Fasc. II. t. 18.

Roem. Fl. Eur. Fasc. VII. Curt. Mag.

Vol. XII. t. 428. Brückner Fl. Rom.

in Magaz. der Nat. Forsch. Fr. VI. p.

144. Dissert. nostr. de Daphne p. 44.

Thymelæa Saxatilis oleæfolio. Tournef.

Instit. p. 594.

Hab. in collibus Italiæ australis prope Casertam ad ripas Vulturni, ubi Martio 1787 legit Cel. Smith. In pigneto Chigi Ostiæ: Brückner.

— b.

Postquam nunc *D. buxifoliam* & *D. sericeam* Herbarii Vahlî inspicere licuit, eas a *D. collina* Sm. habitu quodammodo differre video; dolendum vero specimina & *D. buxifolia* & *D. sericea* Herb. Vahl. minus bona nimisque tenera esse, foliis nempe & floribus nuper explicatis, ita ut nondum vix iudicem an ætate tantum differant vel varietates sint a diverso solo ortæ. Quamobrem ulterius in vivo v. ex melioribus saltem speciminibus indagandæ sunt.

Cel. Vahl olim *D. collinam* Sm. sub nomine *D. sericea* ad viros Illustriss. Thunberg & Swartz misit, unde Ipsum in hac re incertitudine laborasse crediderim.

Synonyma: *D. buxifolia* Vahl, *D. sericea* Desfont. in Ann. du Mus. & *D. oleafolia* Lam. in Dissertatione mea ad *D. collinam* Sm. citata, nunc aliis locis transpono.

"Frutex pulcherrimus, "vadosi accola Vulturni," colles camposque in confiniis ejus tegit, sicut nostros Ulex, flosculos suos fragrantissimos undique carpandos offerens, ac si rosaria Poësti intrares" Smith l. c.

19. *D. buxifolia* Vahl. floribus terminalibus aggregatis villosis: laciniis corollæ lanceolatis obtusiusculis, germine pubescente, foliis obovatis supra glabris, junioribus utrinque adultisque subius pubescentibus.

*D. buxifolia* Vahl. Symb. bot. I. p. 29.  
Thymelæa orientalis buxifolia subtus villosa, flore albo. Tournef. Coroll. Instit. P. 41.



**Hab. in Oriente:** *Broussonet* sec. *Vahl*. l. c. (vidi in *Herb. Vahl*). — *♂*.

*Frutex ramis glabris, ramulisque superne villosis. Folia versus apices ramulorum approximata, sparsa, sessilia, obovata, basi angustiora, integerrima, supra glabra, juniora utrinque et adulta subtus pubescentia, 4—6 lineas longa, medio duas lata. Flores terminales, aggregati, sessiles, 6—8, extus villosi; Corolla 5 lineas circiter longa; tubus basi ventricosus s. gibbosus, 4 circiter lineas longus; Lacinia corollæ lanceolata, obtusiusculæ, lineam longæ. Stamina duorum ordin: 4 inferiora paullo infra faucem 4 superiora fauce tubi inserta: Filamenta brevissima; Antheræ oblongæ, biloculares, luteæ. Germen ovatum, pubescens, apice villosum; stylus brevissimus ut fere inconspicuus; stigma capitatum, mucratum.*

*A. D. collina* Sm. itaque differre videtur: foliis multo minoribus, angustioribus, brevioribus, opacis, junioribus utrinque adultisque subtus pubescentibus; floribus minoribus, paucioribus, s. 4 l. 5: laciniiis corollæ lanceolatis, obtusiusculis; germine pubescente; dum *D. collinæ* folia multo majora, duplo fere longiora, latiora, coriacea, supra fere nitida, subtus piloso-villosa (nec unquam, quantum vidi, folia juniora utrinque pubescentia ut in *D. buxifolia*). Flores numerosissimi, 6—16, majores; lacinia corollæ ovata, obtusæ; germen villosum.

*A. D. sericea* *Vahl* differt: ramulis firmioribus; foliis obovatis, magis approximatis, dimidio fere brevioribus: junioribus utrinque pubescentibus; floribus minoribus: laciniiis corollæ lanceolatis, obtusiusculis; dum *D. sericeæ* ramuli tenues; folia lanceolata, basi angustiora, magis sparsa, duplo fere longiora, omnia supra glabra, subtus piloso-villosa; flores majores: lacinia corollæ ovata, obtusæ.

Flores *D. buxifolia* albi & Flores *D. sericeæ* purpurei sec. Vahl. l. c.

**Obs.** Ramulus & folia, quæ vidi, *D. buxifolia* flavicantia fuerunt, dum folia *D. collinæ* intense — & in *D. sericea* læte viridia.

20. *D. sericea* Vahl: floribus terminalibus aggregatis villosis: laciniis corollæ ovatis obtusis, germine pubescente, foliis lanceolatis obtusiusculis supra glabris subtus piloso-villosis.

*D. sericea* Vahl Symb. bot. l. p. 28. Desfont. in Ann. du Mus. X. p. 297. t. 20. — *D. oleæfolia* Lam. Enc. bot. 3. p. 440. sec. Desfont. l. c.

Thymelæa, cretica, oleæfolio subtus villosa. Tournef. Cor. Instit. 41.

**Hab.** "in Creta: Broussonet. Neapoli legit Illustr. de Schlandbusch" sec. Vahl. l. c. — In Creta anno 1700 jam legit Tournefort; etiam in Asia sec. Desfontaines. — b.

*Frutex* ramis subfuscis, glabris, ramulisque tenellis, superne hirsuto-villosis. *Folia* sparsa, sessilia, lanceolata, obtusiuscula, basi angustata, integerrima, firma, supra glabra, subnitida, læte viridia, subtus piloso-villosa, pallidiora, nervo dorsali et fusco et viridi, 8—10 lineas longa, versus apices duas lata. *Flores* terminales, aggregati, sessiles, 5 l. 6 circiter, extus villosi: corolla 4—6 lineas longa; tubus basi ventricosus, 3—5, lineas longus: laciniæ corollæ ovatæ, obtusæ, lineam longæ. *Stamina* duor. ordin. ut in cæteris; *Filamenta* brevissima; *Antheræ* oblongæ, biloculares, luteæ. *Germen* ovatum, pubescens, apice tantum villosum; *stylus* brevissimus, ut fere inconspicuus; *stigma* capitatum, muricatum.

Vidi in specimine *D. sericea* Herb. Vahl. folium unicum quod formam obovatam omnino habuit foliorum *D. collinae*; ad hanc formam quoque inclinant folia *D. sericea*; itaque dum omnia, quæ vidi, specimina *D. sericea* folia juniora & non satis explicata fuerunt, crediderim fere, *D. sericeam* Vahlîi juniorem tantum esse stirpem *D. collinae*.

A *D. collina* differre videtur: ramulis tenuioribus, fuscis; foliis lanceolatis, obtusiusculis, brevioribus (8—10 lineas longis duasque circiter latis), tenuioribus; nervo dorsali subtus sæpe fusco; floribus paucioribus (5 l. 6), minoribus; germine pubescente, apice tantum villosa; dum *D. collinae* ramuli firmiores, rufescente-brunnei, villosiores; folia obovata, longiora & latiora (pollicaria l. ultra, 4 l. 5 circiter lineas lata), coriacea; flores numerosissimi (6—16), majores; germen villosum. — Stirps *D. sericea* quoad ramulos & folia læte-viridis; stirps *D. collinae* folia habet intense-viridia.

Flores *D. sericea* purpurei sec. Vahl l. c. — Folia haud acuta, uti dixit Cel. Vahl, sed re vera obtusiuscula l. obtusa.

E Götting. Gelehrte Anz. 172 Stück d. 26 Oct. 1816 p. 1708, ubi recensetur Sibthorpîi Fl. Græcæ prodr., vidimus, in libro citato etiam occurrere *D. sericeam*, nescimus vero, an Cel. Smith eam specie distinxerit a *D. sua collina*, l. si figuram dederit in ipsa Flora Græca, dum pretiosa illa opera nondum vidimus.

21. *D. Oleoides* Schreb. floribus terminalibus geminis sericeo-pubescentibus; laciniis corollæ lanceolatis attenuatis, foliis lanceolatis utrinque glabris. Diss. nostr. de Daphne p. 49.

*D. Oleoides* Schreb. Ic. & Desc. pl. Dec. l. p. 13. t. 7. Willd. Sp. Pl. II. p. 423.

(exclus. synonym. *D. salicifolia* Lam.). Bieberst. Fl. Cauc. l. p. 149.

Hab. in montibus Cretæ: Schreber. In Caucasi orientalis sylvis; circa Kurt-Bullak: Bieberstein. In Græcia sec. Herb. Thunb. — b.

22. *D. salicifolia* Lam. floribus terminalibus aggregatis sessilibus extus pubescentibus: laciniis corollæ lanceolatis acuminatis; foliis lineari-lanceolatis lanceolatisve obtusis mucronatis utrinque glabris. Diss. nostr. de Daphne p. 51.

*D. salicifolia* Lam. Enc. III. p. 438 (exclus. synonym. *D. Oleoides* Schreb). Bieberst. Fl. Cauc. l. p. 498. *D. caucasica* Pall. Fl. Ross. 1. p. 53 sec. Bieberst. l. c. — *D. Euphorbloides* Muss. Puschkin sec. Herb. Willd.

Hab. in Iberia media. In campestribus inter oppida Gori & Krzchinval copiose; etiam in sylvis circa Ansur: Bieberstein. Ad rivum Liachri in Iberia sec. Herb. Swartz. In dumetis ad Csani fl. circa Achalgory frequens: Guldensiedt sec. Pall. l. c. — b.

An *D. jasminacea* Smith in Sibth. Fl. Græca hujus sit loci? Opus citatum nunquam vidi. Conf. Diss. nostram.

† 23. *D. obovata* Humb. floribus corymbosis, foliis glabris obovatis obtusissimis. Willd. Herb.

Hab. in America meridionali: Humboldt sec. Herb. Willd.

† 24. *D. lancifolia* Humb. cymis glomeratis terminalibus; foliis oblongis utrinque acutis subtus pubescentibus. Willd. Herb.

Hab. in Peru: Humboldt sec. Herb. Willd.



- † 25. *D. Elæagnoides* Humb. foliis lanceolatis glabris supra nitidis, capitulis pedunculatis. Willd. Herb.  
 Hab. in America meridionali: Humboldt sec. Herb. Willd.  
 Obs. Diagnoses harum plantarum in herbario b. m. Willdenowii occurrunt, uti nos humanissime edocuit Cel. Otto, sed, uti bene patet, valde incompletæ sunt, unde descriptiones Ill. Humboldt exoptandæ.

Sequentes olim species *Daphnes* successive a variis Auctoribus sec. recentiores observationes ad *Passerinam* sunt relatæ: *D. dioica* Gouan a Cel. Ramond in Bullet. philom. — *D. calycina* Lapeyr. a Cel. Persoon in Syn. Pl. 1. p. 437. — *D. nitida* Vahl (*D. argentata* Lam. Enc.) a Cel. Desfontaines in Fl. Atl. 1. p. 121. — *D. Tartonraira* L. a Cel. Schrader in Journ. für die Bot. 4. B. 1. h. p. 89. — *D. Thymelæa* L. a Cel. Decandolle in Fl. Fr. 6. p. 466. — *D. vermiculata* Vahl est *P. tinctoria* Pourret in Chlor. Narb. — *D. lanuginosa* Lam. est *P. canescens* Schousb. in Marokk. Beskriv. — Ego nunc etiam *D. villosam* L., *D. pubescentem* L., *D. thesioidem* Lam., *D. coridifoliam* Lam. et *D. tomentosam* Lam. ad *Passerinam* retuli. — *D. osyroides* Vahl. Herb. (vid. Dissert. nostr. de *Daphne* p. 54) varietas tantum est *Passerinæ tartonrairæ*. — *D. monostachya* Willd. & *D. distachya* Willd. *Cansieræ* sunt, uti jam antea ab Illustriss. Jussieu & Lamarck fuerunt determinatæ. — *D. Lagetta* Sw. sec. Ill. Jussieu proprium constituet genus, *Lagetta* nominatum. — *D. triflora* Lpuretr. nullo modo vera est *Daphne*, dum describitur "calyce triphylo trifloro." — *D. squarrosa* L. forsan *Gnidia carinata* Thunb. — *D. rosmarinoides* Burn.

pr. Fl. Cap. p. 11, *Daphne* - Forsk. Fl. Egypt.  
- Arab. p. XXV. No. 188 et *Thymalia* binæ in Linn.  
Fl. Palæst. & vid. Aman. Acad. p. 455, dubia  
omnino sunt.

8. DIRCA, Linn.

Nomen hujus Generis forsân derivavit von  
- Linné a *Δῖρα*, fons, quoniam in paludibus cre-  
scit. Crediderunt etiam auctores, quod nomen de-  
rivaverit a *Δίκη*, Lyci Regis Thebanorum uxo-  
re. A cæteris Thymelæis differt corollâ elimbi,  
s. tantum obsolete hinc et inde ctenata. Fructus,  
quem haud vidi, a Linné vocatur bacca, ita  
etiam a Cel. Pürsch; sed ab Illusir. Willde-  
now aliisque drupa nominatur. Autoptæ rem di-  
judicent. Si extus habeat involutum carnosiuscu-  
lum ut *Daphne*, drupa est, quod etiam crediderim.

1. *D. palustris* Linn. Diss. Nov. Gen. pl.  
in Aman. Acad. 13. p. 112. t. 1. f. 2. Du-  
ham. Arb. p. 211. t. 88. Dam. Enc. p.  
289. Ill. t. 293. Schkuhr bot. Handb. I.  
p. 337. t. CVII. Pürsch. Fl. Am. Sept.  
I. p. 268.

Hab. sylvis nemorosis paludosis a New York ad Ca-  
rolinam Americæ septentrionalis; Pürsch. 2. p.

9. GNIDIA, Linn.

Quid gravis *Gnidii* intellexerint veteres Au-  
ctores, plane nescimus. Nostris temporibus gra-  
na *Gnidii* s. *semina* cocco - *Gnidii* a variis *Daphnes*  
speciebus desumuntur. *Gnidus* s. *Gnidus* fuit etiam  
Caria Urbs, Veneri dicata, unde *Venus Gnidia* di-  
cta. Von Linné nomen *Gnidia* huic dedit Ge-  
neri. — Differt *Gnidia* a *Struthiola* calyce nullo  
staminibusque octo, & a ceteris Thymelæis præ-  
sentia squamularum s. nectariorum faucis. Si hæ  
squamulæ nectararia sint, nec non, valde est in-

certum. Variant quoad formam in variis speciebus: in nonnullis glanduliformes sunt, in aliis nectariiformes s. hyalinae. — *Nectandra* Berg. & *Gnidia* omnino conjungenda, quoniam haud generice differunt, exceptâ *N. tetrandra* Berg., quæ *Siruthiola* est erecta L.

1. *G. pinifolia* L. foliis sparsis lineariibus extus convexiusculis mucronatis carnosiusculis glabris, floralibus lanceolatis, floribus capitatis pubescentibus: laciniis corollæ oblongis obtusis.

*G. pinifolia* Linn. Sp. Pl. ed. I. T. 1. p. 356. Willd. Sp. Pl. I. 11. p. 424 (excl. Linn. Suppl. cum sectione ultimâ adjectæ descriptionis ex Linn. Suppl. & Wendl. quoad locum citata.). Andr. Rep. 1. 52. Hort. Kew. ed. 2. 2. p. 412. Bot. Register. III. t. 19. α. Berg. Cap. p. 122. Lam. Enc. II. p. 764. t. 291. f. 1. Burm. Afr. p. 112. t. 41. f. 3. *G. radiata* Wendl. Obs. 15. t. 2. sec. bot. Register. I. c. Loddig. bot. Cab. 111. N:o 29.

α: flos candidus: squamulæ laciniis triplo minores Bot. Register. I. c.

β: flos sub-ochroleucus: squamulæ laciniis subæquales Bot. Register. I. c.

Hab. "in campis arenosis inter Cap & Drakenstein, in Duyvelsberg, infra Constantiam alibique sat vulgaris ad Promontorium bonæ spei": Prof. Thunberg. — b.

\* 2. *G. imberbis*. — Hort. Kew. ed. 2. 2. p. — Sims. bot. Mag. t. 1463. — *G. pinifolia* Wendl. Obs. 15. t. 2. f. 11. sec. Bot. Register. I. c.

Hab. ad Prom. bonæ spei. — b.

Obs. Stirpem & opera citata nunquam vidi.

- † 3. *G. juniperifolia* Lam. foliis lineari-subulatis planis lævibus, ramulis glaberrimis, floribus solitariis binisve glabris terminalibus Lam. Enc. 2. p. 765.

*G. pinifolia* Linn. Suppl. p. 225. *G. acer-rosa* Gmel. Syst. Nat. 2. l. p. 633. *G. Sparrmanni* Martyn edit. Miller. Gard. Dict. sec. Bot. Regist. i. c.

Hab. ad Promont. bonæ spei: Sparrman sec. Linn. Suppl. — b.

4. *G. radiata* L. foliis subulatis triquetris acutis, capitulis terminalibus sessilibus radiatis, bracteis lanceolatis Linn. Mant. pr. p. 67. Burm. Fl. Cap. p. 12. *G. pinifolia* Loddig. bot. Cab. 1. N:o 7.

Hab. ad Promont. bonæ spei. — b.

Stirps, quæ in herbariis Syecanis hoc sub nomine occurrit, habitu quidem a *G. pinifolia* diversa, at diversitatem earum definire, perquam difficile est. Folia breviora, convexiora, s. forsan sub-tri-quetra, de cætero in speciminibus exsiccatis nullam aliam inveni differentiam, unde pro varietate *G. pinifolia* considerari potest.

5. *G. filamentosa* Linn. fil. foliis sparsis ovalibus obtusis glaberrimis, floribus capitatis utrinque villosis, laciniis corollæ lanceolatis acuminatis, filamentis longis.

α: *virens*: foliis viridibus, squamulis faucis discretis inconspicuis, stigmate subincluso. Sims. bot. Mag. t. 1657.

*G. filamentosa* Linn. Suppl. p. 224. *Lach-næa buxifolia* Lam. Enc. 3. p. 371. III. t. 292 f. 1.

β: *glauca*: foliis glaucis, squamulis faucis 4 geminatis luteis, stigmate exserto. Sims. bot. Mag. t. 1658.



*Lachnaea glauca* Salisb. Parad. Lond. t. 109. Hort. Kew. ed. 2. 2. p. 415. —

*L. buxifolia* Andr. Rep. t. 524. *G. grandis* Hortulan.

Hab. ad Promont bonæ spei. — b.

6. *G. oppositifolia* L. foliis sparsis ovalibus acutis glabris, floribus terminalibus aggregatis pubescentibus: laciniis corollæ oblongis obtusis.

*G. oppositifolia* Linn. Sp. pl. ed. 1. p. 512. Willd. Sp. Pl. II. 1. p. 428 (excl. synonym. Thunb.). Hort. Kew. ed. 2. 2. p. 413. Botan. Regist. 1. t. 2. *G. laevigata* Thunb. pr. p. 67. Willd. Sp. Pl. 1. c. p. 426. Pers. Syn. 1. p. 436. Wendl. Obs. bot. 17. t. 2. f. 14. Andr. Rep. t. 89. Loddig. bot. Cab. N:o 16. Pluken. Almag. 367. phyt. t. 323. f. 7. *Passerina laevigata* Linn. Amæn. Acad. 4. p. 412. Sp. Pl. ed. 1. p. 513. Mant. p. 375. *Nectandra laevigata* Berg. Cap. p. 134. — Burm. Afr. p. 137. t. 49. f. 3.

Hab. ad Promont. bonæ spei. — b.

*Passerina laevigata* L. tantum junior stirps ramulis & foliis supremis purpurascentibus, itaque von Linné, nescio quo errore, false duas ex una formavit species. *G. oppositifolia* Thunb. vero *Passerina* est species, et ab hac valde diversa. — De *G. oppositifolia* in Mant. 1. c. dixit von Linné, quod in hortis culta loco callorum (squamularum) supra faucem petala acquirat, quod magnopere est dubitandum.

7. *G. carinata* Thunb. foliis sparsis lanceolatis linearibusque acutiusculis extus convexiusculis carinatisve glabris, floribus terminalibus

aggregatis pubescentibus; laciniis corollæ ovatis obtusis.

*G. carinata* Thunb. pr. p. 76. *G. polystachya* Berg. Pl. Cap. p. 123. — *G. simplex* Hortulanor. (non Linnæi.). — *Daphne squarrosa* Linn. Sp. Pl. ? & Burm. Afr. t. 49. f. 2?

Hab. ad Promontor. bonæ spei. — b.

Ramuli juniores pubescentes. Folia conferta, & in summitatibus ramulorum confertissima, supra pilis paucis obsita.

Forsan hæc *Daphne squarrosa* L.; figura l. c. satis est conveniens, at flores pedunculatos & calycem minutum diphyllum exhibet, quod haud convenit *G. carinata*. Crediderim itaque, Thymelæam Burmanni alius esse generis.

8. *G. scabra* Thunb. foliis linearibus obtusis extus convexiusculis scabris adultis glabris, floribus terminalibus lateralibusve aggregatis villosis: laciniis corollæ oblongis obtusis.

*G. scabra* Thunb. pr. p. 76.

Hab. ad Promontor. bonæ spei: Prof. Thunberg. — b.

*Stirps* ex omni parte flavicans interdum flavicante-canescens. Ramuli villosi pubescentes. Folia adulta glabra, juniora utrinque villosula. — Proxime affinis est *G. carinata* Thunb., differt vero: ramulis flavicante-canescens, villosi pubescentibus; foliis longioribus, obtusis, convexioribus, junioribus utrinque villosulis; floribus villosis; dum in *G. carinata* rami virides, superne pubescentes; folia magis lanceolata, acuta, minus convexa, confertiora, suprema pilis paucis obsita; flores plures, pubescentes.

9. *G. simplex* L. foliis sparsis lineari-lanceolatis acuminatis glabris, floribus terminalibus

aggregatis glabris: laciniis corollæ lanceolatis acuminatis.

*G. simplex* Linn. Mant. pr. p. 67. Burm. pr. p. 12. Andr. Rep. t. — . *G. viridis* Berg. Cap. p. 125. *G. subulata* Lam. Enc. 2. p. 764. Breyn. Cent. 10. t. 6.

Hab. ad Prom. b. spei. b.

Obs. Folia involucrentia intus et flores extus primo tenuissime et rare pubescentia, quod ætate evanescit. Hæc est *Var. β.* Berg. pl. Cap. p. 126. — *G. simplicem* in Curt. Mag. t. 812 haud vidi, itaque nescio, an vera sit, aut *G. carinata* Thunb., quæ sub nomine *G. simplicis* in hortis occurrit.

10. *G. capitata* Linn. fil. foliis sparsis lanceolatis acutis glabris, capitulo terminali longe pedunculato bracteato, floribus quinquefidis pubescentibus: laciniis corollæ oblongis obtusis.

*G. capitata* Linn. Suppl. p. 224. *Dais tinifolia* Lam. Enc. 2. p. 225. Illustr. t. 368. f. 3. sec. Pers. Syn. 1. p. 471.

Hab. "juxta Camtous rivier ad promont. bonæ spei": Prof. Thunberg. — b.

Obs. Interdum squamulæ faucis desunt, tunc tantum numero staminum a *Daide* differt.

11. *G. biflora* Thunb. foliis oppositis sparsisve lanceolatis acuminatis glabris, floribus terminalibus binis glabris: laciniis corollæ lanceolatis acuminatis.

Hab. "in collibus infra Taffelberg & infra latus orientale prope Cap ad Promont. bonæ spei": Prof. Thunberg. — b.

A *G. simplice* differt: staturâ humili, ramulis curvatis glabris, floribus binis, fauce ampliato, fila-

mentis brevioribus. Habitus de cætero valde alienus, *Salici fusca* sat similis.

12. *G. acutifolia*: foliis oppositis ellipticis acutis glabris, floribus terminalibus binis ternisve glabris: laciniis corollæ lanceolatis obtusiusculis.

Hab. ad Promont. bonæ spei: Prof. Thunberg. (Herb. Berg. & Retz.). — ♀.

*Frutex* glaberrimus. Exacutio foliorum primo intuitu eximie in oculos cadit. Proxime forsan *G. biflora* affinis, at notis indicatis valde diversa. — Interdum ramulus foliifer e centro florum excrescit, unde laterales evadunt flores.

13. *G. racemosa* Thunb. foliis oppositis sparsisve lanceolatis l. subcuneiformibus obtusis glabris, floribus subracemosis axillaribus terminalibusque villosis: laciniis corollæ minutis ovatis obtusis.

*G. racemosa* Thunb. pr. p. 76.

Hab. ad Promont. b. spei. ♀.

*Frutex* ramosus, flavicans, ramulis pubescentibus. Folia conferta, juniora extus pubescentia. Racemus foliaceus. Flores conferti, axillares l. terminales.

14. *G. stricta*: ramis rigidis, ramulis brevibus eximie verrucosis, foliis minutis lanceolatis oblongisve acutiusculis utrinque villosulis, floribus terminalibus aggregatis pubescentibus: laciniis corollæ linearibus obtusis.

*Passerina stricta* Thunb. pr. p. 76.

Hab. ad Promont. b. spei. ♀.

Ramulis suis brevibus crassis verrucosisque refert Prunum spinosam, quamquam folia minora.

15. *G. setosa*: foliis sparsis lanceolatis acutis acuminatisve brevissime petiolatis glabris,



floribus capitato-racemosis breve pedicellatis  
setosis: laciniis corollæ oblongis obtusis.

*Passerina setosa* Thunb. pr. p. 76.

Hab. "in Paardeberg ad Promont. b. spei": Profess.  
Thunberg. — b.

Species distinctissima, nec a Willdenowio,  
nec a Persoonio memorata.

16. *G. Linoides*: ramis tenellis glabris, foliis  
oppositis sessilibus lineari-subulatis lanceo-  
latisve extus convexiusculis glabris, floribus  
terminalibus solitariis sericeis: laciniis co-  
rollæ lanceolatis acutis.

*Passerina linoides* Thunb. pr. p. 76.

Hab. "in montibus Hottentots-Holland ad Promont.  
b. spei": Prof. Thunberg. — b.

*Stirps* pulchra, facie *Lini*. Rami tenelli, laxi,  
sæpe admodum longi, glabri; ramuli annotini su-  
perne interdum pubescentes. Folia extus trinervata  
& in eadem stirpe venosa. Flores ætate basi paullo  
calvescunt. Illustr. Willdenow in Sp. Pl. stir-  
pem dubitanter sub *Passerina grandiflora* citavit,  
at toto cælo ab hac differt, nec affinitatem ejus  
erueret potui.

17. *G. nana*: foliis sparsis sessilibus linearibus  
obtusis carnosiusculis extus convexis, ad-  
ultis glabris, junioribus albo-pilosis, flori-  
bus terminalibus aggregatis villosis: laciniis  
corollæ lanceolatis acutis, staminibus quatuor.

*Struthiola nana* Linn. Suppl. p. 128. Thun.  
pr. p. 76.

Hab. "in summis montibus ad Rodesand supra Wa-  
terfall ad Promont. b. spei": Prof. Thunberg  
— b.

Dum nullus adest calyx, necessarie ad *Gni-*  
*diam* referenda, quamquam stamina tantum quatuor.

18. *G.*

18. *G. virescens*: foliis sparsis oppositisve lanceolatis oblongisve obtusis brevissime petiolatis villosopubescentibus, floribus terminalibus aggregatis paucis villosiusculis; laciniis corollæ lanceolatis obtusiusculis.

*Passerina Anthylloides* α Thunb. Mus.  
Nat. Acad. Ups. b. XIII. p. 106.

Hab. ad Promont. b. spei. β.

Frutex *Passerinæ Anthylloidi* habitu tam similis, ut primo intuitu de differentia earum specifica dubitaverim; et nullum est dubium, quin in systemate re vera naturale, locum prope illam occupet; differt tamen generice sec. regulas artificiales Botanicorum, et ad *Gnidiam* pertinet respectu squamularum faucis.

Differt a *Passerina Anthylloide*: ramulis tenuioribus, minus villosis; floribus paucioribus s. 4 l. 5, tenuioribus, 4-fidis, octandris, minus villosis: laciniis corollæ lanceolatis, obtusiusculis, dimidio minoribus; germine villosa: squamulis faucium octo; dum *Passerinæ anthylloidis* ramuli crassiores et villosiores, folia villosiora; flores numerosissimi, capitati, 5-fidi, decandri, dupplo fere longiores, villosiores; laciniæ corollæ majores, oblongæ, obtusæ, latiores; germen apice tantum pubescens.

19. *G. tomentosa* L. foliis sparsis ovatis ovalibusve obtusiusculis brevissime petiolatis margine scabris glabris extusve pilosis, floribus terminalibus aggregatis extus villosis: laciniis corollæ lanceolatis acutis.

*G. tomentosa* Linn. Sp. Pl. ed. I. T. I.  
p. 512. *G. pubescens* Berg. Cap. p. 124.

Hab. ad Promont. b. spei. β.

*Ramuli hirsuti. Folia adulta sæpe omnino glabra. Laciniae corollae interdum oblongae, obtusiusculae. Squamulae faucis quatuor.*

20. *G. argentea* Thunb. foliis sparsis obovatis sessilibus argenteo-villosis, floribus terminalibus aggregatis villosis: laciniis corollae oblongis obtusis.

*G. argentea* Thunb. pr. p. 76.

Hab. ad promont. b. spei. p.

*Ramuli argenteo-villosi. Folia obovata, obtusa cum acumine, tenue argenteo-tomentosa venis rubentibus. Squamulae faucis quatuor.*

21. *G. sericea* L. foliis oppositis ovalibus obovatisve sessilibus utrinque pubescenti-villosis, floribus terminalibus aggregatis sericeo-villosis: laciniis corollae lanceolatis acutis.

*G. sericea* Linn. Mant. alt. p. 375. Syst. Nat. ed. XII. 2. p. 272. Wendl. Obs. bot. 16. t. 2. f. 13. — *Passerina sericea* Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 510. Amæn. Acad. 4. p. —. *Nectandra sericea* Berg. Pl. Cap. p. 131. *Thymelæa* Burm. Afr. p. 131. t. 49. f. 2.

Hab. in collibus prope Cap ad Promont. b. spei. p.

*Ramuli villosi. Folia sæpius obovata.*

22. *G. imbricata* Linn. fil. foliis sessilibus ovalibus oblongisve obtusis oppositis utrinque villosis extus nervosis, floribus terminalibus in axillis supremis aggregatis sericeis: laciniis corollae lanceolatis acuminatis.

*G. imbricata* Linn. Suppl. p. 225.

Hab. ad Promont. b. spei. p.

Proxime *G. sericea* affinis, differt: foliis semper ovalibus oblongisve (nec obovatis), extus nervosis (in *G. sericea* nec nervi nec venae apparentes);

floribus duplo-longioribus, magis villosis: laciniis corollæ duplo-longioribus, acuminatis. — De cætero Flores terminales in axillis supremis foliorum, dum flores *G. sericea* re vera terminales, foliis cincti. Habitus etiam diversus: *G. imbricata* canescens est, dum *G. sericea* magis est viridis, & folia magis habet distantia.

23. *G. Daphnæfolia* Linn. fil. foliis sparsis sessilibus obovatis utrinque pubescentibus, capitulo terminali involutrato, pedunculo nudo pubescente; floribus villosis quinquefidis decandris: laciniis corollæ oblongis obtusis.

*G. Daphnæfolia* Linn. Suppl. p. 225.

α: *hirsuta* L. fil. foliis obovatis utrinque pubescentibus minoribus subtus incanis, floribus minoribus: laciniis corollæ brevioribus.

Linn. Suppl. l. c. *Dais pubescens* Lam. Enc. 2. p. 255.

β: *glabra*. L. fil. foliis obovatis glabriusculis majoribus, subtus subglaucis, floribus majoribus, laciniis corollæ, longioribus.

Linn. Suppl. l. c. *Dais Madagascariensis* Lam. Enc. 2 p. 254. Illustr. t. 368. f. 2.

Hab. in Madagascar: *Commerçon*. — p.

Obs. Quid *G. aurea* Loddig. Catal. Plant. 1807 p. 28 & Catal. Pl. Hort. Liverp. p. 197?

#### 10. PASSERINA, Linn.

Opinantur quidam Botanicorum, genus ex similitudine fructuum cum capitibus Passerum denominatum esse; aliis est opinio nomen ex dilectione quam seminibus præbent Passeres quærendum esse; recentiores idem in honorem *Valentini Passerini* dictum autmant.

A *Daphne* differt, ut supra diximus, corolla persistente & nuce nuda.



*Stellera* Genus, quod in memoriam meritissimi at infortunati Doct. Steller nominavit Cel. Gmelin, nullo modo a *Passerina* differt, dum plures, imo plurimæ *Passerinae* species stamina etiam habent inclusa. Nullam mehercle! differentiam genericam ea genera inter invenire potui.

Nec generice a *Passerina* differt *Lachnæa*, a Prof. van Royen ita nominata, limbus enim corollæ æque inæqualis est in plurimis *Passerinae* speciebus, ac in *Lachnæa*, itaque, præeunte Illustriss. Thunberg, etiam hoc genus cum *Passerina*, idque summo jure, conjungo.

1. *P. annua*: caulibus ramosis glabris, foliis sessilibus sparsis linearibus acutis glabris, floribus axillaribus solitariis pluribusve pubescentibus: laciniis corollæ minutis ovatis obtusis conniventibus.

*Passerina Stellera* Ramond. Pl. Pyren. ined. sec. Decand. Fl. Fr.

*Stellera Passerina* Linn. Amæn. Acad. l. p. 400. Jacq. Ic. rar. Wallr. Ann. bot. p. 57. Bieberst. Fl. Cauc. l. p. — Desfont. Fl. Atl. l. p. 330. — *S. annua* Salisb. Hort. Allert.

**Hab.** in campis apricis aridis, in agris inter segetes Galliae, Italiae, Austriae, Germaniae, Hungariae, Poloniae, Rossiae & Caucasi. In collibus incultis prope Tlemsen Barbariae: *Desfontaines*. — ☉.

2. *P. racemosa*: caulibus ramosis glabris, foliis lineari-lanceolatis lanceolatisve sparsis obtusis brevissime petiolatis glabris, floribus racemosis pedicellatis glabris: tubo articulado, laciniis corollæ minutis linearibus obtusiusculis conniventibus.

*Stell. altaica*: foliis lanceolatis acutis, flo-

ribus capitato racemosis quadrifidis. Pers.  
Syn. I. p. 436 ?

Hab. in Rossia et Sibiria: Prof. Laxman. (Herb. Berg., Retz. & Cassström.). — ☉.

*Herba* certe annua. *Flores* dum primo erumpunt capitato-racemosi, mox vero ætate omnino racemosi, primo etiam rare et tenuissime pubescentes, quod evanescit. Quadrifidi sunt. — Invenitur in Herbariis sub nomine *Stelleræ Passerinæ*.

Forsan eadem ac *St. altaica* Pers., at e brevi diagnosi apud Persoon hancce rem haud dissolvere possum.

3. *P. Stelleri*: caulibus simplicissimis glabris, foliis sparsis lanceolatis obtusiusculis brevissime petiolatis glabris, floribus capitato-racemosis quinquefidis decandris glabris: laciniis corollæ oblongis obtusis.

*Stellera chamaejasme* Linn. Amæn Acad. l. c.  
Gmel. Fl. Sib. 3. p. 27. Amm. Ruth. p. 16. t. 2.

Hab. copiose tam in humilioribus quam montosis locis Selengæ et Arguni fluviorum Sibiria: Amman l. c. — ☉.

Ex una radice numerosissimi simplicissimique excrescunt rami.

4. *P. eriocephala* Thunb. caulibus longis ternerrimis filiformibus, foliis linearibus cæspidatis extus convexis decussate-oppositis glabris, floribus terminalibus capitatis bracteatis villosis: laciniis corollæ ovatis obtusis.

*P. eriocephala* Thunb. prodr. p. 76. —  
*Lachnæa eriocephala* Linn. Sp. Pl. ed. I. p. 512. Wild. Sp. Pl. II. p. 434. Pers. Syn. I. p. 437.

Hab. ad Promont. bonæ spei. ☉.

*Fruticis ramuli* juniores interdum versus apices folia habent inevidenter quadrifariam imbricata, quod ætate mox evanescit. *Flores* densa lana circumcincti, quæ lana stipitata est, ut hi *stipites laniferi* semina plantar. composita. cum pappo fere referant. *Staminum Filamenta* uno ordine ad bas inlaciniarum corollæ inserta, et earum fere longitudine.

*Obs.* Dum Lam. Illust. Gen. t. 292. f. 2. Andr. Repos. t. 104 & Curt. Magaz. t. 1295 ab Autoribus huc citatos non vidimus, haud dijudicare possumus, an veram *P. eriocephalam* repræsentant nec non.

5. *P. cephalophora* Thunb. caulibus solidis brevibus, foliis linearibus obtusis extus convexis subtrigonis in junioribus ramulis eximie quadrifariam imbricatis, floribus terminalibus capitatis sericeo-villosis; laciniis corollæ lanceolatis acuminatis.

*P. cephalophora* Thunb. pr. Fl. Cap. p. 76. Willd. Sp. Pl. II. p. 431 Pers. Syn. I. p. 436. — *Lachnæ sphaerocephala* Burm. pr. Fl. Cap. p. 128

Hab. "ad balneas calidas prope Swarteberg ad Promont. bonæ spei": Prof. Thunberg. — v.

*P. eriocephalæ* proxime affinis, differt vero: ramulis solidis, brevioribus; foliis in junioribus sæpe distincte quadrifariam imbricatis, obtusis, subtrigonis; capitulis majoribus; floribus numerosissimis, duplo majoribus, sericeo-villosis; laciniis corollæ lanceolatis, acuminatis.

6. *P. conglomerata* Thunb. ramulis flexuosis laxis, foliis quadrifariam imbricatis linearibus truncatis convexis, bracteis sulcatis, floribus terminalibus capitatis extus lanatis, capitulis confertis: laciniis corollæ oblongis obtusis,

*P. glomerata* Thunb. pr. Fl. Cap. p. 76.

— *Lachnæa conglomerata* Linn. Sp. Pl.

ed. 1. p. 514. Willd. Sp. Pl. II. p. 434.

Hab. "in Hautbay et alibi ad Promontorium bonæ spei": Prof. et Commend. Thunberg. — b.

*Fruticis* folia inferiora obsolete, juniora vero eximie quadrifariam disposita, valde truncata et extus obtuse convexa, superiora majora fiunt et bracteæ nominandæ. *Florum capitula* numerosissima, confertissima, parva, bracteis ovatis, obtusatis, eximie sulcatis. *Staminum filamenta* uno ordine ad basin laciniarum inserta et earum longitudine.

*Lachnæa Phyllicoides* Lam. Enc. 3. p. 573 & Illustr. Gen. t. 292. f. 3 a Cel. Persoon huc citatur. Folia lineari-subulata et flores albos esse dicunt, quod in *L. conglomerata* L. haud sunt. In herbario Vahlî asservatur specimen *L. phyllicoidis* nomine, a Lamarckio datum, quod *Passerina capitata* L. est. Dum opus Lamarckii ad manus non est, hanc rem haud enucleare possumus.

Dixit Illustr. Sprengel in Magaz. der Gesellsch. Nat. Forsch. Fr. VIII. Jahrg. 2:tes quart. p. 105, synonymon Breynii Cent 18. t. 7. false ad *Phyllicam imberbem* a Bergio relata esse, quia *Lachnæam conglomeratam* exhibet. Hanc rem etiam jam inspexit Willdenow et l. c. correxit.

† 7. *P. purpurea* foliis lineari-lanceolatis quadrifariam oppositis patentibus Curt. Bot. Magaz. t. 1594 (sub nomine *Lachnææ purpureæ*).

*Lachnæa purpurea*: foliis oppositis quadrifariam imbricatis, capitulis glabris Ait. Hort. Kew. ed. alt. 2. p. 293 et Andr. Bot. Repos. t. 293 sec. Bot. Mag.

Hab. ad Promontorium bonæ spei. — b.

8. *P. paleacea*: ramulis apice lanâ densa incrassatis, foliis linearibus obtusis extus convexis



glabris, floribus racemoso-spicatis glabris: laciniis corollæ oblongis obtusis, bracteis ovatis obtusis paleaceis.

*Lachnæa paleacea* Herb. Banks. sec. Herb. Swartz.

Hab. ad Promontor. bonæ spei: Prof. Sparrman. (vidi in Herb. Swartz. et Thunb.). — ♀.

*Frutex* ramulis superne dense lanatis, bracteisque paleaceis a cæteris primo intuitu jam insignis. Differt a *P. filiformi*: caulibus superne dense lanatis incrassatisque; foliis dimidio minoribus, minusque linearibus; bracteis ovatis, obtusis, paleaceis; floribus glabris, dum *Passerinæ filiformis* ramuli tenue-pubescentes; folia magis linearia, duplo longiora et compressione fere subulata; bractea ovato-lanceolata, acuminata, duplo longiores; tubus corollæ pubescens.

*P. filiformis* L. caulibus erectis superne pubescenti-tomentosis, foliis linearibus l. subulato-linearibus extus convexis glabris caule adpressis, floribus spicato-axillaribus: tubo pubescente, laciniis corollæ oblongis obtusis, bracteis ovato-lanceolatis acuminatis extus convexis glabris.

*P. filiformis* Linn. Sp. Pl. ed. l. p. 559.

Hort. Cliff. p. 249. t. II. Wendl. Obs.

bot. 18. t. 2. f. 15. sec. Willd. Sp. Pl.

Hab. "in campis arenosis extra Cap et alibi ad Promont. bonæ spei": Prof. Thunberg. — ♀.

*Frutex* caulibus longis, rectis ramulisque pubescenti-tomentosis. Folia opposita, decussata, nec unquam quadrifariam-imbricata, quantum vidi, quamquam ita dixit von Linné. — Filamenta staminum exserta ut in *Lachnæis* et longitudine fere laciniarum corollæ.

*β. divaricata*: caulibus ramulisque divaricatis tenellis, foliis linearibus l. subulato linearibus subtriquetris divaricatis, bracteis dilatatis.

Hab. ad Promont. bonæ spei: Prof. Sparrman. — *β.* (vidi in Herb. Thunb. et Swartz.).

Respectu habitus fere squarrosi a divaricatione ramulorum foliorumque diversa videtur a *P. filiformi*, at impossibile forsitan est, characteres diagnosticos invenire; differre videtur: *caulibus* ramulisque divaricatis, diffusis, laxis tenellis; *foliis* divaricatis, distantibus, subtriquetris carinâ acutioribus; *bracteis* magis squamaceis, margine dilatatis, distinctius nervosis, majoribus; *laciniis corollæ* brevioribus, dum *P. filiformis* caules et ramuli erecti, firmiores; *folia* conferta s. confertiora, apice tantum evidenter triquetra, caulibus adpressa; *bractea* compactiores; *laciniæ corollæ* longiores.

10. *P. ericoides* L. ramulis tomentosis, foliis oblongis ovatove-oblongis obtusis extus convexis obtuse-carinatis glabris minutis, floribus apice ramulorum axillaribus solitariis tenue-pubescentibus; laciniis corollæ orbiculatis.

*P. ericoides* Linn., Mant. pr. p. 236.  
Burm. pr. Fl. Cap. p. 12.

Hab. ad Promont. bonæ spei. — *β.*

Frutex *P. filiformi* forsitan proxime affinis, differt vero: *ramulis* tomentosis; *foliis* oblongis, ovatove-oblongis, obtusis, extus obtuse-carinatis, dimidio-minoribus; *laciniis corollæ* orbiculatis; dum *P. filiformis* rami pubescente-tomentosi; *folia* linearia s. subulato-linearia, acute-carinata, duplo l. magis longiora; *laciniæ corollæ* oblongæ.

*Obs.* Vidi speciminula ramulorum stirpis ex Herbario Linnæano a Cel. Smith Swartzio missa.

11. *P. rigida*: caulibus ramulisque rigidis, foliis ovatis obtusis minutis oppositis eximie quadrifariam imbricatis extus glabris, floribus apice ramulorum axillaribus solitariis; tubo pubescente, laciniis corollæ oblongis obtusis.

Hab. ad Promont bonæ spei: Prof. Sparrman. —  
 b. (vidi in Herb. Thunb.).

*Frutex* caulibus et ramulis rigidis, superne tomentosis. *Folia* longitudine dimidiæ lineæ, quadrifariam arcte imbricata, ita ut quadrangulares fiant rami et ramuli. *Bractæ* ovatæ l. rotundatæ, obtusæ.

*P. ericoidi* proxima, differt: ramis rigidis; foliis ovatis, eximie quadrifariam imbricatis; bracteis ovatis, rotundatisque, obtusis; floribus minoribus; laciniis corollæ oblongis; dum *P. ericoidis* rami flexiliores; folia ovato-oblonga, distantia (haud quadrifariam imbricata); bractæ acutæ l. acuminatæ; flores majores; lacinia corollæ orbiculatæ; Habitus de cætero diversus.

12. *P. hirsuta* L. ramulis laxis pendulis tomentosis, foliis ovatis oblongisve obtusis extus glabris intus albo tomentosis, floribus terminalibus lateralibusve capitatis dioicis villosis, laciniis corollæ ovatis obtusis.

*P. hirsuta* Linn. Sp. Pl. ed. 1. p. 559.  
 Osb. It. p. 50. Vahl Symb. bot. 1. p. 29. Desfont. Fl. Atl. p. 330. Poir. Voy. en Barb. Vol. 2. p. —. Wendl. Obs. bot. 18. t. 2. f. 16. — *P. Metnan* Forsk. Fl. Ægypt. Arab. p. 81.

Hab. in locis siccis sterilibus Lusitaniæ, Hispaniæ, Italiæ, Galliæ australis et Barbariæ. — b.

Flores monoicos aut dioicos vidit Cel. Desfontaines; ego flores hermaphroditos semel vidi. —

Dixit Cel. Decandolle in Fl. Fr. T. III. p. 359. synonymon Breynii Cent. t. 19 a Linnæo ad *Passerinam hirsutam* citatum ibi excludendum esse.

Ramuli juniores variant foliis duplo longioribus, sublanceolatis & extus tenue-tomentosis; in eadem stirpe tamen folia adulta etiam extus glabra occurrunt. Est *Passerina hirsuta* β Decand. Fl. Fr. 6. p. 366 & Fl. Fr. 3. p. 726. *P. polygalæfolia* Lapeyr. Fl. Pyr. p. 214 sec. Decand. l. c. Tantum junior est stirps, ne quidem varietas. Monet Cel. Decandolle, eam non confundendam esse cum *P. hirsuta* Asso in Stirp. Arrag., quæ *P. tinctoria* Pourretii (s. *Daphne vermiculata* Vahl.).

† 13. *P. salicæfolia* Lam. foliis subulatis hirsutis, tubo elongato superne incrassato tomentoso. Poiret Enc. 5. p. 41.

Hab. —, in Herbario Lamarckii eam vidit Poiret. Obs. Dubia mihi species, quæ ulterius examinanda.

14. *P. Tartonraira* Schrad. ramis ramulisque tomentosis, foliis sparsis obovatis venosis nervosisve utrinque sericeo-villosis sericeisve, floribus axillaribus glomeratis dipicis villosis, basi squamis ovatis cinctis; laciniis corollæ ovatis obtusis.

*P. Tartonraira* Schrad. Neu. Journ. 4. B. I. H. p. 89. Decand. Fl. Fr. 6. p. 366. — *Daphne Tartonraira* Linn. Sp. Pl. ed. I. p. 356. Vahl. Symb. 3. p. 53. Lam. Illust. Gen. t. 290. f. 2. — *D. candicans* Lam. Fl. Fr. 3. p. 221. — *Thymelæa Tartonraira* Allion. Fl. Ped. I. p. 131.

Hab. in locis rupestribus Italiæ & Galliæ australis.

In Corsica: *Noisette* sec. Decand. Fl. Fr. — β.

*Frutex* foliis plus minusve sericeis l. sericeo-villosis nervosis aut venosis. *Florum glomeruli* basi



squamis 5—6 ovatis, obtusis, minutis cincti, omnino ut in *Daphne Laureola*. Flores dioici, quantum reperire potui, quod etiam observavit Olivier sec. Lam. Enc. 3. p. 436. — Quoad folia multimodis variat.

*Daphne oryoides* Herb. Vahl., cujus mentionem fecimus in Dissert. nostr. de *Daphne* p. 54, varietas tantum est foliis sublanceolatis, candicantibus s. tenuissime pubescentibus.

15. *P. nervosa* Thunb. caulibus subsimplicibus glabris, foliis lanceolatis acuminatis glabris subnitidis, supremis eximie venosis nervosisve, floribus terminalibus capitatis utrinque villosis, capitulis brevissime pedunculatis, pedunculo æquali pubescente, laciniis corollæ lanceolatis acutis.

*P. nervosa* Thunb. pr. Fl. Cap. p. 75. —

*P. striata* Lam. Illustr. Gen. t. 291. f. 2.

Poiret Enc. bot. 5. p. 44. sec. specim. in Herb. Vahl.

Hab. ad Promontorium bonæ spei: Prof. et Comend. Thunberg. — b.

Stirps quoad caules & folia nitidus. Ramuli annotini superne rare et tenuissime pubescentes, quod evanescit. Folia valde acuminata, ut fere subulata, suprema eximie venosa raro nervosa, inferiora inevidentius venosa. Pedunculi capitulorum brevissimi et foliis dense tecti. Stamina exserta, 8—12, alia fertilia, alia castrata.

Dixit Cel. Poiret de *P. striata* Lam.: "Les fleurs, quoique solitaires, paroissent agrégées, étant très rapprochées à l'extrémité des rameaux et sortent de l'aisselles des feuilles", at in nostra, quæ re vera eadem ac specimen *P. striatæ* Lamarckii in Herb. Vahl., capitati & terminales sunt flores, foliis quidem arcte cincti, nullo modo vero axillares et solitarii.

16. *P. capitata* L. caulibus ramosis glabris, foliis linearibus acuminatis glabris, floribus terminalibus capitatis utrinque villosis, capitulis longe pedunculatis, pedunculis incrassatis nudis villosis, laciniis corollæ ovatis lanceolatisve acutis.

*P. capitata* Linn. Amæn. 6. p. 88. Spec.

Pl. ed. 2. 1. p. — Berg. Pl. Cap. p. 127.

Wendl. Obs. bot. 18. t. 2. f. 17 sec.

Willd. Sp. Pl. — Burm. Afr. t. 48. f. 3.

Hab. "in campis sabulosis infra Constantiam alibi, que ad Promontor. bonæ spei": Prof. et Commend. Thunberg. — p.

Frutex *P. nervosa* Thunb. proxime affinis, differt: caulibus ramosis; foliis linearibus, fere subulatis, enervosis; pedunculo capitulorum incrassato, villosio; floribus numerosioribus, minoribus; laciniis corollæ ovatis lanceolatisve; dum *P. nervosa* caules subsimplices; folia lanceolata, eximie s. argute acuminata, nervosa l. venosa; pedunculi capitulorum æquales, pubescentes; flores pauciores, majores; laciniæ corollæ lanceolatæ.

*P. capitata* variat numero staminum, 8—16, quorum alia fertilia, alia castrata.

17. *P. globosa* Lam. ? foliis sparsis obovatis sessilibus imbricatis planis ramisque sericeo-villosis, floribus terminalibus lateralibusve aggregatis villosis dioicis: laciniis corollæ ovatis obtusis minutis, germine glabro.

*P. globosa* Lam. Illustr. Gen. t. 291. f. 4 et Poir. Enc. bot. 5. p. 42 ? *P. planifolia* Burm. Prodr. Fl. Cap. & Afr. t. 46. f. 3 ?

Hab. ad Promontor. bonæ spei. p. (vidi in Herb. Vahl.).

*Frutex* ramis inferne glabris, superne villosissimis. *Folia* sparsa, obovata, sessilia, integerrima, imbricata, plana, utrinque sericeo-villosissima, adulta interdum margine nuda, 3 l. 4 lineas longa duasque lata. *Flores* terminales l. laterales, aggregati, 5 l. 6, minuti, dioici, villosi, foliis cincti; *corolla* oblonga, lineam longa: *laciniæ corollæ* minutæ, ovatae, obtusæ. Stam. — *Germen* ovatum, glabrum, apice pubescens. *Stylus* brevis; *Stigma* capitatum, muricatum. — Flores sordide-flavi videntur.

Dubius sum, an Planta nostra, quam in Herb. Vahl. vidi, etiam Lamarckii sit, dum Cel. Poirer folia descripsit uti "concaves, toujours glâbres en dessus, bombées en dessous."

Affinitatem ejus haud determinare potui. E diagnosi forsan videretur, quod affinis sit *P. Tartonraia*, at ab hac valde diversa: ramis villosissimis; foliis distinctius obovatis, villosissimis, imbricatis, enervibus; floribus paucioribus, minoribus, basi squamatis, dum *D. Tartonraia* caules tomentosi; folia minus distincte obovata & sericeo-villosa, venosa l. nervosa, haud imbricata; flores plures, majores, basi squamis cincti.

*Obs.* Specimen, quod vidi in Herb. Vahl., ex Insulis balearicis habuit Cel. Vahl sec. adnotationem ejus; crediderim tamen, hanc locum false allatum esse.

† 18. *P. orientalis* Willd. foliis lanceolatis subcarnosis obtusis glabriusculis, floribus axillaribus. Willd. Sp. Pl. Tom. II. P. I. p. 431. Hab. in Oriente et Hispania: Willdenow. — b.

19. *P. ciliata* L. ramis superne pubescentibus inferne glabris, foliis linearibus lanceolato-linearibus obtusis sparsis oppositisve glabris ciliatis apice villoso, floribus terminalibus

1. axillaribus solitariis sericeis: laciniis corollæ lanceolatis oblongisve acutis.

*P. ciliata* Linn. Sp. Pl. ed. I. T. 1. p. 559. Berg. Pl. Cap. p. 126. Dryand. in Linn. Transact. 2. p. 234. Willd. Sp. Pl. II. 1. p. 431. — Burm. Afr. p. 125. t. 46 f. 2.

Hab. "in collibus extra Urbem ad Promontorium bonæ spei": Prof. et Commend. Thunberg. — b.

*Frutex* ramis simpliciusculis, superne hirsutis, inferne glabris. *Folia* sparsa, linearia, lanceolato-l. oblongo-linearia, obtusa, sessilia, integerrima, glabra, superiora præcipue pulchre argenteo-ciliata, apice villosa. *Flores* in ramulorum summitates terminales, axillares, solitarii, attamen valde approximati (ut fugaci intuitu aggregati videantur), sericei, majores: *Lacinia* *Corollæ* lanceolatæ l. oblongæ, acutiusculæ l. obtusæ, lineam superantes.

*Obs.* *Passerina* 2 Hort. Cliff. a Linnæo huc citata ad *Struthiolam virgatam* pertinet sec. Dryander l. c. — *Thymelæa* Burm. Afr. t. 47. f. 2, etiam a Linnæo ad *P. ciliatam* relata, ad *Struthiolam* sic dictam *ciliatam* Andr. sine dubio pertinet.

20. *P. Thymelæa* Decand. ramis simplissimis glabris, foliis lanceolatis mucronatis, floribus axillaribus subsolitariis sessilibus: laciniis corollæ lanceolatis acuminatis.

*P. Thymelæa* Decand. Fl. Fr. 6 p. 466. — *Daphne Thymelæa* Linn. Sp. Pl. ed. I. T. I. p. 356. Vahl. Symb. I. p. 28. Gerard. Fl. Prov. t. 17. f. 2. Dissert. nostr. de *Daphne* p. 7. — *Thymelæa Sanamunda* Allion. Fl. Ped. I. p. 131.

Hab. in locis petrosis, montosis Hispaniæ, Galliæ australis & Italiæ. — b.



Conf. Dissert. nostram, ubi fusius *P. Thymelæam*, *vermiculatam* & *villosam* descripsimus.

† 21. *P. pubescens* floribus sessilibus lateralibus aggregatis, foliis lanceolato-linearibus; caule pubescente Linn. Mant. pr. p. 66 sub *Daphne*.

*Daphne pubescens* Linn. l. c. — Conf. Dissert. nostr. de *Daphne* p. 9 & 10.

“Hab. in Austria D. Jacquin.”: Linn. l. c.

Dubia adhuc species, a nemine post Linnæum descripta. In libris de plantis austriacis haud memoratur. Locus natalis certe mendose est designatus. Docuit etiam me Cel. Horneman, b. m. Vahlum ad descriptionem Linnæi adjecisse: “Habitat in Hispania (non in Austria)”.

Anne *D. pubescens* una eademque sit ac *D. coridifolia* vel *D. Thesioides* Lam? — Cel. Smith optime Loc dubium dissolvere potest.

22. *P. villosa*: ramulis superne albo-pilosis, foliis lanceolatis ellipticisve obtusis planis albo pilosis ciliatisque, floribus rare albo-pilosis: laciniis corollæ lanceolatis obtusis.

*Daphne villosa* Linn. Sp. Pl. ed. 2. T. I. p. 510. Dissert. nostr. de *Daphne* p. 12.

Hab. in Lusitania, ubi primo detexit Tournefort.

In Hispania: Alströmer. — p.

Obs. In Dissert. nostra et in ipsa diagnosi *P. villosa* p. 12. l. 17 ante “minutis” oblivione prætermissa sunt sequentia: foliis lanceolatis ellipticisve obtusis.

† 23. *P. tomentosa*: floribus sessilibus axillaribus, foliis oblongis obtusis utrinque sericeo-tomentosis Lam. Enc. bot. 3. p. 436 sub *Daphne*.

*Daphne tomentosa* Lam. l. c. Dissert. nostr. de *Daphne* p. 14.

Hab.

Hab. in Oriente: Lamarck. — .

Dubia species, et a Lamarckio imperfecte descripta.

24. *P. thesioides*: caulibus subsimplicibus sursum pubescentibus inferne glabris, foliis sparsis sessilibus linearibus obtusis glabris, floribus axillaribus binis ternisve tenuibus pubescentibus: laciniis corollæ lanceolatis ovatisve obtusiusculis.

*P. linariaefolia* Pourret sec. Herb. Acharii. —

*Daphne thesioides* Lamarck Enc. bot. 3. p. 437 & Illustr. Gen. t. 290. f. 4. Pers. Syn I. p. 437. Dissert. nostr. de Daphne p. 15.

Hab. in Hispania sec. Herb. Acharii. — 3.

*Fruticulus* trunco valido, brevi, verrucoso, glabro, brunneo; *caules* simplices, sursum pubescentes, inferne glabri, ex tota fere longitudine foliosi. *Folia* sparsa, sessilia, linearia, inferne conferta, superne versus flores rariora, obtusa, integerrima, glabra, læte-viridia, 2—4 lineas longa, medio latitudine tertiæ lineæ partis. *Flores* e medio ad apices caulium egredientes, axillares, bini ternive, pubescentes, dioici: *Corolla* duas lineas longa; *Tubus* linearis; *Lacinia corollæ* lanceolatæ l. ovatæ, obtusiusculæ, l. acutiusculæ, dimidiam lineam longæ. *Stamina* duor. ordin., ut in plerisque: *Anthera* sessiles, oblongæ, biloculares, luteæ. *Germen* oblongum, glabrum, apice tenuissime pubescens; *Stylus* brevis, glaber. *Stigma* capitatum.

In caulibus junioribus flores longiores, tenuiores et lacinia corollæ angustiores quam in caulibus adultis.

Nescimus quo loco Cel. Pourret stirpem descripsit, at sub nomine allato a Cel. Dufour spe-

cimina in Hispania lecta habuit Cel. Acharius; stirpem etiam in Herb. Vahlî vidi.

Proximè certe affinis est *P. coridifolia*, at bene distincta.

25. *P. coridifolia*, caulibus diffusis ramosis sursum pubescentibus inferne glabris, foliis sparsis sessilibus linearibus obtusiusculis glabris, floribus spicato-axillaribus solitariis pubescentibus bibracteatis, laciniis corollæ minutis ovatis obtusis.

*Daphne coridifolia* Lamarck. Enc. 3. p. 437.

Pers. Syn. I. p. 435. Dissert. nostr. de Daphne p. 14.

Hab. in Galicia Hispaniæ: Herb. Iuss. sec. Lamarck. l. c. —  $\beta$ .

*Fruticulus* ramosus: caulibus diffusis, laxis, ramosis, sursum pubescentibus, inferne glabris, brunneis. *Folia* sparsa, sessilia, minuta, linearia, obtusiuscula, integerrima, glabra, 2 l. 3 lineas longa, latitudine tertiæ lineæ partis. *Flores* versus apices ramulorum spicato-axillares, solitarii, pubescentes, bracteati: bracteis minutis, ovatis, obtusis, concavis, extus pubescentibus, tertiæ lineæ partis longitudine. *Corolla* lineam longa: *Laciniis* minutis, ovatis, obtusis, longitudine tertiæ lineæ partis. *Stamina* 8, duor. ord. ut in plerisque cæteris: *Antheræ* sessiles, oblongæ, biloculares, luteæ. *Germen* minutum, oblongum, villosum; *stylus* brevissimus; *stigma* capitatum.

Proximè accedit ad *P. thesioidem*, at differt: caulibus diffusis, laxis; foliis sæpe minoribus; floribus spicato axillaribus, minoribus, solitariis hermaphroditis bracteatis; laciniis corollæ minoribus, ovatis, germine villosis; dum *P. thesioidis* caules strictiores, subsimplices; folia majora; flores axillares, bini ternive, dioici, ebracteati; laciniæ corollæ majo-

res, lanceolatae l. ovatae; *germen* glabrum, apice tenuissime pubescens.

Lamarckii Illusr. t. 290 f. 2 a Cel. Persoon in synops. Pl. l. p. 435 & 437 et ad *D. thesioidem* Lam. et ad *P. calycinam* Lapeyr. citatur, quæ olim a Willdenowio etiam ad posteriorem speciem fertur. Retulit vero Cel. Decandolle figuram laudatam ad *Passerinam nivalem* Ramond, uti etiam descriptionem *D. calycinæ* Lamarckii Enc. bot. 3. p. 420.

26. *P. dioica* Ramond: caulibus ramosissimis verrucosis glabris, foliis sparsis confertis lanceolatis l. cuneiformibus obtusis glabris, floribus axillaribus terminalibusve solitariis l. binis dioicis hermaphroditisve basi squamis pluribus minutis cinctis, laciniis corollæ ovatis lanceolatisve acutis.

*P. dioica* Ramond. in Bullet. Philom. N:o 41 sec. Decand. Fl. Fr. Tom. III. p. 359. Pers. Syn. Pl. l. p. 437. — Dissert. nostr. de *Daphne* p. 9. — *P. empetrifolia* Lapeyr. Hist. Abrég. des pl. des Pyr. p. 212 sec. Decand. l. c. et specim. in Herb. Achar. — *Daphne dioica* Gouan Illustr. p. 27. t. 17 f. l. Lam. Enc. 3. p. 419. Willd. Sp. Pl. II. p. 416. — *D. calycina* Berger. Fl. basses Pyren. 2. p. 211 excl. syn. sec. Decand. Fl. Fr. 6. p. 366. — *Thymelæa dioica* Allion. Auctar. ad. Fl. Ped. p. 9.

Hab. in locis apricis alpium Pyrenæorum eundo a pago s. Pauli de Fenouilhede ad pagum St. Martin ad Lævam in saxosis ultra pontem dictum de Lafons. In montibus Les Corbieres près de Narbonne: Gouan l. c. Supra Tenda Pedemonti



in rupibus meridianum solem spectantibus: Al-  
lioni. — b.

• *Frutex* caulibus ramosis, verrucosis, glabris. *Folia* sparsa, conferta, sessilia, lanceolata l. cuneiformia, basi angustata, obtusiuscula l. interdum acutiuscula; integerrima, glabra, 3 lineas longa, versus apices dimidiam lata. *Flores* axillares, laterales l. terminales, solitarii l. bini, hermaphroditi l. dioici, glabri, basi squamis cincti: *squamis* minutis, lanceolatis, acutis, integerrimis, pluribus, 6—8, glabris, dimidiam lineam longis. *Corolla* tres lineas longa: *laciniis corollæ* ovatis l. lanceolatis, acutis, lineam fere longis. *Stamina* duor. ordin. ut in plerisque: *Filamenta* brevissima; *antheræ* oblongæ, biloculares, luteæ. *Germen* oblongum, villosum; *Stylus* brevissimus; *Stigma* capitatum.

A *P. thesioide* differt: *caulibus* ramosis, verrucosis, glabris; *foliis* lanceolatis l. cuneiformibus, apice latioribus; *floribus* paucioribus, versus apices tantum caulium, glabris, subnitidis, basi squamis pluribus cinctis; *germine* villosa; dum *P. thesioidis* caules subsimplices, sursum pubescentes; *folia* linearia; *flores* numerosiores, e medio ad apices caulium provenientes, basi esquamati, tenue pubescentes; *germen* glabrum, apice tantum pubescens.

A *P. coridifolia* differt: *caulibus* verrucosis, glabris; *foliis* lanceolatis l. cuneiformibus, apice latioribus; *floribus* paucioribus, axillaribus, glabris, basi squamis pluribus lanceolatis cinctis; *laciniis corollæ* lanceolatis ovatisve, obtusiusculis; dum *P. coridifoliæ* caules læves, sursum pubescentes; *folia* linearia; *flores* plures, spicato-axillares, minores, pubescentes, basi bibracteati: *laciniæ corollæ* ovatae, obtusæ.

Dicit Cel. Decandolle de *P. dioica*: "Fleures dioiques par avortement". — Ego et flores hermaproditos et diclinos nunc inveni.

26. *P. calycina*: — caulibus divaricatis inferne glabris apice pubescentibus, foliis sparsis sessilibus lineari-lanceolatis acutis l. obtusiusculis glabris supra nitidis, floribus lateralibus axillaribus solitariis binisve breve pedicellatis basi glabratis dioicis bibracteatis: laciniis corollæ minutis ovatis obtusis.

*P. calycina* Decand. Fl. Fr. Pers. Syn. l. p. 237 (exclus. syn. Lamarckii). *P. juniperifolia* α Lapeyr. Abr. p. 213 sec. Decand. Fl. Fr. 6. p. 366. *Daphne calycina* Lapeyr. in Mem. Toul. l. p. 209 t. 13 sec. Decand. l. c. Willd. Sp. Pl. 2. p. 416.

Hab. in alpihus Pyrenæorum Orientalium in monte Bernadouze, in valle Vicdessos, aux Comté de Foix, sec. Lamarck et Decandolle. — b.

*Frutex* caulibus ramisque sparsis, divaricatis, inferne glabris, sursum pubescentibus, foliosisque, *Folia* sparsa, sessilia, lineari-lanceolata, l. lanceolata, obtusiuscula l. acutiuscula, integerrima, utrinque glabra, supra intense, subtus dilute-viridia, 5 l. 6. lineas longa, unamque lata. *Flores* laterales, axillares, solitarii binive, brevissime pedicellati, dioici, basi glabratis, superne versus lacinias tenuissime et rare pubescentes, bracteati: *bracteis* binis, minutis, ovatis, obtusis, glabris: *Corolla* lineam paullo superans, ovata, *tubus* basi ventricosus; *Lacinia* corollæ minutæ, ovatæ, obtusæ; *Stamina*. — *Germen* ovatum, glabrum. *Stylus*

lateralis, brevissimus; *Stigma* capitatum, muricatum. *Nux* ovata, glabra.

*P. nivalis* Ram. huic proxime affinis et forsā ab hac non diversa.

*Daphne calycina* Lam. Enc. 3. p. 420, Illustr. Gener. t. 290 f. 3 et a Willdenowio et a Persoonio huc citatur. Dixit vero Decandolle, ad *P. nivalem* Ram. referendam esse.

Flores dioicos inveni, dum Cel. Decandolle eos hermaphroditos descripsit; dixit quoque, germen pubescens esse, quod ego semper glabrum vidi.

Quinam fuit Auctorum, qui stirpem primo ad Passerinam retulit, nescimus.

† 28. *P. nivalis* Ram. ramis prostratis, foliis linearibus obtusiusculis carnosis subciliatis, floribus axillaribus dioicis. Ramond in Bullet. Philom. N:o 41. p. 131. t. 9. f. 3.

*P. nivalis* Pers. Syn. I. p. 437. Decand. Fl. Fr. Gærtn. Suppl. Carpol. III. p. 198. t. 215. f. 6. — *P. juniperifolia* β. Lapeyr. Abr. p. 213. sec. Decand. Fl. Fr. 6. p. 366. — *Daphne calycina* β Loisel. Fl. Gall. I. p. —. *D. calycina* Lamarck Enc. bot. 2. p. 420. t. 290. f. 3. sec. Decand. Fl. Fr.

Hab. in summis alpibus Pyrenæorum ad Port de Gavannie et circa Mont Perdu: Ramond sec. Decand. Fl. Fr. — b.

Sec. Cel. Decandolle medium tenet inter *P. dioicam* et *P. calycinam*; ab illa differre dicitur: ramulis parum aut non tuberculatis; foliis linearibus oblongisve, haud apice latioribus, sæpe villosopilosis (hérissées de poils épars); floribus bracteatis, et ab hac: ramificationibus magis patentibus (ouvertes); foliis brevioribus, minus glabris; floribus extus glabris. — Quærit Cel. Decandolle an a *P. calycina* diversa? — Ego nec stirpem vidi nec

Bulletin philom, itaque de hac re nihil dicere valeo.

29. *P. tinctoria* Pourr. caulibus sursum tenuissime lanatis, foliis lineari-lanceolatis l. linearibus obtusis tenuissime lanatis, floribus axillaribus lateralibus sessilibus solitariis glabris bibracteatis; laciniis corollæ ovatis acutis.

*P. tinctoria* Pourret Chlor. Narb. p. 27 sec. specim. in Herb. Thunb. Pers. Syn. I. p. 437. — *P. hirsuta* Asso Stirp. Ar. rag. sec. Decand. Fl. Fr., Brot. Fl. Lusit. sec. Roem. Collect. p. 265. — *Daphne vermiculata* Vahl Symb. bot. I. p. 28. Dissert. nostr. de Daphne p. 10.

Hab. in Arragonia: *Vahl*. In Gallia Narbonensi a Baccelone ad Mont Ferrat sec. Persoon l. c. — b.

Frutex *P. calycinæ* proxime affinis, differt vero: caulibus subrectis, sursum tenuissime lanatis; foliis magis linearibus, obtusis, utrinque tenuissime lanatis; floribus sessilibus, glabris, nervosis; laciniis corollæ, majoribus; dum *P. calycinæ* caules divaricati, sursum pubescentes; folia lineari-lanceolata, obtusiuscula l. acutiuscula, utrinque glabra; flores breve pedicellati, magis ventricosi, versus limbum rare et tenuissime pubescentes, enervosi, dioici; laciniæ corollæ minores.

Cum *P. thesioides* et *coridifolia* nullam habet affinitatem. Conf. de cætero Dissert. nostram de Daphne.

30. *P. nitida* Desfont. ramis sericeo-villosis, foliis sparsis sessilibus lanceolatis l. cuneiformibus obtusis utrinque sericeis, floribus lateralibus l. terminalibus aggregatis sericeis; laciniis corollæ lanceolatis acutis conniventibus.



*P. nitida* Desfont. Fl. Atl. I. p. 331. t. 94. Pers. Syn. I. p. 437. *Daphne nitida* Vahl Symb. bot. 3. p. 53. Pers. Syn. I. p. 434. Willd. Sp. II. p. 418. — *D. argentata* Lam. Enc. 3. p. 436.

Hab. in montibus calcareis Tuneti: *Vahl*. In montibus incultis circa Tunetum, Mascar et aliis locis Barbariæ: *Desfontaines*. — **♂**.

*Frutex* ramosissimus: ramis teretibus sursum sericeo-villosis, inferne glabris. *Folia* sparsa, sessilia, lanceolata l. cuneiformia basi angustata, obtusa, integerrima, utrinque sericea, tres lineas longa, apice dimidiam lata. *Flores* laterales l. terminales aggregati, sessiles, sericei, hermaphroditi vel dioici, foliis arcte cincti. *Corolla* 3 lineas longa: *Laciniis* lanceolatis, acutis, conniventibus. *Stam.* duor. ordin. ut in plerisque cæteris: *Filamenta* brevissima; *Antheræ* oblongæ. *Germen* oblongum, glabrum, apice pubescens; *stylus* lateralis, brevissimus; *stigma* capitatum, pubescens. *Nux* ovata, glabra.

*P. Tartonrairæ* forsan proxime affinis, differt vero: ramis tenuioribus, sericeis; *foliis* cuneiformibus l. lanceolatis, confertioribus, enervosis, dimidio minoribus; *floribus* tenuioribus, sericeis, longioribus: *laciniis corollæ* lanceolatis, acutis, conniventibus; dum *P. Tartonrairæ* rami firmiores, villosi; *folia* ovata, nervosa l. venosa, villosiora, duplo majora; *flores* majores at breviores, villosi, basi squamati: *squamis* pluribus, minutis, ovatis; *laciniæ corollæ* ovatæ, obtusæ.

Adest in Herbario Bergian. stirps in Alpibus Granadensibus a Lib. Bar. Claud. Alströmer lecta. floribus adhuc non explicatis, quæ eadem ac *D. nitida* esse videtur; flores squamis ovatis minutis cincti. — Nec vero Cel. Vahl nec Cel. Desfontaines

in descriptionibus suis de talibus squamis mentionem fecerunt; nec ego in *D. nitida* tales inveni; itaque forsitan stirps Alströmeri alia est species. Possibile quoque, *P. nitidam* squamas illas statim post florum explicationem perdere.

31. *P. Lessertii*: ramulis inferne glabris sursum villosis, foliis sparsis adultis subellipticis obtusiusculis junioribus lanceolatis acutiusculis brevissime petiolatis utrinque piloso-pubescentibus, floribus racemosis: laciniis corollæ lanceolatis obtusis.

Hab. in Persia: de Lessert sec. Herb. Vahl. — 6.

*Fruticulus* ramis ramulisque inferne glabris, sursum villosis. *Folia* sparsa, adulta subelliptica obtusiuscula, juniora lanceolata acutiuscula, brevissime petiolata; utrinque piloso-pubescentia, adulta interdum glabriuscula, viridia, 4—7 lineas longa, 1—3 lata. *Petoli* villosi, longitudine tertiæ lineæ partis. *Flores* racemosi, villosi, numerosi: *Corolla* 4 lineas longa; tubus basi villosissimus, tres lineas longus: *laciniæ corollæ* lanceolatae, obtusæ, lineam longæ. *Stam.* duor. ordin: *Antheræ* subsessiles, oblongæ, biloculares, luteæ; *Germen* oblongum, glabrum. apice pubescens; *stylus* brevissimus, superne villosus; *stigma* capitatum, muricatum.

Habitus hujus stirpis a cæteris *Thymelæis* valde alienus et racemis efoliatis insignis. Cuinam etiam specierum *Passerinæ* proxime sit affinis, eruere non potui.

32. *P. virgata* Desfont: canescens, caulibus erectis virgatis sursum villosis, foliis sparsis sessilibus lanceolatis obtusis utrinque villosiusculis, floribus axillaribus aggregatis sessilibus villosis: laciniis corollæ lanceolatis obtusis.

*P. virgata* Desfont. Fl. Atl. I. p. 331.

t. 95. Pers Syn. Pl. I. p. 437. Poiret  
Enc. 5. p. —.

Hab. in arvis incultis prope Tlemsen Barbariæ:

*Desfontaines*. In Marocco: *Broussonet*. — b.

*Frutex* canescens ramis longis, erectis, subteretibus, inferne glabris, sursum villosis. *Folia* sparsa, sessilia, lanceolata, obtusa l. obtusiuscula, integerrima, inferiora minus, superiora magis villosa s. villosiuscula, 3—9 lineas longa, duasque lata. *Flores* axillares, aggregati, 3—6, sessiles, villosi: *Corolla* tres lineas longa; *tubus* linearis; *laciniæ corollæ* lanceolatae, obtusæ, dimidiam lineam longæ. *Stam.* duor. ordin; *germen* oblongum, villosopubescent; *stylus* brevis; stigma capitatum, muricatum.

*Obs.* folia inferiora interdum glabra.

33. *P. canescens* Schousb. ramulis tenuibus lanatis, foliis sparsis imbricatis lanceolatis ovatisve acutis utrinque lanuginosis, floribus terminalibus aggregatis sessilibus dioicis villosis: laciniis corollæ ovatis obtusis.

*P. canescens* Schousb. in Act. Hafn —  
Willd. Sp. Pl. II. p. 432 Pers. Syn. I.  
p. 437. — *Daphne lanuginosa* Lam. Enc.  
3. p. 436. (sec. specim. Herb. Vahl. a  
Lamarck datum).

Hab. copiose in locis sterilibus petrosis inter Gibraltar et pagum St. Rocque Hispaniæ: *Schousboë*.

Ad Tanger Barbariæ sec. Dietrich Gärtn. Lex.

*Stirps* ex omni parte canescens. *Folia* dense imbricata. Cui proxime sit affinis, dicere, haud valeo; A *P. virgata* Desfont. valde diversa.

† 34. *P. tenuiflora* Willd. foliis linearibus glabris, floribus sessilibus capitulis terminalibus filiformibus sericeis, ramis strigoso-villosis. Willd.  
Enum. Hort. Berol. I. p. 426.

Hab. ad Promont. bonæ spei: Willdenow. — b.

*Obs.* Stirpem haud vidi, nec affinitatem ejus ex descriptione brevi et manca diagnosi Willdenowii enucleare potui.

35. *P. linearifolia*; ramulis verrucosis glabris, foliis sparsis sessilibus linearibus obtusis glabris extus convexiusculis; floribus terminalibus paucis villosis: laciniis corollæ lato-lanceolatis acutis.

Hab. ad Promontor. bonæ spei: Prof. Thunberg.  
— b. (Herb. Berg.).

*Frutex* ramis glabris ramulisque pruinoso-verrucosis. *Folia* sparsa, sessilia, linearia. obtusa, integerrima, utrinque glabra, extus convexiuscula, viridia, 4. l. 5. lineas longa unamque lata. *Flores* terminales, aggregati, pauci (1-3), rosei, extus villosi: *Corolla* 3 l. 4. lineas longa: *laciniis corollæ* majoribus, lato-lanceolatis, acutis: lineam superantibus; faux villis clausis *Stam.* duor ordin: *Antheræ* sessiles; *Germen* oblongum, glabrum, apice villosum; *Stylus* stamina inferiora æquans; *Stigma* obtusum.  
*Obs.* folia suprema rarius pilis paucissimis obsita.

Inter Passerinas nullam huic affinem invenio; certissime vero *Gnidia tomentosa* maxime propinqua, a qua præter characterem genericum differt: *ramulis* glabris; *foliis* linearibus, sessilibus, lineam laeis, *floribus*, paucioribus, 2l. 3, dimidio fere-brevioribus; fauce villosa; *laciniis corollæ* longioribus; dum *G. tomentosa* ramuli sæpe pilosiusculi; *folia* ovata l. elliptica, brevissime petiolata, extus et margine sæpe pilosa; *flores* numerosiores, 3-5, duplo fere longiores, villosiores: *laciniis corollæ* minoribus.

36. *P. Thunbergii*: ramulis sericeo-pubescentibus, foliis oppositis sessilibus lanceolatis ellipticisve obtusiusculis subamplectentibus utrinque villosiusculis, floribus terminalibus



l. axillaribus binis ternisve sericeis: laciniis corollæ lanceolatis acutis.

*Gnidia oppositifolia* Thunb. prodr. Fl. Cap. p. 76. (haud vero Linnæi).

Hab. "in proclivis Leuvestart ad Promontor. bonæ spei": Prof. Thunberg. — b.

*Fruticulus* canescens et habitum *Caryophyllæarum* cujusdam ita mentiens, ut sine floribus visum, *Cucubalum* quemdam nec hujus ordinis esse, jures. *Rami* diffusi, sursum tenue villosi, inferne glabri. *Folia* opposita, sessilia, ad insertionem tumida et amplectentia, omnino fere articulationem *caryophyllæarum* formantia, lanceolata l. elliptica, integerrima, obtusiuscula, utrinque villosiuscula, canescentia, 3 l. 4 lineas longa, unamque sæpe cum dimidia lata. *Flores* terminales l. axillares, tenues, sericei, bini l. terni: *Corolla* 5 circiter lineas longa: tubo filiformi; *laciniis* lanceolatis, acutis, lineam longis. *Stam* duor. ordin.: *Filam.* brevissima; *Antheræ* oblongæ. *Germen* ovatum, glabrum; *Stylus* lateralis, glaber, ad medium tubi procedens; *Stigma* capitatum, pubescens.

Absentia squamularum faucis hanc speciem *Passerinæ* generis esse docet.

*P. nitidæ* et *P. canescenti* affinis videtur.

37. *P. uniflora* L. foliis oppositis sessilibus linearibus acutiusculis extus convexis glabris, floribus terminalibus sessilibus solitariis sericeis: laciniis corollæ lato-lanceolatis acutis acuminatisve.

*P. uniflora* Linn. Sp. Pl. l. p. 560. Wendl. Obs. bot. 19. t. 2 f. 18 sec. Willd. Sp. Pl. 2. p. 432 Thunb. pr. Fl. Cap. p. 76. — *P. uniflora* α Berg. Pl. Cap. p. 128. — Afr. t. 48 f. l. & 2.

Hab. "in collibus infra Taffelberg rarius et alibi ad Promont. bonæ spei": Prof. Thunberg. — *♂*.

*Frutex* ramis sursum pubescentibus inferne glabris. *Folia* linearia, lateribus compressis, extus obtuse carinata, glabra, lineam cum dimidia longa. *Stam.* duor. ordin., exserta; latent vero in fundo tubi paullo supra germen 8 *Antheræ* sessiles, biloculares, polline repletæ, quas Cel. Wendland pro squamulis nectariferis falso habuit, a Bergio glandulæ et quidem steriles audiunt, quod præsentia pollinis vehementer obstare videtur.

38. *P. grandiflora* Linn. fil. foliis oppositis decussatis oblongis obtusis extus convexis intus concavis glabris, floribus terminalibus solitariis sessilibus sericeis: laciniis corollæ oblongis obtusis.

*P. grandiflora* Linn. Suppl. p. 226. Willd. Sp. Pl. II. p. 432 (excl. Syn. *P. linoides* Thunb.). Curt. Mag. t. 292. — *P. uniflora*  $\beta$  *alba* Berg Pl. Cap. p. 129. — Burm. Afr. t. 46. f. 1.

Hab. ad Promont. bonæ spei. *♂*.

*Frutex* proxime affinis *P. unifloræ*, differt vero: foliis oblongis, obtusis, magis concavis, obsolete carinatis, duplo fere majoribus; floribus magnis: laciniis corollæ oblongis, obtusis; dum *P. unifloræ* folia linearia, acutiuscula, evidenter carinata, minus concava, minora; flores minores: laciniis corollæ lanceolatis, acutis l. acuminatis.

In hac specie ut in præcedenti stamina et styus exserta. Latent etiam 8 *Antheræ* sessiles, verus basin tubi paullo supra germen.

Willdenow *P. linoidem* Thunb. cum interrogatione huc citat; at stirps illa *Gnidia* est et a *P. grandiflora* valde diversa, uti supra memoravimus.

39. *P. laxa* Linn. fil. ramis longis tenuibus laxis, foliis sparsis sessilibus inferioribus linearibus glabris superioribus lanceolatis extus pubescentibus obtusiusculis, floribus terminalibus aggregatis pubescentibus, tubo supra germen coarctato: laciniis corollæ minutis oblongis obtusis conniventibus.

*P. laxa* Linn. Suppl. p. 226. Thunb. pr. Fl. Cap. p. 75. Wendl. obs. bot. 20. t. 2. f. 20. sec. Willd. Sp. Pl. II. p. 433.

Hab. "in montibus prope et extra Cap, vulgaris in collibus prope urbem ad Promontor. bonæ spei:" Prof. Thunberg. — b.

Maxime affinis est *Gnidia carinata* Thunb., at præter characterem genericum differt: ramis tenuioribus; foliis minoribus, superioribus minutis lanceolatis oblongisve (inferioribus *G. carinata* omnino similibus); floribus paucioribus, tenuioribus; tubo evidenter coarctato; laciniis corollæ minoribus, conniventibus; dum *Gnidia carinata* rami firmiores; folia majora, omnia linearia; flores numerosiores, majores: tubo obsolete coarctato s. æquali: laciniis corollæ majoribus, apertis; squamulæ faucis insuper 8. Flores flavo colore chartam tingunt, *P. laxæ* flores non ita.

*P. laxæ* ramuli sursum pubescentes inferne glabri. Folia obtusiuscula l. acutiuscula. Flores sordide flavi, apice sæpe violacei.

40. *P. spicata* L. fil. foliis sparsis sessilibus ovatis ellipticisve extus pubescentibus, floribus axillaribus solitariis sessilibus pubescentibus: laciniis corollæ lanceolatis acutis.

*P. spicata* Linn. Suppl. p. 226. Thunb. pr. Fl. Cap. p. 75. Wendl. Obs. bot. 19. t. 2. f. 19 sec. Willd. Sp. Pl. II. p.

433 Ejusd. Enum. pl. Hort. Berol. p.

426. — *P. lateriflora* Hortulanor.

Hab. "in campis sabulosis ad Promontor. bonæ spei". Prof. Thunberg. — *b*.

Ramuli sursum pubescentes inferne glabri. —  
"Ramulis floriferis refert spicam foliosam". Linn.  
fil. l. c.

41. *P. anthylloides* Linn. fil. ramulis sursum  
villosissimis inferne glabris, foliis sparsis  
brevissime petiolatis lanceolatis ellipticisve  
obtusis extus villosis intus glabriusculis, flo-  
ribus terminalibus capitatis quinquefidis vil-  
losissimis decandris: laciniis corollæ oblon-  
gis obtusis.

*P. anthylloides* Linn. Suppl. p. 226. Thunb.

pr. p. 76. — *P. anthylloides* *β* Thunb.

Mus. Nat. Acad. Ups. P. XIII. p. 106.

Hab. "trans Swellendam et prope Musselbay ad  
Promontor. bonæ spei". Prof. Thunberg. — *b*.

*Frutex* ramulis sursum villosissimis inferne  
glabris. *Folia* superiora extus villosissima, inferiora  
utrinque subglabra l. pilis paucis rare obsita, ner-  
vosa l. venosa, unquicularia, medio duas lineas  
lata. *Flores* numerosissimi, villosissimi, longissimi  
s. 10. - 15 lineas longi.

*P. anthylloides* *α* Thunb. Mus. Nat. l. c. huic  
quam intime est affinis, attamen ad *Gnidiam* per-  
tinet respectu squamularum faucis.

---

*P. stricta* Thunb., *linoides* Thunb., *setosa*  
Thunb. et *anthylloides* *α* Thunb. a me ad *Gni-*  
*diam* relatæ sunt. — *P. pentandra* Thunb. non ad  
*Thymelæas* pertinet, sed proprium constituit genus,  
nomine *Lonchostomæ* a me propositum.

Quid *Passerina pectinata* Loddig. Catal. plant.  
1816 p. 18?



Lusus partium formæ, numeri et vestitus nullam admittit bonam dividendi generis normam, quare satius intactum relinquere existimavi, quam affines artificiali quodam auxilio nimis disjungere.

#### 10. DAIS, Linn.

Crediderunt Auctores varii, nomen hujus Generis derivatum esse a *dais*, tæda, quia *D. cotinifolia* caules resinosum quoddam in se habent.

Quoad characterem genericum vacillat hoc genus, nec numerus constans est staminum. Involucrum præterea habent plures species cæterarum Thymelæarum. Fructum baccam appellaverunt Auctores; potius nucem esse crederem \*).

1. *D. cotinifolia* L. foliis ellipticis acutiusculis glabris, floribus terminalibus aggregatis quinquefidis villosis decandris: laciniis corollæ lanceolatis acuminatis.

*D. cotinifolia* Linn. Sp. Pl. ed. I. p. 556.

Lam. Ill. Gen. t. 361. f. 1. Curt. Mag. t. 147. — *D. laurifolia* Jacq. Collect. II. p. 146 et Ic. rar. t. 77.

Hab. ad Promontor. bonæ spei. f.

*D. laurifolia* Jacq. una eademque ac *D. cotinifolia* L., quantum ego quidem indagare potui, esse videtur, sed a Willdenowio ut varietas ad *D. octandram* relata est.


2. *D. octandra* Burm. foliis oblongis acutis glabris, floribus terminalibus aggregatis quadridis octandris glabris: laciniis corollæ oblongis acutiusculis apice extus pubescentibus.

*D. octan-*

---

\*) Querit Ventenat, "anne Genus hocce ad Elæagnoides sit referendum respectu ovarii adhærentis et perispermii carnosi embryonem cingentis."









*D. octandra* Burm. Fl. Ind. t. 33. f. 2:  
Linn. Mant. pr. p. 69. Syst. Nat. ed. XII.  
T. II. p. 322. Willd. Sp. Pl. II. p. 580.

Hab. in India: Burman. — b.

Differt a præcedente: *foliis* longioribus, oblongis, magis coriaceis; *petiolis* brevioribus; *floribus* paucioribus, glabris: *laciniis* extus apice tantum pubescentibus.

† 3. *D. disperma* Forst. floribus octandris decandrisque, foliis ovato-lanceolatis enerviis Forst.  
Prodr. p. 33. Willd. Sp. Pl. II. p. 580.

Hab. in Insula Tongatabu: Forster. — b.

Obs. *D. linifolia* Lamarck Enc. 2. p. 255 et Illustr. t. 368. f. 3. est *Gnidia capitata* L. sec. Pers.  
Syn. I. p. 471. — *D. madagascariensis* Lam. l. c. t. 268. f. 2. est *Gnidia daphnaefolia* α *glabra* Linn. Suppl. et *D. pubescens* Lam. l. c. est *Gnidia daphnaefolia* β *hirsuta* Linn. Suppl.

## BESKRIFNING

*Af ett nytt Slägte ibland Växterne,  
kalladt Lonchostoma;*

af

JOH. EM. WIKSTRÖM,

Med. Doct.

Vid granskningen af *Passerinae*-släktets arter fann jag, att *P. pentandra* Thunb. utgör ett eget slägte, hvars kännetecken utvisa, att det ej hörer till *Thymelæarum* växtordning.

*Lonchostoma* är ett ifrån sina grannar väl utmärkt slägte, och då jag framställde dess kännetecken för den oförgätlige Prof. och Ridd. Swartz, sade han mig, att detta örtslägte var ett af de utmärktase, som i sednare tider blifvit uppträckta. Denne från sin Vetenskap alltför tidigt bortgångne Naturforskare hade och den godheten att genomse min beskrifning, hvilken han fullkomligt gillade.

Uti det Linnæiska Systemet intager *Lonchostoma* sin plats efter *Linconia*, hvilket Växtslägte blifvit förträffligt utredt och beskrifvet af Profess. Swartz (se Magazin der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin IV:ter Jahrgang 2:tes quart. p. 85—88. tab. IV. f. 1—14. och V:ter Jahrgang 3:tes quart. p. 283—285. tab. VII. f. 1) \*).

\*) Vid *Linconia* slägt-characterere torde följande kunna tilläggas: bractæ calycis quatuor, decussate — oppositæ. — Capsula bilocularis; loculis mono — s. dispermis.

Men då man skall bestämma *Lonchostomatis* plats uti ett så kalladt naturligt systeme, möra flera svårigheter. Det tyckes dock, att släktet hör uppställas efter *Brunia*; men som Prof. Jussieu, då han utgaf sina *Genera Plantarum*, icke kunde med säkerhet bestämma *Brunia* plats uti sitt systeme, fastän han upptog släktet ibland *Genera Rhamnaceis* affinia, och jag icke eller vet, att någon sednare författare förmått göra det, så följer afven, att *Lonchostomatis* plats i detta systeme ännu icke är bestämd.

*Lonchostoma* härleder sig från λέγχη, lancea, och στόμα, os, emedan laciniæ corollæ hafva en lancettlik form med utmärkt hopdragen basis.

*Character naturalis Lonchostomatis:*

*Calyx* quinquephyllus, bibracteatus: bracteis oppositis, concavis, calyci adpressis, s. quoad partem amplexentibus, squamæformibus; foliolis calycinis tubo corollæ adpressis, basi rarius adnatis, squamæformibus, marginibus imbricatis.

*Corolla* monopetala, tubulosa, quinquefida: laciniis corollæ unguiculatis.

*Stamina* quinque, faucibus inserta.

*Pistillum*: Germen superum; styli duo; stigma obtusum.

*Fructus*: capsula bilocularis: dissepimento membranaceo in medio receptaculum gerente seminum longitudinale columnare, in utroque loculamento parum prominens; seminibus in utraque receptaculi parte pluribus (8—10 circiter), pendulis \*).

*Character essentialis Lonchostomatis:*

*Calyx* quinquephyllus, bibracteatus. *Corolla* monopetala, tubulosa, quinquefida: laciniis corollæ unguiculatis. *Capsula* bilocularis, polysperma.

\*) Dum semina matura haud vidi, ea anatomicè describere non potui.

Locus in systemate Linnæano: Pentandria digynia post *Linconiam*, in systemate naturali forsan post *Bruniam*.

1. *Lonchostoma obtusiflorum*: foliis ellipticis, extus hirsutis, bracteis calycis oblongis, foliolis calycinis ovatis obtusis, laciniis corollæ ovatis obtusis, stylis subclavatis inclusis.

*Passerina pentandra*: foliis ovatis hirsutis, spicis ovatis terminalibus. Thunb. prodr. Fl. Cap. l. p. 76.

*Gnidia pentandra* Thunb. Dissert. fructificationis partium varietat. p. post sect. pr. p. 19.

Hab. "in Koude-Bockveld ad promontorium bonæ spei": Prof. et Commend. Thunberg. — D. (Herb. Thunb. et Bergian.).

*Frutex* ramis teretibus, sparsis, inferne sæpe trichotomis, adultis glabris, junioribus hirsutis, fusciscentibus. *Folia* sparsa, sessilia, elliptica, integerima, obtusa cum apiculo nigro curvato, utrinque imbricata, coriacea, extus hirsuta, adulta sæpe glabriuscula l. pilis paucis brevissimis obsita, atroviridia, intus glabra et dilutiora, ciliata, tres lineas sæpe cum dimidia longa unamque cum dimidia lata. *Flores* versus apices ramulorum axillares, spicam foliaceam formantes, solitarii, sessiles, calyculati, foliis longiores, rosei. *Bractea* binæ, oblongæ, obtusæ, nigro-apiculatæ, concavæ (lateribus compressis s. calycem amplexantibus), squamæformes, margine membranaceæ s. hyalinæ, ciliatæ, fuscatae, lineam fere longæ, dimidiamque latæ, carina obtusa, pubescente. *Calyx* quinquephyllus; *foliolis* ovatis, obtusis, integerrimis, interdum nigro-apiculatis, squamæformibus, tubo corollæ adpressis, imbr-



catis, ciliatis, margine membranaceis s. hyalinis; dimidiam lineam paullo superantibus, dimidiamque vix latis. *Corolla* monopetala, tubulosa, quinquefida, glabra, tres l. quatuor lineas longa: *tubus* basi et versus faucem ampliatus, medio angustatus, nervosus, duas circiter lineas sæpe cum dimidia longus; *laciniæ corollæ* ovatæ, unguiculatæ, obtusæ, integerrimæ, lineam paullo longiores. *Stamina* quinque, fauci tubi inserta, tubum haud superantia. *Antheræ* faucem tubi coronantes, sessiles, oblongæ, biloculares, luteæ. *Germen* ovatum, villosum, dimidiam lineam paullo superans. *Styli* duo, subclavati, inclusi, atro-purpurei, lineam circiter longi. *Stigma* obtusum. *Capsulæ* bilocularis dissepimentum membranaceum in medio gerens receptaculum seminum longitudinale columnare, in utroque loculamento parum prominens; seminibus in utraque receptaculi parte pluribus (8 - 10 circiter), pendulis, oblongis, glabris.

2. *Lonchostoma acutiflorum*: foliis ovatis extus pilosiusculis, bracteis calycis cuneiformibus, foliolis calycinis lanceolatis acutis, laciniis corollæ lanceolatis acuminatis, stylis filiformibus exsertis.

Hab. ad Promontorium bonæ spei: Dr Hornstedt. — B. (Herb. Bergian. et Swartz.).

*Frutex* ramis inferne subglabris, sursum hirsutis. *Folia* sparsa, sessilia, ovata, suprema lanceolata, obtusiuscula, nigro-apiculata, integerrima, adulta sæpe glabrata, l. pilosiuscula, juniora pilosa, ciliata, punctata ex insertione pilorum, intus glabra, 5-lineas circiter longa, medio duas l. tres lineas lata, viridia. *Flores* versus apices ramulorum capitulum foliaceum quasi formantes, axilla-

res, solitarii, sessiles, foliis longiores, rosei. *Bractea* binæ, oppositæ, cuneiformes, apiculatæ, integerrimæ, concavæ, calyci adpressæ et quoad partem amplectentes, squamæformes, margine ciliatæ, fuscatae, lineam longæ, dimidiamque latæ, carina obtusa, pubescente. *Calyx* quinquephyllus: *foliolis* lanceolatis, acutis, integerrimis, imbricatis, tubum amplectentibus, squamæformibus, basi interdum adnatis, margine membranaceis, ciliatis, fuscatis, extus pubescentibus, intus glabris, duas lineas longis s. tubo dimidio-brevioribus. *Corolla* monopetala, tubulosa, quinquefida, glabra, 6 l. 7 lineas longa: *tubus* cylindricus, 4 l. 5 lineas longus; *Lacinia* corollæ lanceolata, unguiculatæ, acuminatæ, integerrimæ, duas fere lineas longæ. *Stamina* quinque, faucem paullo superantia; *filamenta* versus faucem tubi inserta, dimidiam lineam longa, rubra; *Anthera* lineares, biloculares, lineam fere longæ. *Germen* superum, oblongum, pubescens. *Styli* duo, filiformes, longe exserti, flexuosi, basi pubescentes, longitudine fere corollæ, atropurpurei. *Stigma* obtusum. *Capsula* ut in præcedente.

Tab. X. f. 1. *Lonchostoma acutiflorum*:

- |                                                                                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a. flos cum bracteis, calycem exteriorem diphyllum<br>mentientibus; paullo ( $\frac{1}{4}$ ) auctus. | } plus minus<br>aucta. |
| b. alter bractearum,                                                                                 |                        |
| c. foliolum calycis.                                                                                 |                        |
| d. corolla aperta.                                                                                   |                        |
| e. lacinia limbi cum anthera.                                                                        |                        |
| f. stamen.                                                                                           |                        |
| g. pistillum.                                                                                        |                        |
| h. sectio transv. capsulæ junioris.                                                                  |                        |
| i. apex folii.                                                                                       |                        |

Tab. X. f. 2. *Lonchostoma obtusiflorum*:

- a. flos cum bracteis.
  - b. bracteæ.
  - c. foliolum calycis.
  - d. corolla aperta cum genitalibus.
  - e. lacinia limbi cum anthera.
  - f. stamen.
  - g. pistillum.
  - h. folium naturali magnitudine.
  - i. apex folii acutus.
- } plus minus  
aucta.
-

# UPPSTÄLLNING

## Af de i Sverige funne Vårtsvampar (Scleromyci);

af

E. FRIES.

Fortsättning \*).

### IV. SPHÆRONÆMA. *Fries Obs. Myc. I. p.* *187 et sq.*

*Receptaculum* nullum. *Perithecium* elongatum subcylindricum, collo nullo. *Gelatina* soluta, in globulos demum fatiscentes erumpens.

Är ganska säkert ett från *Sphæria* skildt släkte, hvarmed det af *PERSOON* efter *TODE* förenas. Hylshusen sakna allt fäste, äro alltid utdragne, oftast syllike eller cylindriska. Den inre jämbreda caviteten är på ett olika sätt danad och slutas i en bar öppning, som betäckes af fröslemmet i form af ett klot.

- I. *SPHÆRONÆMA subulatum*, peritheciis subulatis lutescentibus, globulo ovali pallidiori. *Fries l. c.*  
*Sphæria subulata. Pers. syn. p. 94. Albert. et Schwein. p. 52. Ic. Tode Meckl. t. 15. f. 117.*  
Vexer allmänt i skogsmark på nedfallne agarici, från hvars skifvor den utsticker i form af tag-

---

\*) Se näst föregående Stycke, s. 100—120.



gar. Formen syllik, något conisk; ytan slät, glatt, mer eller mindre mörkt färgad. Slemklotet affaller lätt.

2. *SPHÆRONÆMA rufum*, peritheciis subulatis rufis, globulo minuto pallidiori.

På barklöse ruttnade Tallstockar. Tråffas hålst under blid våderlek om vintren.

Är i början röd, af ganska mjuk substans, blir sedan svartbrun. Den är i alla åldrar slät, glatt; oftast större än föregående.

3. *SPHÆRONÆMA aciculare*, peritheciis cylindrico-attenuatis griseo-nigricantibus, globulo albo-lutescenti.

Sph. dubia. *Tode Alb. et Schwein. p. 50.*

Ic. *Tod. Meckl. t. 15. f. 118.*

Är i början af våren funnen på Tallved. Från den gråaktiga färgen öfvergår den snart till svart. Ytan glatt. Klotet tämmeligen stort, af fallande.

4. *SPHÆRONÆMA cladoniscum*, peritheciis cylindricis subramosis nigris, globulo minimo incluso albo. *Fr. l. c. t. 2. f. 7. e. t.*

Calicium cladoniscum. *Ach. Lich. univ. p. 61.*

Vexer på rutten ved, icke allmänt. Kommer följande nära; men egenskapen att grenas sig tillkommer ingen annan art af detta slägte. Slemklotet ganska fint, liknande en hvit punkt i centren.

5. *SPHÆRONÆMA cylindricum*, peritheciis cylindricis gracilibus, longitudine diametrum duplo superante, nigris, globulo prominulo albo.

Sph. cylindrica. *Tode ut videtur.*

Ic. *Tod. Meckl. t. 15. f. 114.*

Vexer på rutten ved af Ek, Pihl o. s. v.

Denna art förblandas vanligen med följande. Till denna för jag Todes synonym, emedan den beskrifves mycket fin och vexestället öfverensstämmar. Hylshuset är icke insänkt i veden och spetsen, ehuru trubbig, icke tvårstympad.

6. *SPHÆRONÆMA truncatum*, peritheciis cylindricis truncatis, longitudine diametrum paulo superante, nigris, globulo prominente candido.

*Sph. cylindrica. Albert. et Schwein. p. 50.*

Mycket allmän på ruttnande ved af Gran, Tall o. s. v.

Är i början insänkt i veden, hvilken den sedan upphöjer och utbryter igenom. Diametren är i början lika med längden, sedan något mindre, dubbelt större än föregående arts. Klotet dubbelt större och fullkomligen utstående.

7. *SPHÆRONÆMA conicum*, peritheciis conicis acutis atris, globulo prominente livido atrescente.

*Sph. conica. Pers. syn. p. 94. Albert. et Schwein. p. 51.*

*Id. Tod. t. 15. f. 116.*

Jag har funnit den på rutten granved. Yngre är den beklädd af ett fint snart försvinnande ludd, som jag ock anmärkt på mine specimina, ehuru de med en något syllik form afvika från Todes figur. Ytan ojämn.

På bokved har jag sett *Sphæronæma hemisphaericum* (*Sphæria Albert. et Schwein.*), men åger för det närvarande intet exemplar deraf.

8. *SPHÆRONÆMA hydnoideum*, peritheciis confertis elongatis subcompressis rugosis nigris acutis, dein obtusis, hypothallo crustaceo spinuloso nigro.

Vexer på nedfallne Björkgrenar.

En besynnerlig vextform, som svårigen kan föras till något annat släkte. Beklädd till flera

fots längd den inre barken af Björk och aftränger den yttre, liksom *Sph. stigma* och *decorticans*. Skorpan vida utbredd, invext uti barken, sammanhängande, hår och der fintaggig; männe början till hylshus. — Hylshusen utdragne. olikformige, plattade, skrynkliga, svarta, i början spetsige, sedan trubbiga. Slemknapp har jag ännu icke funnit.

9. *SPHÆRONÆMA bullorum*, peritheciis sparsis ventricosus diformibus stipitatis sessilibusve, disco dein collapsio pezizoideo, globulo albo-lutescenti.

Funnen i mängd på inre sidan af nedfallen Granbark. *April, September.*

Åfvenledes mycket utmärkt, men tydligen hörande till släktet. Hylshusen äro egenteligen spridda, men sitta ofta kretsvis tillsammans och på en svart, utbredd fläck, som likväl är tillfällig. Hylshusen äro ägglike, finskrynkliga, svarta, med eller utan fot; äldre hopfalla de och erhålla platt disk, då den får utseende af en *Peziza*. Knappen olikformig, gulaktig, till färgen mer eller mindre mörk.

Med detta släktes arter har åfven en på Hasselqvistar i Skåne funnen Svamp någon frändskap, men för perithecium dimidiatum bör den utgöra ett eget släkte, *Excipula turgida*.

10. *SPHÆRONÆMA versiforme*, peritheciis subcæspitosis turbinato-cylindricis nigricantibus, primo clausis sphæroideis, dein collapsis pezizoideis, globulo albo.

*Sphæria versiformis. Albert. et Schwein. p. 52. lc. l. c. t. 9. f. 3.*

Vexer om våren på vissnade qvistar af *Al* och *Rhamnus frangula*.

En märkvärdig art, som står på gränsen till följande släkte. Formen mycket föränderlig, i början mest rund, sedan förlängd, i spetsen utvidgad hylshus-bårande; nedtill är den tät och innuti likformig. Knappen liten, hvit och saknas ofta. Då hylshusen sammanfalla liknar den en *Peziza cæspitosa*. Måne *Peziza alnea* Pers.?

## V. CENANGIUM. Fries.

*Perithecium compositum*, basi carnosum farctum intus simile, apice inane; cavo circumcirca hymenio vestito. *Theca* adnatæ.

Ett utmärkt väl skildt släkte, som tyckes likasom förena *Pezizæ cæspitosæ* och *Sphæriæ*. Ty, ehuru väl dess hylshus äro ihålige, som *Sphæriæ*, äro de alldeles tomma utan gelatina, och sidorne äro beklådde med ett fröfäste. Hylsorne äro vidhåftade, som hos *Hysteria* och *Phacidia*. — Alla dess arter utbryta genom barken, äro köttige och öppna sig ojämt i spetsen, då de ännu mera närma sig till *Pezizæ*.

1. *CENANGIUM laminare*, cæspitosum, plicato-lobatum, planiusculum nigrum albo-pruinatum.

*Dothidea cæspitosa*. Fries Obs. Myc. 2. p. 348.

*Sphæria cæspitosa*. Tod. Fung. Meckl. 2. p. 41.

Ic. Tod. l. c. t. 14. f. 113.

Vexer på vissnade qvistar af Rönn o. fl. träd, sent på hösten.

Dess daning är egen och besynnerlig, öfverensstämmande i det närmaste med Todes beskrifning; deremot vågar jag ej citera Persoons *Sph. aucupariæ*, som beskrifves cylindrisk o. s. v. Kanhända en ny art af detta märkvärdiga släkte. Få-



ste finnes knapt. De plattade hylshusen grenas liksom i fällor vid basen, der de äro förenade.

2. *CENANGIUM ferruginosum*, *cæspitosum*, *peritheciis subrotundis reniformibusque ferruginosis pruinosis*.

*Sphæria axillaris*. *Fries in litt. ad amic.*

Utbryter i stor mängd ur bladfästen på vissnade qvistar af Tall, vårtiden.

Bildar runda, något olikformige tufvor. Åger ett blekt, af barken bildat fäste. Hylshusen runda eller njurlike, slåta, beklädda af ett brunaktigt pulver; i början fylde, sen tomma utan öppning; slutligen öppna som en *Peziza* eller *Hyt. quercinum*.

3. *CENANGIUM fallax*, *simplex*, *sparsum*, *peritheciis basi semiglobosis, sursum cylindricis ore lato apertis*.

*Lophium fallax*. *Fr. Obs. Myc. I. p. 191. Eq*

*Sphæria fallax*. *Pers. syn. p. 92. Wahl. Fl. Lapp. p. 522.*

*lc. l. c. et descr. 2. t. 10. f. 11, 12.*

Vexer på vissnade grenar.

Ehuru till utseende olik föregående, hör det till detta släktet. Det närmar sig ganska mycket till *Pezizæ*. Färgen svart eller brunaktig.

Fortsättning nästa år.

Kongl. Förste Lif-Medicus m. m.,

Herr PEHR AF BJERKENS

## Biographie.

**H**an föddes i Stockholm den 2 Jan. 1765. Fadren var Assessoren uti Kgl. Collegium Medicum PEHR AF BJERKEN och Modren JOHANNA MARGARETHA CHRISTJERNIN. Efter erhållen undervisning af enskild Lärare, inskrefs han 1781 till Student vid Kgl. Universitetet i Upsala, då han på egen hand började att sysselsätta sig med de till Läkare vetenskapen förberedande kunskapsdelar. 1785 afgjordes Medico-filosofiska examen och 1787 disputationen pro exercitio, *Museum naturalium Academiæ Upsaliensis P. IV.* med theser, under Professoren och Commendeuren THUNBERGS præsidium. Ifrån den 19 Sept. 1788 till årets slut, gjorde han tjenst som Sjukhus-Läkare vid Arméens Sjukhus i Götheborg och följande året i Finland, till 1790, då han blef Fält-Medicus vid ett af Sjukhusen i Lovisa. Sedan han afgjort de till medicinska graden hörande examina, disputerat pro gradu medico: *de Indole et curatione Febris puerperalis*; under Professoren och Riddaren ACRELS præsidium, samt öfvat sig uti det praktiska vid Kongl. Seraphimer-Ordens Lazarettet i Stockholm, reste han i Maj 1793 till London, och vistades der till October 1796, under hvilken tid han gjorde tjenst på *S:t Thomas'* och *Guy's* Hospitaler under den skicklige M:r H. CLINE, som med syn-

nerlig vänskap och förtroende bemötte BJERKENS flit och uppmärksamhet samt bidrog att hos honom utveckla den talang, hvarmed han sedermera så utmärkte sig. Vid Promotionen i Upsala 1793, nämndes han, frånvarande, till Medicinæ Doctor. Återkommen till Fäderneslandet, erhöll han 1797, efter främl. Lif-Medicus HALLMAN, Läkarebeställningen vid den veneriska kur-inrättningen i Stockholm, som står under Kongl. Öfver-Sått-hållare-Embetets inseende. 1798 legitimerade han sig som Chirurgiæ Magister. 1802 erhöll han Kgl. Förste Lif-Medici-Fullmakt. 1803 kallades han till Ledamot af Medicinska Societeten i Montpellier, likasom han förut var Ledamot af the medical Society of London. 1808 förordnades han till Förste Fält-Läkare vid Finska Arméen i Österbotten, der han under de betydligaste affäirerne öförtrotet på slagfältet vårdade de sårade; och till vedermåle af Konungens nådiga välbehag utnämndes den 15 Sept. till Riddare af Wasa-Orden och erhöll d. 24 Dec. den större Guldmedaillen, med omskrift: *illis quorum meruere labores*, att bäras på bröstet. Den 28 Febr. s. å. blef han Regements-Läkare vid Svea Lif-Gardet. Vid början af 1809 lemnade han Arméen; blef d. 1 Junii s. å. Öfver-Fältskår vid Kgl. Serafimer-Ordens Lazarettet; d. 23 April transporterad till Regements-Läkare vid Uplands Kongl. Regemente; Ledamot uti Directionen för allmänna Fattigvården samt uti Committén till öfverseende och förbättring af Arméens Medicinalverk. S. å. valdes han till Ledamot af Kongl. Vetenskaps-Academien. 1810 blef han Assessor, med säte och stämman, uti Kongl. Collegium Medicum och var följande året en bland de af Collegii Ledamöter, som ägde att granska Chir. Magister OSBECKS kurmetod. 1812 erhöll han Öfver-Fält-Läkare-Fullmakt.

1814 Riddare af Kgl. Nordstjerne Orden. 1815 valdes han till Ledamot af Sällskapet Pro Patria och 1817 till Ledamot af Committéen för undersökningen af animala Magnetismen och dess verkningar, samt Brigad-Läkare vid 2:dra Infanteri-Inspektionens 3:dje Brigad. Stadd på en resa för att förrätta en kirurgisk operation insjuknade han i Jönköping d. 2 Febr. 1818 och dog der d. 24 s. m., 53 år gammal, allt för tidigt för den lidande menskligheten, för Fäderneslandet, för kirurgiska vetenskapen, hvilka uti honom länge torde få sakna den skarpa blicken att utröna, det lugna sinnet att bedömma och den säkra handen att verkställa.

Förste Lif-Medicus AF BJERKÉN var 1798 1:sta gången gift med BRITA KATRINA LINDH, Dotter af Cornetten G. LINDH. Hon dog 1811 d. 20 Mars. S. å. d. 23 Sept. ingeck han nytt gifte med SOPHIA CHRISTINA WETTERQVIST, Dotter af Majoren S. WETTERQVIST och Enka efter förra Fruns Bror, Kaptenen C. M. LINDH. Hon dog 1816. Tvenne Söner och en Dotter, med första giftet, efterlefva Fadren.

F. Lif-Medici AF BJERKÉNS Portrait utkom 1811 graveradt, och 1818 låt Kgl. Seraf. Lazar. Direktion i Stockholm öfver honom forma och gjuta en medaljon i jern, för att uppsättas uti Lazarettet.

Uti Svenska Läkare-Sällskapets Handlingar har K. F. Lif-Med. AF BJERKÉN lemnat följande Afhandlingar:

Uti 1. B. 1. H. en opererad Prolapsus lingvæ, meddelad af E. EDHOLM.

Uti 1. B. 2. H. 2:ne händelser på K. Seraf. O. Lazarettet.

Uti 2. B. 2. 3. H. Om arsenikens specifica verkan på kräftskador.



*Hans Excellence's m. m.*  
**Grefve J. G. OXENSTJERNAS**  
**Biographie.**

**H**an var Son af General-Majoren Grefve GEORG OXENSTJERNA och dess Hustru Grefvinnan SARA GYLLENBORG samt född d. 4 Julii 1750, g. st., på Skenås i Vingåkers Socken. — Under sitt vistande vid Upsala Universitet, dit han vid 12 års ålder afsändes, egde han redan den nåden att, till ådagaläggande af sina lyckliga snillegåfvor, med biträde af Canzli-Rådet IHRÉ såsom Präses, få, i närvaro af Drottningen samt Universitetets då varande Canzler, Kron-Prinsen GUSTAF, försvara Theser, författade i anledning af Drottningens egen uppgifna fråga: Hvarföre store Mån i Krigskunskap, Statsklokhed och Vetenskaper uppkomma mer i det ena än det andra tidehvarfvet. — Samma år (1767) undergick han Canzli-examen, hvarefter hans Embetsmanna bana börjades, då han

1768 blef Canzlist i Kongl. Canzliet och

1769 antagen till Canzlist och Protocollsförande i mindre Secreta Deputationen vid detta årets Riksdag.

1770 anbefalld, att i Wien förestå Commissions-Secreterare-sysslan, till hvilken han, efter Regerings-Rådet v. RÖÖKS död (1772) befordrades.

*K. V. A. Handl. 1818. St. II.*

- 1773 förordnad, att, jemte Ministern Grefve BARR, på Konungens vågnar af Kejsaren emottaga investitiuren af Pomern, hvarefter han
- 1774 hemkallades och utnåmdes till Kammarherre.
- 1778 blef han Riddare af K. N. O. samt företog på nådig befallning, en resa till Berlin, Leipzig, Dresden, Basel, Braunshweig, Hannover och Hamburg, i hemliga och för Konungen enskilda underhandlingar, hvilka efter åstundan utfördes.
- 1782 Commendeur af K. N. O. och samma gång utnåmd till en af Rikets Herrar; men Kallelsebrevet till denna höga värdighet blef likväl, på hans egen underdåniga anhållan, tills vidare öfverlåtnadt. Honom uppdrogs derefter att, jemte Baron SPRENGPORTEN, afgå till Köpenhamn, att notificera Hertigens af Småland CARL GUSTAFS födelse och att låta honom, såsom arfsrättägande Prins, inskrifvas i den Kongl. Danske Genealogien.
- 1783 Öfverste Kammarjunkare.
- 1785 Extraord. Ledamot i Canzli-Collegium med befallning, att bivista alla Konungens Conseiller samt att, såsom Ledamot, deltaga i Pomerska och Wismarska Beredningen.
- 1786 kallad till Svea Rikes Råd, hvarvid han i Rådkammaren då intog sitt rum efter det ofvannåmda Kallelsebrevets datum den 1 Sept. 1782. — Åfven förordnad, att, tillika med Riksrådet Baron DE GEER, förestå Canzli-Presidents Embetet, hvilket han, efter dennes erhållna afsked, snart fick ensam förvalta. Vid början af den inträffande Riksdagen emottog han, i egenskap af Riks-Canzler, de trenne ofrälse Stånden vid deras fullmagters pröfvande och introducerade samma år, på Konungens vågnar,

**Grefve C. A. WACHTMEISTER**, såsom Riks-Drotts, i Hof Rätten.

1788 åtföljde Konungen i fälttåget till Finland, såsom Chef för Utrikes Årenderna och

1789, vid Rådets upplösning, utnåmdes till Öfverste Marskalk hos Drottningen samt nedlade sin befattning med de Ministeriella göromålen och Præsidium i Canzliet.

1790 Riddare af K. Seraphimer-Orden och förordnad till Ledamot i Regeringen under Konungens frånvaro i kriget mot Ryssland, hviiker ansvarsfulla förtroende honom ytterligare uppdrogs åren 1791, 1792, 1798 och 1799.

1792 utnåmdes till Riks-Marskalk, sedan han vid Riksdagen i Gefle förestätt det lediga Embetet och blef samma år Ledamot i Allmänna Stats-Beredningen.

1801 fick, på begäran, nådigt afsked från Riks-Marskalks-Embetet, som han nu i 9 år innehaft, under en tid så utmärkt genom mängden af både sorgliga och glada högtidligheter. — Han hade mottagit detta första rum bland Hofvets Embetsmän af en Konung, med hvilken man kan säga att han egde den sållsynta nåden, att redan en längre tid hafva lefvat i en verklig vänskap och af hvars stora egenskaper och snille må hända hans eget erhöill sin första egentliga utveckling och bestämme. — Men ett rysligt öde upplöste snart för evigt de band af ett förtroligare umgänge, som så nära fästet Fäderneslandets förste Snillen vid deras Konung och GUSTAF III tycktes anande hafva påskyndat Riks-Rådet Grefve OXENSTJERNAS utnåmnande till Riks-Marskalk, för att vid sin död, en månad derefter, i anföraren af begrafningens sorgliga högtid ega den af hans nåd mest förtjente, af hans

bortgång lifligast träffade och som ändteligen, i den Academie han Sjelf stiftat och i hvars arbeten han Sjelf deltagit, kunde uppträda en värdig tolk af hans minne.

1802 blef Riks-Rådet Grefve OXENSTJERNA Ordens-Canzler och Ledamot af Canzlers-Gillet samt

1811 Riddare af Kon. CARL XIII:s Orden.

Såsom sin Ätts hufvudman bivistade han Riksdagarne 1778, 1809, 1810 och 1815, vid hvilka båda sistnämde han var den ena gången Ordförande i Oeconomie- och Besvärs-Utskottet och den andra i Riddarhus-Utskottet.

Af denna endast chronologiska uppsats kan inhemtas, huru hans verksamhet blifvit till det allmännas bättnad använd. — Han uppfyllde sina pligter efter föreskriften af sitt antagna Riddarevalspråk: *Avito in Patriam Amore*, och med denna borgen för hans handlingar blefvo de ock aldrig misskände. Men med den urgamlä glansen af sitt ärfda namn förenade han äfven den kärlek för vetenskaper, som utmärkte det tidehvarf, då en AXEL och BENGT OXENSTJERNA kunna anföras bland Sveriges lärde och vittre Män. — Sjelf intog han derföre ett rum bland sin samtids odödliga Skalder och ypperste Författare, besjöng med lika behag den Store GUSTAF ADOLPHS krigsbragder och *Skördemännens* fredliga yrken. Utom hans samlade Arbeten, utgörande 4 volumer, äro flere Tal och Skaldestycken serskildt utgifne \*), hvilka alla röja en författare, som med ett känslofullt hjertas godhet förenade snillets och smakens alltid igenkänliga fördelar. Med ett mildt och intagande väsende tilldrog han sig äfven allas vördnad; egde ingen

---

\*) Se Anteckningar till K. Vet. Acad. Hist. af Frñh. ROSENHANT.



afundsjuk tadtare af sina litterära förtjenster, ty han yttrade sjelf aldrig något anspråk att ega dem.

En långvarig sjukdom förebådade hans död, som inträffade i Stockholm den 29 Julii 1818. Enkling sedan 1809, efter ett nittonårigt ägtenskap med LOVISA CHRISTINA WACHSCHLAGER, dotter af Hof-Marskalken G. WACHSCHLAGER till Lenartsnås och dess Husfru CHRISTINA HOLMCREUTZ, egde han en efterlevande Son, Grefve G. G. OXENSTJERNA, Cavalier hos H. K. H. Kron-Prinsen och Fendrick vid Kongl. Svea Lif-Gardet.

Utom af Svenska Academien, var Hans Excell. Grefve OXENSTJERNA tillika Ledamot af alla öfriga inländska lärda, vittra och patriotiska Samfund. I Vet. Academien, som tillegnade sig honom 1804, förde han ordet under första hälften af 1816, hvilket år han äfven kallades till utländsk Medlem af Academien i Marseille.

*K. Vetenskaps-Academiens Secreterares,  
Professoren m. m.*

## OLOF SWARTZ'S Biographie.

**H**an föddes i Norrköping den 21 September 1760. Fadren var Fabrikören OLOF SWARTZ och Modren MARIA ELISABETH VON BROBERGEN. Efter förberedande studier började han vid 18 års ålder att i Upsala begagna den Academiska undervisningen. Från yngre åren lifvad af en uteslutande bøjelse för Naturens kannedom, företog han, för att inhemta kunskap uti Fäderneslandets Naturalhistoria, sommarmånaderna åren 1779, 1780, 1781 och 1782, resor i Rikets Provinser sårdeles trakterna omkring Mälaren, Luleå Lappmark, Jemtland, Österbotten, Åland, Finska Skärgården, Finland och Gotland.

Den kannedom SWARTZ förvärfvat sig af sitt eget Fädernesland, hade gjort honom skicklig att åfven inhämta andra Länders, då han, efter afslagda specimina till medicinska Doctorsgraden, mot hösten 1783 företog, på egen bekostnad, en resa till Norra America, och derifrån till Jamaica, der han under ett års vistande gjorde rika samlingar i sin vetenskap. 1785 promoverades han, frånvarande, i Upsala, till Medicinæ Doctor. S. å. företog han en resa till södra America och till åt-

skilliga Vest-Indiska öar, återvände efter 8 månader till Jamaica, der han uppehöll sig till hösten 1786, då han reste till England.

Sedan han under ett års vistande der begagnat Banks's och British Museum, hade Fäderneslandets Flora den glädjen att åter få emottaga sin älskling och att vinna allt mera tillväxt och förkofran genom hans fortsatta resor och forskningar: åren 1789 och 1790 uti Jemland, Fjällarne, och flera delar af Norrland, Vermland, Dalarne och någon del af Norrige; år 1802, på Öland och uti de södra Provincierna, samt 1807, i Vester-Dalarna och Norrska Fjällen.

Kongl. Vetenskaps-Academien kallade Doctor SWARTZ 1789 till dess Ledamot; utnämde honom 1791 till Professor vid Bergianska Trädgårds-Skolan; valde honom 1790 första gången och 1797 andra gången, till dess Præses; uppdrog honom 1807 att vara Intendent vid dess Museum samt valde honom 1811 till Secreterare. Och ingen har mera än han kunnat rättvisa K. Academiens afseende på förtjenster och hennes förtroende till skicklighet och redlighet.

År 1808 utnämndes Professor SWARTZ till Riddare af K. Wasa-Orden; 1813 till Historiæ Naturalis Professor vid Carolinska Institutet i Stockholm, och 1814 till Riddare af K. Nordstjerne-Orden.

Han var Heders-Ledamot af K. Sundhets-Collegium, och Föredragande uti K. Landtbruks-Academiens Class för Trädplantering och Trädgårdsskötsel, samt Ledamot af tillsammans 20 in- och utländska lärda Samfund.

Professor SWARTZ afled den 19 sistl. Sept. på Bergielund, efter en 12 dagars feber-sjukdom, hvars tidigt inträffade svåra nerv-symtomer snart

gåfvo anledning att befara den bedröfveliga utgången. Hans hälsa var ömtålig och hans constitution svag, sårdeles nerv-systemet, som, i hög grad retligt för inre och ytre inflytelser, af en tillfällig orsak, den man förmodar varit förkylning, lätt och ohjelpeligt rubbades uti dess för organismens bibehållande så nödiga förrättning.

Hjertats godhet, mildhet och ädelhet, utgjorde hufvuddragen i hans character, som också var lika troget afmålad i hans lena och behagliga anletsdrag, som den alltid yttrades i hans ålskvårda sätt att vara.

Hans många och viktiga upptäckter i Natural-historien och hans rikhaltiga skrifter, beredde honom talrika litteraire relationer öfver hela den civiliserade världen; hans liberala sätt, att utan förbehåll upplysa och gagna med sina insigter, gjorde bekantakapen med honom lika behaglig som dyrbar. Hans flit var outtröttelig. Uti nit för sin vetenskap och dess grundeliga kännedom, sårdeles af dess botaniska del, öfvertråffades han af ingen och kunde med få jämföras.

Som en sann Patriot försakade han flera lysande anbud utomlands \*); och att han föredrog att hedra och gagna sitt ålskade Fädernesland, var så mycket mer berömligt, som han var ringa belönt för sina tjenester och för den kostnad han använt på sina resor.

Professor SWARTZ var gift med SARA ELISABETH BERGH, Dotter till Juris Doctor BERGH i Upsala. Hon dog 1800. En Son och en Dotter sakna den ömt ålskade Fadren.

\*) År 1786 tillböds honom att qvarstanna på Jamaica som the Kings botanist of the Island; 1787 af the East India Comp. charge of Travelling Physician of the East Indies. År 1802 tillböds honom att efterträda Prof. LEPECHIN vid K. Vet. Acad. i Petersburg.



Hans namn förvaras uti benämningen af Ört-Genus *Swartzia*, — af *Paspalus Swartzianus* — *Rosa Swartziana* — *Hypnum Swartzii* — *Lichen Swartzii* — *Fucus Swartzii* — *Diatoma Swartzii* — *Agaricus Swartzii* — *Clavaria Swartzii* samt Insectet *Cassida Swartzii*.

Följande Arbeten äro af Professor SWARTZ utgifne:

*Större Arbeten:*

- 1788. Nova genera et species Plantarum, seu Prodromus descriptionum Vegetabilium maximam partem incognitarum, quæ sub itinere in Indiam Occidentalem annis 1783—1787 digessit. Holmiæ.
- 1791. Observationes botanicæ. 8:o Erlangæ.
- 1792. Nya Svenska Ekonomiska Diktionären. 4:de Delen 8:o. Stockholm.
- 1794. Icones Plantarum incognitarum, quas in India Occidentali detexit atque delineavit. Fasc. I. fol. Erlangæ.
- 1797. Flora Indiæ Occidentalis. Vol. I, II & III. 8:o. Erlangæ 1797—1806.
- 1799. Dispositio systematica Muscorum frondosorum Sveciæ. 8:o. Erlangæ.
- 1806. Synopsis Filicum. 8:o. Kilia.
- Svensk Botanik, utgifv. af Palmstruch och Billberg; med text författad af O. Swartz; Tom. 5, 6, 7 och de 6 första Häftena af 8:de Tomen. 8:o Stockholm 1806—1817; — dessutom författat text till flera af de uti nämde Verks 1:sta och 2:dra Tomer afritade Växter.
- Svensk Zoologi, utgifven af Palmstruch och Billberg; med text författad af O. Swartz. 2—II Häft. 8:vo. Stockholm 1806—1818.

1806. Magazin för Blomster-älskare och Ickare af Trädgårdsskötseln, utgifvet af Pfeiffer, Venus och Ruckman; med text författad af O. Swartz. 12 Häftn. 4:o.
1811. Lichenes Americani. Fasc. I. 8:vo Norimb.

*Mindre Arbeten och Afhandlingar:*

1780. Methodus Muscorum illustrata. Dissert. Acad. Præsidi v. Linné fil. Upsaliæ.
1783. *Gentiana pulchella*, en ny Svensk Våxt, beskrifven i K. V. A. H. 1. Qv.
- Bref, i utdrag till Frih. Alströmer, Hr v. Linné d. y., Thunberg, Fagréus, Dahl, dat. Boston i Oct. 1783. inf. i Ups. Sällsk. Tidn. N:o 25, 26, 27.
1784. *Musci*, nunc primum in Svecia reperti et in Nov. Act. Reg. Soc. Ups. V. II. descripti.
- Fyra Bref till Hr A. Dahl, dat. from the Mountains of Jamaica. Uppfostr. Sällsk. Tidn. 1785. n. 15. 19. 26.
1785. 9 nya Species af *Urticæ* släktet, beskrefna i K. V. A. H. 1 Qv.
1787. 12 dito dito 1 Qv.
- *Cinchona angustifolia*, en okänd växt från Vestindien, dito 2 Qv.
- *Solandra*, ett nytt ört-släkte från Vestindien. dito 4 Qv.
- *Chloranthus*, a new genus of plants, described in Philos. Transact. V. LXXVII.
- Bref, dat. Kingston på Jamaica. d. 6 Aug. 1787. Uppfostr. Sällsk. Allm. Tidn. s. å. D. II. s. 275. N:o 34.
- Anmärkningar rörande den nu varande Fransyska sjö-resan till upptäckters görande både uti södra och norra Verldshafven. Allm Tidn. 1788. N:o 38, 39, 41. Del III. s. 309, 318, 325.

1788. *Pulex penetrans*, beskrifven uti K. V. A. H. 1 Qv.  
 — Heta källorna på Jamaica, beskrifvna dito 2 Qv.  
 — *Medusa unguiculata* och *Actinia pusilla*, upptäckte och beskrifne. n. st. 3. Qv.  
 — *Quassia excelsa*; nytt träd, beskrifvet. n. st. 4. Qv.  
 1789. Botaniska anmärkningar, samt beskrifning af *Spergula subulata*, n. st. 1. Qv.  
 — *Stellaria humifusa*, ny Svensk växt, beskrifven, n. st. 2. Qv.  
 — *Stylosanthes*, ett nytt örtslägte, bestämdt. n. st. 4. Qv.  
 — Anmärkningar om Vestindien. Inträdes-tal i K. V. A.  
 — The botanical history of *Canella alba*. Trans. Linn. Soc. V. I.  
 — Berättelse om eruptionen af Etna 1787, Allm. Tidn. 1789.  
 — Anmärkningar om Portugal; utdragne ur Sketches of Society and manners in Portugal, af Castogan. n. st.  
 — Om Engelske Sjökaptenen Jak. Cook. n. st. D. II. N:o 10, 14, 20, 27, s. 73, 105, 158, 214.  
 1790. Botaniska anmärkningar om Bomulls-slagen. K. V. A. H. 1 Qv.  
 — Tilläggning om slägtet *Myxine*. n. st. 2 Qv.  
 — Om Natural-historiens framsteg i Sverige. Præsidii-tal uti K. V. A.  
 1791. *Medusa pelagica*, beskrifven i K. V. A. H. 3 Qv.  
 — *Vittaria*, eine neue Farrenkraut-Gattung, beschrieben in Schrift. d. naturforsch. Freunde, in Berlin V. 2.

1792. *Ochroma*, ett nytt örtslägte, beskrifvet i K. V. A. H. 2 Qv.
- Anmärkningar vid hvita Myrans (*Termes L.*) historia. n. st. 3 Qv.
- Handledning vid planteringen af Rhabarber. Patr. Sällsk. Journ. Jul. Aug.
1794. Anmärkningar om Syriska Silkesplantan. n. st.
1795. Systematisk uppställning af Svenska Löf-Mossorna (*Musci*). K. V. A. H. 3 Qv.
1796. Vothmans Trågårds-Cateches. Första Del. Öfversatt och tillökt. 8:vo. Upsala.
1797. *Dianome generis Epidendri*. Act. R. Soc. Ups. V. VI.
- Om hushålls-nyttan af däggande Djuren. Præsidi-tal i K. V. A.
1798. *Chloris falcata*, } nya växter beskrifna i  
 — *Spergula Japonica*, }  
 Schrift. Naturforsch. Freunde. in Berlin. V. 5.
1799. Botaniska anmärkningar och beskrifning på *Spergula stricta*, en ny Svensk Växt. K. V. A. H. 3 Qv.
- Ueber die Gattung *Phyllachne* in Schraders Journal für die Botanik; für 1799. I. B. 2:tes Stück. Omtryckt uti Annals of Botany P. II.
- Ett Bref. n. st.
- Einige, Bemerkungen über die Willdenowische Ausgabe der Species Plantar. n. st. 2 B. 1:stes Stück.
- Bemerkungen über die *Forstera sedifolia*. n. st. Omtryckt uti Annals of Botany. P. II.
- *Dianome Epidendri Generis recusa*. n. st.
- Ett bref. n. st.
1800. The botanical History of Ehrharta. Transact. of the Linn. Soc. Vol. VI.



1800. Afhandling om Orchidernas sl  gter och deras systematiska indelning. K. V. A. H. 2 Qy.
- Orchidernas sl  gter och arter uppst  llde. n. st. 3 Qy.
- Ett bref. Schrad. Journ. f  r 1800. I. B. 2:tes St  ck.
1801. Genera et species Filicum ordine systematico redactarum. Schrad. Journ. f  r 1800. 2 B. 1 st  ck. Omtryckt uti Annals of Botany. P. III.
- Observationes species nonnullas Muscorum minus cognit  s illustrantes. n. st.
-   minnelse-Tal   fver Professor Bergius, h  llet i K. V. A.
1802. *Copicerus*, ett nytt sl  gte bland Insekterna. K. V. A. H. 3 Qy.
1803. *Cinclidium*, eine neue Moos-Gattung, entdeckt und beschrieb. Schrad. Journ. f  r 1801. I. B. 1 St  ck.
- Observationes botanic  e, genera et species Filicum illustrantes. n. st. I. B. 2 St  ck. Omtryckt uti Annals of Bot. P. V.
1804. Anm  rkningar och till  gg vid Ormbunke-sl  gret *Mertensia*. K. V. A. H. 3 Qy.
- *Pyrola media*, ny Svensk V  xt. n. st. 4 Qy.
- Botanische Beobachtungen   ber die *Arethusa biplumata* und die *Orchis Burmanniana*. Weber und Mohrs Archiv. I. P.
1805. Genera et species Orchidearum systematice redactarum. Schrad., neue Journ. I. B. 1 St  ck.
- *Epipactis Convallarioides*, beschrieben, Weber und Mohrs Beitr  ge. I. B.
- *Acosta spicata* Loureiro, eine neue Art von *Vaccinium*. n. st.

1806. *Conostomum*, eine neue Moos-Gattung; beschrieben. Schrad. n. Journ. I. B. 3 Stück.  
 — Anmärkningar om *Sorex fodiens* och *canaliculatus*.  
 — Extract of a Letter from Prof. Swartz; Annals of Bot. P. VI.
1807. Ueber die Gattung *Holcus*. Schrad. n. Journ. 2 B. 2 Stück.  
 — *Stylidium*, eine neue Pflanzen-Gattung, beschreiben. Magaz. der Gesellsch. Naturforsch. Freunde in Berlin. 1 Jahrg.
1808. *Novæ species Insectorum, descriptæ*; Schönherr, synonymia Insector. P. II. et P. III. 1817.  
 — Svamparter, saknade i Flora Svecica, beskrifne i K. V. A. H. 1, 2, 3, 4 Qv. — 1809: 2, 4 Qv. — 1810: 1, 2, 3 Qv. — 1811: 2, 3 Qv. — 1812: 1, 2 Qv. — 1815: 1 H.  
 — Om culturen af Wallmo; på K. Commerce-Collegii vågnar införd i Inrikes Tidningen.
1810. *Pyrola chlorantha*, ny Svensk vext, beskrifven; K. V. A. H. 3 Qv.  
 — Observations on some species of *Menziesia*. Transact. of the Linn. Soc. Vol. X.  
 — *Fischera*, nouveau genre des plantes; Mem. des Naturalistes de Moscou.  
 — *Blechnum unilaterale*, eine neue Peruanische Art beschrieben. Magaz. der Gesellsch. Nat. Forsch. Fr. 4tes Jahrg.  
 — Bemerkungen über die *Disperis alata* Labillard. n. st.  
 — Die Pflanzen-Gattung *Linconia*, beschrieben. n. st.  
 — Bemerkungen über *Panicum dimidiatum* und Beweise, dass es eine *Rottboëllia* sey. n. st.

1811. Bemerkung über den character von *Stygidium*. n. st. 5:ter Jahrg.
- *Linconia cuspidata*, eine Africanische Pflanze, beschrieben. n. st.
1813. Grunderna till Låran om Djur och Vexter. 8:vo. Stockholm.
1814. Summa Vegetabilium Scandinaviæ systematice coordinatorum. 8:vo. Holmiæ.
- Om särskilta slag af Sot och Brand i Såd; af H. G. Flörke. Fri Öfversättning. K. Landtbruks Acad. Annal. Förra Håft.
- Om Jord-Årtskockor och deras nytta i Landt-hushållningen. n. st. Sedn. Håft.
- Anmärkningar om särskilta arter af Hvete; af E. Walter; med tillägg af C. Crome. Öfversatt. n. st.
1815. Angående Hydatider, i anledning af Hr Hedlund's Sjukdoms-Historia. K. V. A. H. 2 H.
- Om Vexter, af hvilka Torf danas; af C. Crome. Öfversatt. K. Landtbr. Acad. Annal. Sedn. Håft.
- Om Vexters sjukdomar, och i synnerhet om den så kallade Kallbrand på Träd. n. st.
1816. Underrättelse om Flugsvampens (*Amanita muscaria camtschatica*) egenskaper; inf. i Sv. Låk. Sällsk. Årsberättelse 1816.
- Om Lammas-hvete; af S. V. F. Lamouroux. Öfversatt. K. Landtbr. Acad. Annal. Sedn. Håft.
- Praktiske Anmärkningar om Trädgårdsfröns och Vexters varaktighet. n. st.
1817. Nya arter af Ormbunkar (Filices), beskrifne. K. V. A. H. 1 H.
- Anmärkningar om Larver och Puppor af Muscæ slägte, som funnits hos människor. Sv. Låk. Sällsk. Årsberättelse 1817.

1818. Om odling af Pil, Jolster och Vide. K. Landtbr. Acad. Annal. Förra Håft.
- Om Berberisbusken kan alsira Rost på Sädesslagen; undersökt af J. W. Horneman. Öfversatt. n. st.
- Om Mjölökor; af De Candolle. Öfversättning i utdrag. n. st.
- Om Opium och analysen deraf; utdrag utur Gilberts Annal. der Physik. — Sv. Läk. Sällsk. Handl. 1818.
- Försök rörande Morphium och Mekonsyran; af Vogel. — n. st.

Dessutom har Prof. SWARTZ författat ett stort antal Recensioner, införda uti diverse Journaler och lärda Tidningar. — Uti de små Almanachorna finnas flera af honom författade underrättelser om Trädplanteringar och ekonomiska Vexters odlingsätt. — Han hade ämnat att med Prof. WEBER d. y. i Kiel utgifva Species Muscorum, hvarföre han redan för flera år sedan öfversände sina Manuscripter härom till Hr WEBER, som likväl ännu ej utgifvit dem. — Prof. SCHRADER har emottagit beskrifningar öfver nya Moss-slågten, för att införas i Bot. Journal, samt Hr STURM i Nürnberg erhållit Mscr. till 2:dra Fasc. af Lichenes Americ. för att utgifva densamma. — I Mscr. har Prof. SWARTZ vidare efterlemnat Föreläsningar uti Horticulturen, hvilka han ämnat utgifva, och som äro aldeles färdiga till tryckning, samt flera ofulländade utkast till botaniska Afhandlingar. Han hade ock samlat och redigerat ett stort antal af LINNÉ's Bref, i afsigt att äfven utgifva dem af trycket.

Ett Portrait af Prof. SWARTZ finnes uti SCHRADERS Journal für die Botanik, Erster Bd für 1801.



*Stats-Rådet Baron*  
**GUDM. JÖRAN ADLERBETHS**  
*Biographie.*

**H**an föddes den 21 Maji 1751 (n. st.) i Jönköping, äldste barn af då varande Hof-Junkaren, sedan Hof-Råttss-Assessoren JAC. FREDR. ADLERBETH och Fru ANNA MARIA SPALDING. — Då Fadren 1755 tagit afsked och flyttat till sin ätts Fidei-Commiss-egendom Ramsjöholm, blef unga ADLERBETH der uppfostrad och ätnjöt, vid tilltagande år, undervisning i nödiga Språk och vetenskaper, till det mesta af sin egen Far. — Ändteligen skickades han om våren 1768 till Upsala, utan enskildt Lärarmästare, allenast under uppseende af Histor. Professoren GEORGI, i hvars hus han äfven bodde och förplågades. Efter att vid Academien hufvudsakligast hafva uppoffrat sin tid åt Språkens, de Politiska, Philosophiska och Mathematiska vetenskapernes studerande, tog han 1771 Canzli-examen, ingick i Krigs- samt Utrikes Expeditionerna af Kongl. Maj:ts Canzli och erhöll 1773 fullmakt i den förstnämnde, att vara Copist och Canzlist. När Konung GUSTAF III 1774 flyttade till Ekolsund, blef han befalld, att der vara Protocolls-förande i Krigsårenderna, i hvilken syssla han tjenstgjorde äfven under Skånska resan och

*K. V. A. Handl. 1818. St. II.*

på Gripsholm, ända till dess Konungen återkom till Stockholm. Emedlertid befordrad till verklig Protocolls-Secreterare förde han beständigt Råds-Protocollet och ifrån 1775 till slutet af 1777 of-  
ta Protocollet i Krigs-Consellen hos Konungen, som 1778 utnämde honom, efter Canzli Rådet BERCH, till Antiqvarius och till sin egen Hand-Secreterare med Förste Expeditions-Secreterares be-  
der och vårdighet.

Då Konungen 1783 företog en resa till Ita-  
lien, hade Expeditions-Secreteraren ADLERBETH  
den nåden, att vara Hans Maj:ts följaktig genom  
Tyskland, öfver Rostock, Lüneburg, Bronsvig,  
Nürnberg, Augsburg, Inspruch till Verona, Pisa,  
Florens, Rom, Neapel, samt tillbaka till Rom,  
Bologna, Parma och Venedig, der han skildes vid  
Konungen i Maj 1784 och öfver Wien, Prag, Dres-  
den, Berlin och Stralsund återvände till Fädernes-  
landet. Hans befattning var, att under tiden bi-  
tråda vid ministeriella brev växlingen samt att hos  
Konungen föredraga och utfärda allt, som rörde  
Kammar- och Krigs-ärenderna, hvilka göromåls för-  
tjenstfulla bestridande äfven sistnämde år belöna-  
des med Nordstjerne-Orden. Efter då varande Canzli-  
Rådet v. ROSENSTEIN tillträdde han 1786 Secre-  
terare-besättningen i Kongl. Vitterhets- Historie-  
och Antiqvitets-Academien, hvilken tjenst Konun-  
gen förbundit med Antiquarii-Sysslan. Befordrades  
derjemte 1787 till Canzli Råd med säte och stäm-  
ma. På begäran erhöill han 1793 afsked från sina  
öfriga befattningar, samt tjenstfrihet i Canzli-Col-  
legium. Utnämndes 1801 till Commendeur af Kgl.  
Nordstjerne-Orden och till Ledamot af Canzlers-  
Gillet och kallades 1809 af Konungen till Stats-Råd  
samt upphöjdes till Friherre vid Hans Maj:ts kröning  
den 29 Junii. Vid detta årets i Svenska Håfderna

oförgätliga Riksmöte, var Baron ADLERBETH Ledamot af Constitutions-Utskottet, och deltog med sådan verksamhet i öfverläggningarne för Nationens väl och Rikets grundlagar, att hans namn skall af samtid och efterverld med tacksamhet ihogkommas, bredvid minnet af en då stadfastad lagbunden frihet.

Blef Riddare af Konung CARL XIII:s Orden 1811 och af Kongl. Seraphimer-Orden 1814.

Efter 44 års tjenstemannatid önskade åndteligen Baron ADLERBETH, att få uppoffra sina återstående dagar endast åt sina vänner, sina enskilda angelägenheter och fortsättandet af sina poetiska arbeten, hvilka han ännu vid 64 års ålder fullföljde med en ynglings hela liflighet och kraft. — Han begärde derföre och erhöll 1815 nådigt afsked från sitt Stats-Råds-Embete. Vid Riksdagen 1817 mottog han likvål (och detta var sista vedermålet af det allmänna förtroendet \*) kallelsen, att vara Ordförande i Expeditions-Utskottet, men nödgades, före Riksdagens slut, afsäga sig denna befattning, för att nedresa i början af Junii 1818 till sin egendom i Snåland, der han sedan många år varit van, att i enslighet tillbringa sommarmånaderne och egna dem åt litterära yrken. — Han återsåg aldrig mera Hufvudstaden och dog, efter en kort sjukdom, på Ramsjöholm den 7 Oct. 1818.

Under vistandet vid Upsala Lårosäte utvecklades Baron ADLERBETHS första anlag för vitterhet och skaldekonst. Det der inrättade Samsfund *Apollini Sacra* hade upptagit honom till sin Ledamot, och några bland hans skrifter, som derifrån insändes till *Utile Dulci* i Stockholm, förskaffade

\*) Under 1778 års Riksdag hade han varit Ledamot af Riddarhus-Utskottet, 1798 Revisor i Riksgälds-Contorets Discontverk och 1803 Revisor i Banken och Riksgälds-Contoret.

honom snart ett rum bland Ledamöterna i detta sistnämnde Hufvud-Sällskap.

Den förtroliga vänskap, som lika böjelser och lika ädla tänkesätt tidigt stadgade emellan honom och Sveriges odödlige Skald, Grefve G. F. GYLLENBORG, tillskyndade honom den näden, att redan 1773 af Konung GUSTAF III blifva känd och bemärkt, såsom författare till en fri öfversättning af Racines Iphigenie. Från den tiden deltog han också i det förbund af Svenska Sånggudinnornas ypperste gustlingar, som vid lediga afstundstunder samlades kring Konungens Person. Sitt eget utkast till Skådespelet *Birger Jarl* öfverlemnade Konungen till Grefve GYLLENBORG och Baron ADLERBETH att utarbета, hvilket af dem blef så gemensamt verkställt, att stundom 2 och 3 versar skiftevis tillhöra hvardera. — Om detta bör anföras, såsom kanske det sällsyntaste bevis på en vänskap utan afund och deladt intresse, så skall äfven Baron ADLERBETHS blygsamma förtjenst vinna en ny glans, då han till Grefve GYLLENBORG sagt sig böra låmpa Horatii intygande till Melpomene: *quod placeo, si placeo, tuum est*. Det inskränkta rummet för denna Biographie tillåter ej, att omständligare nämna hans talrika arbeten. De flesta finnas uppräknade i Baron ROSENHANES Anteckningar till Kongl. Vetenskaps-Academiens Historia och de öfriga äro anförda i här efterföljande uppsats. Dessutom äro de till större delen redan tillfyllest kända af hvar och en, som med någon uppmärksamhet följt fäderneslandets litteratur och sökt mönster för egen sann bildning. Korrt före sin död, och så nära sin egen förvandling, slutade han en öfversättning af Ovidii Metamorphoser. — Hans ädla och jemna väsende, hans själförsakelse, hans character, hvars redlighet framlyste från alf-



varsamma men goda och uttrycksfulla anletsdrag; hans omisskänneliga nit, att befordra hvad en mögen öfvertygelse sagt honom vara rätt, hans djupa mångkunnighet, som säkerligen mer än en gång förödmjukat den egentliga Vetenskaps-Idkaren, hans outtrötteliga hog (må detta äfven här få nämnas) att tillika i matematiska och astronomiska ämnen ytterligare föröka den ovanliga ljusa kännedom han deruti redan egde; hvad skall säkrare, än allt detta förvara hans minne med vördnaden och åtankan af den förlust, som, genom hans bortgång, träffat det allmänna, vetenskaperna och deras beskydd. Hans valspråk, *Candide et moderate*, var ett träffande uttryck af hans sjelfkännedom. — Såsom Ledamot saknas han af alla inhemska lärda Samfund: af Vitterhets- Historie- och Antiquitets-Academien, Svenska Academien, Landtbruks-Academien, Vetenskaps-Societeten i Upsala och denna Kgl. Academie, i hvars arbeten han deltog från början af 1788 och i hvars sammankomster han förde ordet under första fjerdedelen af år 1790 och första hälften af år 1801. — Sedan 1800 var han äfven medlem af Skandinaviska Litteratur-Sällskapet i Köpenhamn och sedan 1811 af L'Accademia Italiana de Scienze Lettere ed Arti i Livorno.

Den 22 April 1781 ingick han egtenskap med Fröken CARIN RIDDERBORG och har efterlemnadt en Son, nu varande Förste Expeditions Secreteraren i Eccles. Expedition, Herr Baron JACOB ADLERBETH.

---

Åminnelse Tal i Fimurare-Ordens allmänna Sammankomst i Stockholm öfver General-Amiralen Grefve C. A. EHRENSVÅRD, (tr. 1802).

**Grifte-Tal** öfver Stats-Secreteraren **Baron ROSEN-**  
**HANE**, då vapnet krossades d. 14 Jan. 1814,  
samt **Aminnelse-Tal** i Kgl. Vetenskaps-Acade-  
mien öfver densamma, (tr. 1815).

Grifte-Tal öfver Presidenten Baron HÅKANSSON,  
då vapnet krossades d. 27 Apr. 1813.

Öfversättning af Horatii Satyrer och Skaldebref,  
(tr. 1814).

Äminnelse-Tal i Kgl. Vetensk. Academien öfver  
Presidenten i Kongl. Bergs-Collegium LEIJON-  
MARCK, (tr. 1817).

Öfversättning af Horatii Oden och Epoder, (tr. 1817).

*Contre-Amiralen*  
**LARS WOLLINS**  
 Biographie.

**D**en 23 Dec. 1734 föddes han i Cimbritshamn, der Fadren, MAGN. WOLLIN, var Rådman och gift med MARIA MÖRK. Den första undervisningen inhämtades i Trivial-Scholan, hvarifrån han, om sommaren 1749, afsändes till Lunds Universitet. Der, och vid Upsala Lärösäte, som han äfven besökte, tillbragte han 7 år, hvilka uppförades åt de vetenskaper, språk och öfningar, som för en blifvande skicklig Sjö-Officer voro oundgängliga, hvarföre han också, 1757, intogs i högsta classen af den året förut inrättade Amiralitets-Cadett-Corpsen.

Derefter blef han genast commenderad på Kryssnings- och Convoy-expeditioner i Nordsjön, Kattegatt, Östersjön och Medelhafvet vid Spanska, Portugisiska och Italienska kusterna, hvarunder han egde tillfälle att lära känna dessa farvatten, och, till följe af sina ådagalagde kunskaper redan 1758 constituerades till Lieutenant. Bivistade 1760 expedition med Örlogs-flottillen i Frische Haaf, under General-Amiralen AF TROLLES befäl och commenderade dervid sjelf, såsom Chef, Örlogs-Zecanen Mercurius. Undergick detta år alla erforderliga examina samt erhöll Konungens full-

magt att vara Lieutenant vid Amiralitetet. År 1761 var han commenderad på Kongl. Svenska Örlogs-Escadern och Skeppet *Prins Gustaf*, i för-  
 ening med Ryska Flottan, då *Collberg* belägrades  
 och hemförde 1762 från Pomern till Dalarö en  
 del af Konungens Lif-Regemente till Häst, som  
 på sistnämnde ställe debarquerade. De påföljande  
 fyra åren gjorde han tjenst vid Örlogs-Flottans  
 station i Carlsrona, der han också allt framgent  
 egt sin egentliga befattning, när han ej till an-  
 dra förrättningar varit beordrad. — Utnämndes 1766  
 till Major och 1788 till Öfverste Lieutenant vid  
 Amiralitetet. Dubbades samma år till Riddare af  
 Svärds-Orden i Helsingfors, sedan han, under det  
 påstående kriget, vid åtskilliga tillfällen visat prof  
 af sin tapperhet och sina kunskaper, och under  
 det märkvärdiga slaget vid *Hogland* bidragit till  
 eröfrandet af det Ryska 70-Canon-Skeppet *Wla-*  
*dislaff*. Såsom commenderande på Linie-Skeppet  
*Rättvisan* var han främst i linien, näst efter leda-  
 ren, mot Ryska Flottan den 26 Julii 1789 och  
 deltog 1790 i sjöstriden vid *Revel*, *Cronstadt*, *Vi-*  
*borgska* viken och *Sveaborg*, der han sluteligen,  
 efter erhållna grundskott, blef öfvermannad och  
 fången. Efter fredens slut hemkommen, befordra-  
 des han till Öfverste och 1802 till Contre-Ami-  
 ral. — Dog den 29 Nov. 1818 vid 84 års ålder.  
 — Gift 1762 med FREDRICA LIEBBECK, öfver-  
 lefde han, sedan 1806, sin maka, med hvilken  
 han egde 17 barn. Sex Söner och fyra Döttrar  
 sakna honom.

Contre-Amiralen WOLLIN har deltagit i och  
 själf ensam utfört flere vetenskapliga företag, all-  
 tid med sina Förmåns smickrande loford för skick-  
 lighet och en ovanlig sparsamhet med de allmän-  
 na medel, som dertill blifvit anordnade. Till för-



båttrende af Svenska Sjö-Chartæ-verket har han verkställt Triangel-mätning från Calmar till Landsort, 1767, från Signilskär till Jungfrun i Helsingland 1768, och 1773 sammanbundit mätningarne från Landsort till Ålands skären med intagande af Stockholms Observatorium, samt anställt observationer till åtskilliga polhögders bestämmande jemte utrönande af Compassens missvisning.

Åren 1799, 1800 blef honom uppdraget, att, såsom Amiralen AF CHAPMANS ombud, öfvervara de anställda artilleri-försöken till utrönande af Canoners förmänligaste verkan till skjutning, form och hållighet, hvaraf resultaterne blifvit intagne i Vet. Academiens Handlingar 1802, 1:a Quart.

Han kallades 1817 till Ledamot af denna Kongl. Academie, i hvars Handlingar är af honom författad: *Afhandling om upptäckten af Strömmars gång, eller rätta sättet att under segling, medelst 3:ne, å särskilde tider och ställen, förrättade pejlingar på ett och samma landmärke finna Strömmars Direction och Sättning.* (1799, 1:a Quart.).

Dessutom har han, såsom medlem af Örlogsmanna-Sällskapet, i 1:a häftet af dess handlingar för 1787, låtit införa en undersökning: *Om vådrets kraft och verkan på Segel, desse sednares proportion, läge och struktur, för att befrämja välseglingen, samt de egenskaper, som för Örlogs-Skepp med fastställd bestyckning bidraga till högsta grad af fullkomlighet, så i anseende till manœuvre som defencen.*

---

*Assessoren*  
**JOHAN GOTTL. GAHNS**  
**Biographie.**

---

**L**ärjunge af BERGMAN och ungdomsvän af SCHÉELE, har han gjort sitt namn bekant genom flera vigtiga upptäckter i chemien. Född och uppfödd i Fahlun, der hans Föräldrar egde betydliga lotter i Bergverken, hade han tidigt vändt sin hog åt chemien och mineralogien. Under hans studier deri, föll en dag ur hans hand en kalkspatskristall, af det slag som kallas svintänder, och brast i fallet på ett sådant sätt, att en del af kernfiguren blottades. Detta phenomen undgick ej hans uppmärksamhet och innan kort hade han ur en mängd kalkspatskristaller, af flera olika secundära former, utslagit den rhomboedre, som utgör detta minerals primitiva form. Han meddelade denna observation åt BERGMAN, hvars afhandling derom med rätta väckt de lärdas beundran; men BERGMAN nämnde ej att hans lärjunge uppträckt det facrum, som låg till grund för hans arbete. GAHN upptäckte sedan att benjorden, hvilken man ditills ansett såsom en egen jord, var phosphorsyrad kalk, en upptäckt, som i vetenskapens dåvarande period var så mycket svårare att göra, som det ännu många år sednare händt, att man misstagit detta jordsalt för en egen jordart. SCHÉELE, som just under

detsamma utarbetade sin afhandling om flusspaten och dess syra, yttrade deri, "att, till följe af en nyligen gjord upptäckt, benjorden är phosphorsyrad kalkjord", och denna underrättelse flög med SCHEELS upptäckter och, genom ett ouppsåligt misstag, under hans namn kring den lärda världen, innan GAHN hunnit så fullända sitt arbete, att han ansåg det förtjena beskrifvas i en särskildt afhandling, som också aldrig blef skrifven. Han upptäckte vidare att Brunsten innehöll en egen metall, som kunde reduceras med kolpulver vid en sträng eld, men äfven denna upptäckt och de egenskaper han funnit hos den nya metallen, meddelade han endast muntligt, och den lärda världen känner dem nästan endast genom BERGMANS Skrifter.

Begäret efter uppfinnings-ära var för GAHN så främmande, att han aldrig sökte återvinna hvad han så orättvist förlorat, och den person, för hvilken han utan förbehåll berättade historien om sina forskningar, kunde redan anse det såsom ett bevis på en intimare vänskap, och må hända, såsom ett förtroende, ämnadt att icke förådas. GAHN eftersträfvade en sådan fulikomlighet i allt hvad han företog, att då han dermed jämförde hvad han kunde åstadkomma, ansåg han allud frugten af sina arbeten för mycket omogen för att förtjena meddelas. Också har detta berömvärda men öfverdrifna nit beröfvat vetenskaperna skörden af en oupphörligt genom mer än ett halft århundrade fortsatt verksamhet. En del af sina försök har GAHN antecknat, men på ett sätt, som han ofta sjelf efter flera års förlopp ej mer kunde begagna, och som i en främmandes hand blir ännu mindre användbart.

GAHN har bragt blåsrörets bruk till chemiska försök på torra vågen i smått till en grad af användbarhet och fullkomlighet, hvarom ingen gör sig begrepp, som ej sett honom anställa dessa försök. Han har derom lemnat några mindre fullständiga underrättelser i 2:dra Delen af Låroboken i Chemien af BERZELIUS, men han har gjort blåsrörets användande så allmänt bland Svenska Chemister, att man kan hoppas att ingen af hans upptäckter i denna våg skall gå förlorad för efterverlden. En icke mindre vigtig tjänst åt Vetenskapsidkarne var hans uppfinning af utvägar, att sätta en medelmåttig konstnär i stånd att göra en fullt riktig och tillika ytterst känslig vågbalance, hvarom han några månader före sin bortgång uppsatte en utförlig beskrifning, hvilken han tillåt att införa i 3 Delen af Låroboken i Chemien, under Articeln *Våg*.

Men GAHN har utom Vetenskapsidkarens krets, äfven såsom Embetsman och Medborgare på ett utmärkt sätt uppfyllt alla åligganden. Ehuru af sina naturliga anlag kallad att hufvudsakligast tillhöra vetenskaperna, nödgades han dock, efter sin Fars död, att för sin framtida bergning helt och hållet lemna sig åt det practiska af Bergshandteringen. Det blef honom icke nog att theoretiskt känna de använda processerne, han ville hafva kunskap om allt och begynte med att bo i sin hytta, att personligen arbeta bland sitt folk, på det att ingen omständighet skulle undgå honom, och han upphörde dermed ej, förrän detta bemödande ej mer gaf honom nya lärdomar eller ny erfarenhet. Fahlu Bergslag erhöll vid denna tid en betydlig beställning af kopparplåtar och kopparspik, för Krigsskepps förhydning under det Amerikanska kriget, och då Bergslagen ej trodde sig kunna på



den föreskrifna tiden åstadkomma så mycket handarbete, åtog sig GAHN, på deras begäran, för egen räkning förfärdigandet deraf, och lyckades. Detta företag gaf honom en begynnande förmögenhet, som han sedan med en nyttig verksamhet förstod både att föröka och att använda. Han anlade Vitriolverket med dess graderings-anstalter, Rödfärgstillverkningen samt Svafvel-fabrication i Fahlun, och förökade derigenom ganska betydligt ortens näringsfång. Man kan säga att, sedan GAHN bosatt sig i Fahlun, ingen ting inom Bergslagen blifvit gjort till allmän fördel, der han ej, dels genom vetenskapliga, dels genom rent oekonomiska åtgärder spelat en hufvudroll.

Han utnämndes år 1773 till Bergs-Collegii Chemiska Stipendiat, hvilken Syssla han innehade till år 1817. År 1784 blef han af Konungen utnämnd till Assessor i Bergs-Collegium, med skyldighet att göra tjänst, så ofta hans göromål tillåto honom att vistas i Stockholm, och 1793 kallades han af Regeringen till Ledamot af Rikets allmänna ärenders beredning.

Vid den märkvärdiga Riksdagen 1809 — 10 var GAHN fullmäktig i Borgare-Ståndet för Fahlun Bergslag och en verksam Ledamot i Constitutions-Utskottet. Han utmärkte sig med ett lifvande nit för Fäderneslandet och med en ovanlig liberalitet i sina åsikter och handlingar.

GAHNS hälsa var beständigt vacklande, under det hans själ bibehöll ungdomens hela liflighet. Han var af de få menniskor, dem man finner större och ovanligare, ju närmare man lär känna dem.

GAHN var född d. 19 Aug. 1745. Gift år 1784 med ANNA MARIA BERGSTRÖM, med hvilken han haft en Son och tvenne Döttrar. Han blef

Eukling d. 17 Febr. 1815. Efter förlusten af en älskad Maka, som i 40 år omgifvit honom med all huslig lycksalighet, afsynade hans hälsa och krafter betydligt; och ehuru de tidtals syntes förbättras, astogo de likväl särdeles under hösten 1818 så betydligt, att han efter kortt och alldeles icke häftigt illamående stilla utslocknade d. 8 Dec. 1818. Hans Fädernesland, hans hembygd och hans vänner hafva i honom gjort en förlust, som ej kan ersättas.

Han blef Ledamot af Vet. Academien 1784, af Landbruks-Academien 1813, och 1817 af Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften in Marburg. — Hans från trycket utgifne arbeten äro: *Anmärkingar om Författningar till befrämjande af god hushållning vid Jernkutter*, Acad. Alm. Upsala 1770, och *Underrättelse om uppställningen och nyttjandet af en förbättrad opuskel för vattens adreerande*, Upsala 1804.

# UTDRAG

## af Kongl. Vet. Acad. Dag-Bok.

### FÖRTECKNING

*På de Böcker m. m. som under detta års förlopp  
blifvit skänkte till Kongl. Vet. Akademien.*

- K.** VET. ACAD. i PETERSBURG. *Memoires de L'Academie Imperiale des sciences de Petersbourg.*  
Tom. VI.
- K.** FRANSKA INSTITUTET; Dess Notices et extraits des  
Manuscris de la Bibliotheque du Roi et autres  
Bibliotheques. Tome X. 1818 (4:o).
- — *Memoires de l'Institut national des Sciences  
et Arts, — Litterature et beaux arts, Tome  
V. (an XII.)*
- — — *Sciences Morales et politiques, Tome V.  
(an XII.)*
- — — *Sciences physiques et mathematiques.  
Tom. V. (an XII.)*
- *Memoires de l'Institut des Sciences, Lettres et  
Arts — Sciences Mathematiques et physiques,  
Tome VI. (1806.)*
- *Memoire de la Classe des Sciences mathema-  
tiques et physiques de l'Institut national de  
France, prem. semestre de 1806.*
- — — *Second semestre de 1807.*
- — — *Année 1808, — et Année 1809.*
- *Memoires de la Classe des Sciences Mathema-  
tiques et physiques de l'Institut imper. de  
France, année 1810.*
- — *Année 1811, 1:re et 2 partie.*
- — *Année 1812, 1:re et 2 partie.*

- — *Memoires présentés a l'Institut des Sciences, Lettres et Arts, par divers Savans, et lus dans ses assemblées. — Sciences mathématiques et physiques. Tome I. Paris Jan. 1806 (4:o).*

*Tome II. Jan. 1811.*

**LINNEAN SOCIETY i LONDON.** Transactions. Vol. XII.  
**SV. LÄKARE-SÄLLSKAPET.** Årsberättelse om dess Arbeten 1817 (Stockh. 8:o).

— — *Dess Handlingar, 4:de Bandet 1817 (Stockh. 8:o).*

**BARON v. SUCHTELEN.** Original-Manuscripter af Hasselquist, hörande till dess Iter palæstinum.

**ANONYM.** Elogium Joh. Meermannii, auctore H. C. Cras. Amstelaedami 1817. 8:o.

**De LAMBER.** *Dess Astronomie theorique et pratique. Tom. 1, 2, 3. Paris 1814. 4:o.*

**FALLÉN.** *Dess Monographia Hæmatomyzidum Sveciæ, Dissert. Lund 1818, (4:o).*

**FRIEDLÄNDER.** *Dess De l'education physique de l'homme. 1815, 8:o.*

**DULONG et PETIT.** *Deras Recherches sur la mesure de Temperature et sur les lois de la communication de la chaleur. Paris 1818, 4:o.*

**DIURBERG.** *Dess Geographiska Lexicon öfver Skandinavien, Örebro 1818, 8:o.*

**CADET DE VAUX.** *Dess De la Gelatine des os et de son bouillon. Paris, 8:o.*

**GREGOIRE.** *Dess Recherches historiques sur les congrégations hospitalières des freres pontifes. Paris 1818, 8:o.*

**HAUFF.** *Raport of Comitté of the Linnean Society of new England, to a large marine animal, supposed to be a Serpent seen near Cap Ann Massachusetts in Aug. 1817. Boston 1817, 8:o.*

**E. WIBORG.** *Dess Om Boghwete, Markmuus og Spelt. Köpenhamn 1818, 8:o.*

**C. L. SERRISTORI.** *Dess Le Rovine di Lizzano, Firenze 1815, 8 o.*

**LIPPI.** *Dess Fu il fuoco, o l'acqua che sottero Pompei ed Ercolano? Napoli 1815, 8:o.*

**AF SCHULTÉN.** *Dess Dissert. de motu corporum libero in medio resistenti. Åbo 1815.*

*Observ. hypometr. ope Barom. institutas computandi methodus.*

**THERS-**



THERSNER, U., Dess utsigter af Skåne, 1, 2 och 3 häftet.  
Stockh. 1818. fol.

— — Dess Charta öfver den år 1807 anställda Tri-  
angelmätning öfver Stockholm.

---

*Naturalier m. m.*

*Till Kongl. Vet. Academiens Museum 1818*

*skänkte af*

Hans Excell. m. m. Herr Grefve LARS VON ENGSTRÖM,  
missbildning af Tall, från Åland.

Hr THUNBERG, C, P., några arter af Insecter från Bra-  
silien.

Hr FRÖLICH, S., en stor Samling af Brasilianska Fog-  
lar och en Samling af Växter från samma land.

Hr FREYREIS, 50 Brasilianska Foglar.

---

## FÖRTECKNING

på de Afhandlingar, som äro införde  
i detta Sednare Häfte.

1. *B*evis på Jämnvigts-Lagen för Mecha-  
niska Momenterna på en Håfstång, jämte  
de Statiska Momenternas härledande ur  
samma Formel; af Z. NORDMARK s. 173.
2. *N*ågra theoretiska undersökningar rörande  
Högdmätning med tillhjälp af Barometern;  
af N. G. AF SCHULTÉN . . . 188.
3. *O*m Numertalens beteckning med ziffror;  
af B. BERNDTSON . . . 212.
4. *Sol- och Stjern-Förmörkelser, iakttagne i*  
*Åbo*; af H. J. WALBECK . . . 224.
5. *En Locus Geometricus*; af A. FRIGELIUS 228.
6. *Beskrifning på ett Foster af en märkvär-*  
*dig missbildning*; af C. NORDBLAD . 234.
7. *Typhus Nervosus bland späda Barn, ob-*  
*serverad på Stora Barnhuset i Febr. må-*  
*nad 1816 och i November månad 1817;*  
af J. E. NYBLÆUS . . . 237.
8. *Tetrapteryx Capensis, ett nytt Fogelslägte;*  
*beskrifvet af C. P. THUNBERG . . . 242.*
9. *Mydas Gigantea, beskrifven af C. P.*  
*THUNBERG . . . 245.*

10. Några nya Svenska Insect-arter, fundne  
och beskrifne af J. V. ZETTERSTEDT 249.
11. Granskning af de till Thymelæarum växt-  
ordning hörande Slågten och Arter; af  
J. E. WIKSTRÖM . . . 263.
12. Beskrifning af ett nytt Slägte ibland  
Växterne, kalladt *Lonchostoma*, af J.  
E. WIKSTRÖM . . . 350.
13. Uppställning af de i Sverige fundne Vårt-  
svampar (*Scleromyces*); af E. FRIES  
(Fortsättning) . . . 356.

### Biographier öfver:

K. F. Lif-Med. m. m. PEHR AF BJERKÉN	362.
Hans Exc. m. m. Grefve J. G. OXENSTJERNA	365.
Professorn m. m. O. SWARTZ . . .	370.
Stats-Rådet m. m. Baron ADLERBETH .	381.
Contre-Amiralen L. WOLLIN . . .	387.
Assessoren J. G. GAHN . . .	390.

Utdrag af K. Vet. Atad. Dagbok . . . 395.

# FIGURER

## Till 1818 Års Handlingar.

---

### *Första Stycket:*

<b>TAB. I.</b>	hörer till	Hr Thunbergs	Afhandling.
— II.	— —	Hr Dalmans	—
— III.	— —	Hr Nilssons	—
— IV.	— —	Hr Flormans	—

### *Andra Stycket:*

<b>TAB. V.</b>	hörer till	Hr Nordmarks	Afhandling.
— VI.	— —	Hr Frigeli	—
— VII.	— —	Hr Nordblads	—
— VIII.	— —	Hr Thunbergs	—
— IX.	— —	Hr Thunbergs	—
— X.	— —	Hr Wikströms	—

---



## FÖRTECKNING

På Auctorerne till de Afhandlingar m. m.  
som finnas införde i 1818 års  
Handlingar.

<b>A</b> RFVEDSON, A., Undersökning af några vid Utö Jernmalmsbrott träffade Fossilier och ett egert deri funnet eldfast Alkali . . . . .	23.
<b>BERNDTSON</b> , B., Uppgift af Rötternas expressioner till den af BEZOUT i Cours de Mathematiques: Algebre (p. 231) meddelta Formel för equa- tioner af 5:te graden, äfvensom af dessa expressioners determination vid serskildta händelser, m. m. . . . .	I.
— — Om Numertalens beteckning med ziffro . . . . .	212.
<b>BERZELIUS</b> , J., Undersökning af en ny Mineral-kropp, som innehålles i det vid Fahlun tillverkade Svafvel . . . . .	13.
<b>DALMAN</b> , J. V., Några nya Genera och Species af Insecter, beskrifne . . . . .	69.
<b>DUBB</b> , P., Om den Svenska Quarantaines-Anstalten på Kängö . . . . .	29.
<b>FLORMAN</b> , A. H., Beskrifning på ett vanskapat Vattenhufvud ( <i>Hydrocephalus</i> ) af en Kalf, jemte teckning . . . . .	161.
<b>FRIES</b> , E., Uppställning af de i Sverige fundne Vårtsvampar ( <i>Scleromyces</i> ) . . . . .	100.
— Fortsättning . . . . .	356.
<b>FRIGELIUS</b> , A., En locus geometricus . . . . .	228.
<b>HARTMAN</b> , C. J., Physiographiska Observationer under en Resa genom vestliga Delarne af Gestrikland, Helsingland och Jemtland . . . . .	21.
<b>NILSSON</b> , S., Beskrifning öfver Släktet <i>Pedicel- laria</i> . . . . .	90.
<b>NORDBLAD</b> , C., Beskrifning på ett Foster, af en märkvärdig missbildning . . . . .	234.

- NORDMARK, Z.**, Bevis på Jämnvigts-Lagen för Mechaniska Momenterna på en Häfstång, jämte de Statiska Momenternas härledande ur samma Formel . . . . . 173.
- NYBLAEUS, J. E.**, Typhus nervosus ibland späda Barn, observerad på Stora Barnhuset i Febr. månad 1816 och i Nov. månad 1817 . . . . . 237.
- SCULTÉN, N. G.**, af, Några Theoretiska Undersökningar rörande Högd-mätning med tillhjälp af Barometern . . . . . 188.
- THUNBERG, C. P.**, Teckning af en ny art Myrätare eller Bälta från Brasilien . . . . . 65.
- — *Tetrapteryx capensis*, ett nytt fogelslägte . . . . . 242.
- — *Mydas Gigantea*, beskrifven . . . . . 246.
- WALBECK, H. J.**, Sol- och Stjernförmörkelser, iakttagne i Åbo . . . . . 224.
- WIKSTRÖM, J. E.**, Granskning af de till Thymelæar um Växtordning hörande Släkten och Arter . . . . . 263.
- — Beskrifning af ett nytt slägte ibland Växterne, kalladt Lonchostoma . . . . . 350.
- ZETTERSTEDT, J. V.**, Några nya Svenska Insect-arter, fundne och beskrifne . . . . . 249.

## REGISTER

Till 1818 års Handlingar öfver de ämnen;  
som deri förekomma.

- A**conitum septentrionale 246.  
Acrydium bispinosum 77.  
Agaon paradoxum 69.  
Agrostis alpina 133, alpina varietas 150.  
Aira bothnica 124, alpina 150, flexuosa  $\alpha$  vulgaris,  $\beta$  montana 157.  
Aikali, nytt eldfast, 23.  
Anacharis Eucharoides 79.  
Androsace stricta, farinosa 145.  
Angelica Archangelica, sylvestris 155.  
Apargia Taraxaci 153.  
Aspidium montanum 128.  
Asplenium viride 139.  
Astragalus Orobooides 132, 135.  
Barometer, se Högdmatning.  
Berula nana  $\beta$  148.  
Biographier öfver P. BJERKÉN 362.  
J. G. OXENSTJERNA 365.  
O. SWARTZ 370.  
G. J. ADLERBETH 381.  
L. WOLLIN 387.  
J. H. GAHN 390.  
Bostrychia rubescens 117, chrysosperma, leucosperma 118, melas-  
sperma, rhuina, globifera 119.  
Buprestis moesta 252.  
Bälta, ny art från Brasilien, 65.  
Cansiera 270, 285 scandens 286.  
Carex norvegica, glareosa, globularis, aquatilis 124, alpina, or-  
nithopoda, capitata 128, rupestris, ustulata, pulla 135, sa-  
xatilis 155, filiformis 156, evoluta, atrata 157, Buxbaumii  
 $\beta$  alpina, Wormskjöldii 160.  
Celyphus obreus 72.  
Cenangium laminare 360, ferrugineum, fallax 361.  
Cerastium alpinum  $\alpha$  villosum 153,  $\beta$  glabratum 149.  
Ceroplatys testaceus 88.  
Chalcis melanaris 79.  
Cheyranthus Erysimoides 151.  
Chrysomela bicolor 256.  
Clytra aurita 257.

## Register.

- Clytus antilope* 257.  
*Cossonus ferrugineus* 255.  
*Cynips Eucharoides* 78.  
*Dais* 270, 348, *coriifolia*, *octandra* 348, *disperma* 349.  
*Daphne* 270, 294, *mezereum* 295, *laureola*, *pontica*, *pendula* 296, *tinifolia*, *Gnidium* 297, *rotundifolia*, *indica* 298, *cannabinæ*, *odorata*, *sinensis* 299, *occidentalis*, *alpina* 300, *alyrica*, *Cneorum*, *striata* 301, *glomerata*, *collina* 302, *buxifolia* 303, *sericea* 305, *oleoides* 306, *salicifolia*, *obovata*, *lanceifolia* 307, *Elæagnoides* 308.  
*Dasyus multicinctus* 65, *septemcinctus* 66.  
*Diplolepis Patellana* 80.  
*Dirca* 270, 309, *palustris* 309.  
*Dirhinus excavatus* 75.  
*Draba hirta* 159.  
*Drapetes* 270, 284, *muscoïdes* 284.  
*Dryinus* 81.  
*Epilobium alpinum*  $\alpha$  minus,  $\beta$  majus 151.  
*Erigeron uniflorum*, *alpinum* 149.  
*Eriophorum capitatum* 132.  
*Equarion af 5:te graden* I.  
*Fritillaria meleagris* 124.  
*Gnaphalium supinum*, *fuscum* 148.  
*Gaidia* 270, 309, *pinifolia*, *imberbis* 310, *juniperifolia*, *radiata*, *filamentosa* 311, *oppositifolia*, *carinata* 312, *scabra*, *simplex* 313, *capitata*, *biflora* 314, *acutifolia*, *racemosa*, *stricta*, *setosa* 315, *linoides*, *nana* 216, *virescens*, *romentosa* 317, *argentea*, *sericea*, *imbricata* 318, *Daphnæfolia* 310.  
*Gonatopus ephippiger* 81, *melaleucus*, *collaris* 82, *flavicornis*, *rufigornis* 83, *frontalis*, *basalis* 84, *brevicornis* 85, *pedestris* 86, *taucicornis*, *pubicornis* 87.  
*Granskning af Thymelæarum släkten och arter* 263.  
*Harpalus serripes* 254.  
*Hieracium prenanthoides* 134, 150, *sylvaticum* Fl. D. *alpinum* 151.  
*Hister globulus* 252.  
*Holcus borealis*  $\beta$  *biflorus* 137, 158.  
*Hydrocephalus*, af en kalf, 161.  
*Hydroselen-kali* 18.  
*Hydrosulphure sulphuré* 18.  
*Hygrometer* 201.  
*Häfstång* 173.  
*Högdinätning med tillhjelp af Barometer*, 188.  
*Insecter*, nya Genera och Species, 69. — Nya Svenska arter 249.  
*Juncus castaneus* 130, 132, 146, *Spadiceus*, *biglumis* 149, *squarrosus* 139.  
*Kobresia caricina* 135, 154, *scirpina* 154.  
*Känsö*, se *Quarantaine*.  
*Lagertha* 270, 293, *linnearia* 294.  
*Lichion*, ett nytt eldfast alkali 23.  
*Lixus Bardanæ* 254.  
*Locus geometricus* 228.  
*Lonchostoma*, ett nytt växtslägte beskrifvet 350, *L. obtusiflorum* 352, *acutiflorum* 353.



## Register.

- Lophium exipuliforme* 112, *diminuens*, *curtum*, *medium*, 113, *angustatum*, *compressum*, *herbarum* 114, *Lonicera*, *arundinis*, *crenatum* 115, *episphaerium*, *mytilinum* 116, *barbarum* 117.  
*Mechaniska momenterna* på en häfstång, jemnvigtslagen därför bevist 173.  
 Missbildning af ett människofoster 234, — af en kalf, se *Hydrocephalus*.  
*Mydas gigantea* 246.  
*Myosotis deflexa* 140, 159, *arvensis*  $\beta$  *alpicola* 140, 160.  
*Myrätare*, ny från Brasilien 65.  
*Narthecium ossifragum* 139.  
*Numeralens* beteckning med ziffror 212.  
*Ophrys Myodes* 129.  
*Orchis cruenta* 130, 146.  
*Ornithogalum stenoperalum* 145.  
*Passerina* 270, 319, *annua*, *racemosa* 320, *stelleri*, *eriocephala* 321, *cephalophora*, *conglomerata* 322, *purpurea*, *paleacea* 323, *filiformis* 324,  $\beta$  *divaricata*, *ericoides* 325, *rigida*, *hirsuta* 326, *salsolæfolia*, *Tartonraira* 327, *nervosa* 328, *capitata*, *globosa* 329, *orientalis*, *ciliata* 330, *Thymelæa* 331, *pubescens villosa*, *tomentosa* 332, *thesioides* 333, *coridifolia* 334, *dioica* 335, *calycina* 337, *nivalis* 338, *tinctoria*, *nitida* 339, *Lessertii*, *virgata* 341, *canescens*, *tenuiflora* 342, *linearifolia*, *Thunbergii* 343, *uniflora* 344, *grandiflora* 345, *laxa*, *spicata* 346, *anthylloides* 347.  
*Pedicellaria globifera* 97, *ovata*, *aristata* 98, *dentata* 99.  
*Pedicularis versicolor* 135, 156, *lapponica* 148.  
*Petalit* 28.  
*Phaca frigida*  $\alpha$  *lapponica* 135, 153,  $\beta$  *austriaca* 153.  
*Physiographiska observationer* 121.  
*Pinus hybrida* 126.  
*Pimelea* 270, 273, *collina*, *linifolia*, *cernua* 274, *brevifolia*, *paludosa*, *angustifolia*, *glauca*, *ligustrina* 275, *decussata*, *rosea*, *hispida*, *lanata* 276, *pauciflora*, *serpyllifolia*, *prostrata*, *sylvestris* 277, *humilis*, *flava microcephala*, *Gnidia* 278, *clavata*, *imbricata*, *longiflora*, *octophylla*, *pilosa* 279, *virgata*, *longifolia* 280, *sericea* 281, *sericea*  $\beta$ , *cinerea*, *drupacea*, *incana* 282, *nivea*, *spicata*, *argentea*, *curviflora* 283, *gracilis*, *latifolia* 284.  
*Poa laxa*  $\alpha$  &  $\beta$  *flexuosa* 133, 150, *glauca* 153.  
*Pogonophorus rufomarginatus* 253.  
*Potamogeton rufescens*  $\alpha$  *major*  $\beta$  *minor* 158.  
*Pselaphus Heisii* 259, *bulbifer* 260, *clavicornis* 261, *brevicornis* 262.  
*Quarantaines-Anstalt* på Käsö 29:  
     Ordning vid Käsö hamn 4c.  
     Kökning om bord 41.  
     Rening: varors 43, skeppets 42.  
     Quarantaines-rid 45.  
     Reglemente för tjänstgöringen på Käsö 48.  
     Magazinsbyggnad på Käsö 52.

## Register.

- Lazarett på Kånsö 53.  
 Pesthus på Kånsö 53.  
 Observations-Sjukhus på Kånsö 52.  
 Convalescenthus på Kånsö 60.  
 Mönstringshus på Kånsö 60.  
 Boningshus på Kånsö 61.  
 Taxa vid Kånsö 63.  
 Practica vid Kånsö 64.  
**Quercus Robur**, dess nordliga gräns bestämd 23.  
**Ranunculus glacialis** 150, **montanus** 156.  
**Rhynchanus Rosæ** 255.  
**Salix glauca** 147, **herbacea** 149, **polaris** 156.  
**Saperda linearis**, **Salicis** 258.  
**Saxifraga stellaris**  $\beta$  **comosa** 147, **aizoides**  $\beta$  **aurantia**, **nivalis**  $\beta$  **elator** 159.  
**Scleromyces** 100, 356.  
**Scolytus limbarius** 252.  
**Selenium**, en ny Mineralkropp 13.  
     **Selensyra** 17.  
     **Selenbunden värgas** 19.  
     **Selenbundna Metaller** 20.  
**Silene acaulis** 147.  
 Skillnad mellan Barom. och Trigon. Högdsmätningar 211.  
 Sol- och Stjernförmörkelser 224.  
**Sphærie oblectæ**: **fimeti**, **livida** 100, **maura**, **astroidea**, **eutypa** 201, **hiascens**, **crypta**, **strobilina** 102, **mamillana**, **Xylostei**, **rhodostoma** 103, **pupula**, **Tiliæ** 104, **lanata**, **hirta**, **persariata** 105, **ditopa**, **floccosa** 106, **patula**, **Juglandis**, **sarmentorum** 107, **sæpincola**, **epidermidis**, **complanata** 108, **coniformis**, **herbarum**, **alnea** 109, **Taxi**, **Visci**, **Buxi** 110,  $\beta$  **Rusci** 111.  
**Sphæronema subulatum** 356, **rufum**, **aciculare**, **cladoniscum**, **cylindricum** 357, **truncatum**, **conicum**, **hydnoideum** 358, **bullosum**, **versiforme** 359.  
**Spodumén** 28.  
**Stellaria uliginosa**  $\alpha$  **fontana**,  $\beta$  **alpicola** 145, **cerastoides** 147.  
**Struthiola** 270, 285, **virgata** 286,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$ , **lucens** 287, **villosa**, **striata** 288, **erecta** 289, **ovata hirsuta** 290, **Vahlîi**, **tuberculosa**, **angustifolia** 291, **longiflora**, **tomentosa**, **sulcata**, **chrysantha** 292.  
 Tabeller till lättnad vid högders uträknande genom Barom. Observ. 208.  
**Tetrapteryx capensis** 242.  
**Thecanthes** 270, 271, **cornucopiæ** 271, **punicea** 272.  
 Tillägg till **Linconia** släkt-caractere 349.  
**Tussilago frigida** 150.  
 Uppställning af Sv. Vårtsvampar, se **Scleromyces**.  
**Veronica saxatilis** 134, **alpina**  $\beta$  **villosa**.  
 Vårtsvampar, se **Scleromyces**.
-

## Tillägg och Rättelser:

Sid.	6 rad.	18 står:	b = o, läs: p = o.
— 62 —	18 —	—	Fältmättnings-Corpsen, <i>L. Fortifications-Brigaden.</i>
— 67 —	1 —	—	<i>cinctus, L. cinctus.</i>
— 69 —	16 —	—	<i>testaceus, immaculatus, L. testaceum, immaculatum *)</i> ,
— 74 —	33 —	—	<i>æqualis, L. æquali.</i>
— 79 —	5 —	—	<i>melanuris, L. melanaris.</i>
— 82 —	33 —	—	<i>palpisquæ, L. palpisque:</i>
— 88 —	31 —	—	1:0, <i>L. 1:us. — 2:0, L. 2:us.</i>
— 117 —	13 —	—	II., <i>L. III.</i>
— 126 —	18 —	—	<i>L. Lassekrogen.</i>
— 127 —	25 —	—	<i>uteslutes: icke.</i>
— —	28 —	—	<i>L. Laforsen.</i>
— 133 —	15 —	—	tillägges efter parenthesen: <i>Veronica alpina</i> <i>β australis</i> Wahlenb. härstädes blott en till tre rum hög.
— 138 —	5, 8, 16,	—	<i>uteslutes comma.</i>
— 139 —	15 står:	—	och, <i>L. men.</i>
— 146 —	2 nedifr.,	—	<i>L. exterior.</i>
— —	10 nedifr.,	—	<i>L. digitis.</i>
— 147 —	26	—	<i>L. foliola.</i>
— 150 —	4	—	<i>L. simile.</i>
— 153 —	10	—	<i>L. Apargia Taraxaci.</i>
— 253 —	30 står:	—	<i>supra-testaceus, L. supra testaceus.</i>
— 253 —	17 —	—	<i>cæruleo, L. cæruleo.</i>
— 259 —	20 —	—	<i>arciculo, L. arciculo.</i>
— 265 —	8 —	—	att <i>L. Art (species).</i>
— —	13	—	<i>L. median, L. emedan.</i>
— 270 —	11	—	<i>dele: fida.</i>
— 272 —	34 står:	—	<i>punctatio, L. punctatis.</i>
— 273 —	14 —	—	<i>pinguia, L. pingves.</i>
— 279 —	11	—	<i>L. quos.</i>
— 285 —	27	—	<i>L. σρεσιον.</i>
— 284 —	—	—	ante 97 adde: †
— 294 —	25 står:	—	ah <i>L. ab.</i>
— —	31	—	<i>L. Poëticæ,</i>
— 297 —	33 står:	—	Id. <i>L. In.</i>
— 298 —	33	—	post Banks adde: <i>asserit.</i>
— 309 —	26	—	post Quod adde: <i>sub.</i>
— 317 —	7 står:	—	b. XIII, <i>L. P. XIII.</i>
— 321 —	25 —	—	<i>excrescunt, L. excrescunt.</i>
— 323 —	24	—	<i>L. relatum.</i>
— 325 —	6 står:	—	a, <i>L. ex.</i>
— 330 —	26	—	<i>L. hunc.</i>
— 331 —	14	—	<i>dele: attamen.</i>
— 343 —	18 står:	—	<i>clausis, L. clausus.</i>
— 345 —	9	—	<i>dele: a,</i>

\*) Släktet var först kalladt *Agavus*, hvilket sedan ändrades till *Agaon*, för att undvika en för stor namnlikhet med Växt-släktet *Agave*.